

Ю.Ю. Гнездовский, В.Н. Горбузов

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УДК 514.116(035.5)

ББК 22.151.0я2

Г56

Гнездовский, Ю. Ю.

Г56 Тригонометрические системы / Ю.Ю. Гнездовский,
В.Н. Горбузов. — 222 с.

ISBN

В пособии рассмотрены методы решения систем тригонометрических уравнений.

Предназначено для учителей математики и учащихся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и колледжей. Может быть использовано при обучении студентов педагогических специальностей вузов методам решения задач элементарной математики.

УДК 514.116(035.5)

ББК 22.151.0я2

© Гнездовский Ю.Ю., Горбузов В.Н.,

ISBN

Введение

В современном школьном курсе математики рассматриваются только отдельные виды тригонометрических систем, поскольку данный материал сложный, но обязательный для изучения. Более основательно изучаются тригонометрические системы в классах с углубленным изучением математики, в гимназиях и лицеях. Однако предлагаемые на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения задачи, как правило, гораздо сложнее тех, которые приведены в учебниках.

При решении тригонометрических систем широко используются тригонометрические преобразования, свойства тригонометрических функций, методы решения тригонометрических уравнений, а также общие подходы решения систем, не обязательно тригонометрических. Наличие специфических особенностей порождает значительные трудности, для преодоления которых нужны теоретические знания и практические навыки.

Часто бывает не просто сделать первый шаг при решении тригонометрических систем, который, как правило, служит «ключом» к решению задачи. Какие-то общие рекомендации, а тем более общие методы, привести невозможно. В то же время целые классы систем решаются одинаковыми способами. Наиболее распространенными являются метод исключения одной из переменных и метод подстановки. Значительное место занимают подходы, когда посредством тригонометрических формул устанавливаются связи, позволяющие определить дальнейший ход решения. На примерах решения конкретных систем уравнений и отдельных классов систем приводятся подходы к решению.

Задачи подбирались так, чтобы их решение отражало и концентрировало в себе предлагаемый метод. При этом внимание уделяется обсуждению не только «технических приемов», но и различным «тонким местам», например условиям применимости той или иной формулы. Вместе с тем в ходе

решения приводится возможный вариант оформления, что требует определенных знаний.

Значительная часть решенных задач взята со вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, которые предлагают задачи высокого уровня сложности.

При использовании данного пособия необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Пусть A — некоторое уравнение, неравенство, система или совокупность, B — также некоторое уравнение, неравенство, система или совокупность. При этом если A , например, неравенство, то B может быть уравнением, неравенством, системой и совокупностью.

Будем считать, что A *равносильно* B и запишем

$$A \Longleftrightarrow B,$$

если множество решений A является множеством решений B , а множество решений B является множеством решений A .

Другими словами, A и B *равносильны тогда и только тогда, когда у A и B одно и то же множество решений.*

Приведем примеры отдельных равносильностей:

$$x + 12 \geq 0 \Longleftrightarrow x \geq -12;$$

$$x + 3 = x^2 + 3 \Longleftrightarrow x = x^2;$$

$$(x + 3,2)^2 = 0 \Longleftrightarrow |x + 3,2| = 0 \Longleftrightarrow x + 3,2 = 0;$$

$$(x + 7)(x^2 - 1) = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} x + 7 = 0, \\ x^2 - 1 = 0; \end{cases}$$

$$(x^2 - 25)^2 + (x + 5)^2 = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} x^2 - 25 = 0, \\ x + 5 = 0; \end{cases}$$

$$\frac{x+5}{2-x} > 0 \iff (x+5)(2-x) > 0;$$

$$\sin x \geq 1 \iff \sin x = 1;$$

$$\cos x \leq -1 \iff \cos x = -1.$$

Символ $\iff$ будем использовать и вместо оборотов слов «тогда и только тогда, когда» и «если и только если».

Например, запись

$$\frac{5}{6} < \frac{7}{8} \iff 5 \cdot 8 < 6 \cdot 7$$

означает, что

$$\frac{5}{6} < \frac{7}{8} \text{ тогда и только тогда, когда } 5 \cdot 8 < 6 \cdot 7$$

или, что то же,

$$\frac{5}{6} < \frac{7}{8}, \text{ если и только если } 5 \cdot 8 < 6 \cdot 7.$$

Будем использовать весьма удобные при изложении материала *условные обозначения*.

$\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел;

$\mathbb{Z}$ — множество целых чисел;

$\mathbb{R}$ — множество действительных чисел;

$\emptyset$ — пустое множество;

$\forall$ — для всех, при любых;

$\implies$ — следовательно, если, то;

$D(f)$ — область определения функции f ;

$E(f)$ — множество значений функции f .

Так, запись

$$|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

читается:

$$|x| \geq 0 \text{ при любых } x \in \mathbb{R}$$

или

$$|x| \geq 0 \text{ при любом действительном } x.$$

Утверждение

$$\text{если } x = 2, \text{ то } |x| = 2$$

с помощью символа $\implies$ записывается кратко:

$$x = 2 \implies |x| = 2.$$

Среди числовых множеств будем выделять *числовые промежутки*. Это множества одного из видов:

$[a; b]$ при $a < b$ — *отрезок*;

$(a; b)$ — *интервал*;

$[a; b)$ и $(a; b]$ — *полуинтервалы*;

$(-\infty; b]$, $(-\infty; b)$, $[a; +\infty)$, $(a; +\infty)$ — *числовые лучи*;

$(-\infty; +\infty)$ — *числовая прямая*.

Обратим внимание на еще одно обстоятельство.

Если требуется решить уравнение, неравенство, систему или совокупность, то такую задачу понимаем как нахождение их *множества решений*.

Например, неравенство $x^2 < -3$ не имеет решений. Поэтому его множеством решений является пустое множество. В ответе запишем: $\emptyset$.

У квадратного уравнения $x^2 = 5$ два корня: $x_1 = -\sqrt{5}$ и $x_2 = \sqrt{5}$. Его множество решений состоит из двух чисел $-\sqrt{5}$ и $\sqrt{5}$. В ответе запишем: $\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$.

Система

$$\begin{cases} x + 1 > 0, \\ x - 1 \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1, \\ x \leq 1 \end{cases} \iff -1 < x \leq 1,$$

а ее множеством решений является полуинтервал $(-1; 1]$.
Совокупность

$$\begin{cases} x - 2 > 1, \\ x - 1 \leq -2 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 3, \\ x \leq -1. \end{cases}$$

В ответе запишем: $(-\infty; -1] \cup (3; +\infty)$.

Неравенство $(x - 1)^2 \geq 0$ выполняется при любом x .
Множество действительных чисел является его множеством решений. В ответе запишем: $\mathbb{R}$ или $(-\infty; +\infty)$.

Множество решений систем и совокупностей, которые содержат две переменные, будем записывать в виде множества упорядоченных пар.

Например, система

$$\begin{cases} |x| - 2 = 5, \\ y - 1 = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} |x| = 7, \\ y = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -7, \\ y = -1, \\ x = 7, \\ y = -1. \end{cases}$$

В ответе запишем: $\{(-7, -1), (7, -1)\}$.

§ 1. Метод исключения переменной

Приступая к решению тригонометрических систем, целесообразно проверить, нельзя ли из какого-либо уравнения системы выразить одну из неизвестных через другие и тем самым перейти к решению системы с меньшим числом уравнений или вовсе свести ее к одному уравнению. Такой метод решения систем уравнений называется *методом исключения переменной*.

Здесь же сразу следует оговорить, что наличие такой возможности не всегда позволяет избрать оптимальный путь решения. Иногда целесообразно выполнить некоторые преобразования уравнений, входящих в систему, а затем произвести исключение переменной; в отдельных случаях следует вовсе отказаться от метода исключения переменной и воспользоваться иным способом решения.

Задача 1. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 4 \sin x - \cos(y + 47^\circ) = -3, \\ x + y = 43^\circ. \end{cases} \quad (1)$$

Решение. Из второго уравнения системы (1) выразим

$$y = 43^\circ - x$$

и подставим в первое уравнение этой системы:

$$\begin{aligned} 4 \sin x - \cos(43^\circ - x + 47^\circ) &= -3 \iff 4 \sin x - \cos(90^\circ - x) = -3 \iff \\ \iff 4 \sin x - \sin x &= -3 \iff \sin x = -1 \iff x = -90^\circ + 360^\circ \cdot k, \end{aligned}$$

где k — любое целое число.

Тогда

$$y = 43^\circ - (-90^\circ + 360^\circ \cdot k) = 133^\circ - 360^\circ \cdot k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\{(-90^\circ + 360^\circ \cdot k, 133^\circ - 360^\circ \cdot k)\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$

Задача 2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 3 \sin 3x + \cos y = -4, \\ x + y = \frac{3\pi}{2}. \end{cases} \quad (2)$$

Решение. С п о с о б 1. Из второго уравнения системы (2) выразим

$$y = \frac{3\pi}{2} - x.$$

Подставив в первое уравнение системы (2) вместо неизвестной y разность $\frac{3\pi}{2} - x$, получим тригонометрическое уравнение

$$3 \sin 3x + \cos\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = -4 \iff 3 \sin 3x - \sin x = -4.$$

Так как при любом действительном x

$$\begin{aligned} \sin 3x &= \sin(x + 2x) = \sin x \cos 2x + \cos x \sin 2x = \\ &= \sin x(1 - 2 \sin^2 x) + 2 \sin x \cos^2 x = \\ &= \sin x - 2 \sin^3 x + 2 \sin x(1 - \sin^2 x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} 8 \sin x - 12 \sin^3 x &= -4 \iff 3 \sin^3 x - 2 \sin x - 1 = 0 \iff \\ &\iff (\sin x - 1)(3 \sin^2 x + 3 \sin x + 1) = 0. \end{aligned}$$

Квадратный трехчлен $3 \sin^2 x + 3 \sin x + 1$ относительно $\sin x$ не равен нулю как имеющий отрицательный дискриминант $D = 9 - 12 = -3$. Поэтому

$$\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Тогда из второго уравнения системы (2) находим, что

$$y = \frac{3\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = \pi - 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, множество упорядоченных пар

$$\left\{\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \pi - 2\pi n\right)\right\}, \forall n \in \mathbb{Z}$$

является множеством решений системы (2).

С п о с о б 2. По свойству ограниченности тригонометрических функций синус и косинус имеют место оценки

$$\sin 3x \geq -1, \forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{и} \quad \cos y \geq -1, \forall y \in \mathbb{R},$$

в соответствии с которыми первое уравнение системы (2) равносильно системе уравнений

$$\begin{cases} \sin 3x = -1, \\ \cos y = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi k}{3}, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = \pi + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Тогда решениями системы (2) являются те и только те из найденных значений неизвестных x и y , которые удовлетворяют второму уравнению системы (2):

$$\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi k}{3} + \pi + 2\pi m = \frac{3\pi}{2} \iff k = -3m.$$

Итак, решениями системы (2) будут

$$\left(\frac{\pi}{2} - 2\pi m, \pi + 2\pi m\right), \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Заменив m на $-n$, получим задание множества решений системы (2) в том виде, в котором оно получено при решении первым способом.

Ответ: $\left\{\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \pi - 2\pi n\right)\right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$

Методом исключения переменной, но несколько сложнее, решается следующая тригонометрическая система. В ее случае сложности связаны прежде всего с нахождением множеств, на которых имеют место формулы, используемые

при решении. Это влечет за собой требование особой аккуратности и умение правильно записать решение.

Задача 3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} = \operatorname{tg} y, \\ x - y = \frac{\pi}{6}. \end{cases} \quad (3)$$

Решение. Из второго уравнения системы (3) устанавливаем, что

$$y = x - \frac{\pi}{6}.$$

Тогда, заменив в первом уравнении системы (3) неизвестную y на разность $x - \frac{\pi}{6}$, получим уравнение

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \operatorname{tg} x} = \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{6} \right). \quad (4)$$

С помощью формулы тангенса разности

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta},$$

которая имеет смысл, когда $\alpha - \beta$, α , β не равны $\frac{\pi}{2} + \pi n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$, устанавливаем, что уравнение (4) равносильно системе

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{6} \right), \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Используя формулу равенства тангенсов

$$\operatorname{tg} u = \operatorname{tg} v \iff \begin{cases} u = v + \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}, \\ v \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

получаем равносильную систему

$$\begin{cases} \frac{\pi}{4} - x = x - \frac{\pi}{6} + \pi m, \\ x - \frac{\pi}{6} \neq \frac{\pi}{2} + \pi l, \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{5\pi}{24} - \frac{\pi}{2} m, \forall m \in \mathbb{Z}, \\ x \neq \frac{2\pi}{3} + \pi l, \forall l \in \mathbb{Z}, \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

При целых l, m и n уравнение

$$\frac{5\pi}{24} - \frac{\pi}{2} m = \frac{2\pi}{3} + \pi l \iff 5 - 12m = 16 + 24l \iff 12(m + 2l) = -11,$$

а также уравнение

$$\frac{5\pi}{24} - \frac{\pi}{2} m = \frac{\pi}{2} + \pi n \iff 5 - 12m = 12 + 24n \iff 12(m + 2n) = -7$$

не имеют решений, так как числа $12(m + 2l)$ и $12(m + 2n)$ — четные, а числа -11 и -7 — нечетные.

Таким образом, корнями уравнения (4) будут

$$x = \frac{5\pi}{24} - \frac{\pi}{2} m, \forall m \in \mathbb{Z}$$

или, что одно и то же,

$$x = \frac{5\pi}{24} + \frac{\pi}{2} k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Из второго уравнения системы (3) находим, что

$$y = \left(\frac{5\pi}{24} + \frac{\pi}{2} k \right) - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{2} k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{24} (5 + 12k), \frac{\pi}{24} (1 + 12k) \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

является множеством решений системы (3).

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{24} (5 + 12k), \frac{\pi}{24} (1 + 12k) \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

В рассмотренных задачах методом исключения переменной данную систему сводили к тригонометрическому уравнению от одной переменной. Возможно приведение тригонометрической системы к алгебраической системе или к совокупности алгебраических систем.

Задача 4. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin(x + y) = 0, \\ x^2 + y^2 = 2. \end{cases} \quad (5)$$

Решение. Из первого уравнения системы (5) находим, что

$$x + y = \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

При

$$x = -y + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

второе уравнение системы (5) будет иметь вид

$$2y^2 - 2k\pi y + k^2\pi^2 - 2 = 0. \quad (6)$$

Таким образом, система (5) совместна, когда у квадратного уравнения (6) дискриминант неотрицательный:

$$16 - 4k^2\pi^2 \geq 0 \iff k^2 \leq \frac{4}{\pi^2} \iff |k| \leq \frac{2}{\pi}.$$

Это возможно лишь при $k = 0$, так как $k \in \mathbb{Z}$, а $\frac{2}{\pi} < 1$.

Если $k = 0$, то уравнение (6) имеет вид:

$$2y^2 - 2 = 0 \iff y^2 = 1 \iff |y| = 1 \iff y = \pm 1.$$

Следовательно, множество решений системы (5) состоит из двух упорядоченных пар $(-1, 1)$ и $(1, -1)$.

Ответ: $\{(-1, 1), (1, -1)\}$.

Задача 5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} |x| + |y| = 3, \\ \sin \frac{\pi x^2}{2} = 1. \end{cases} \quad (7)$$

Решение. Из второго уравнения системы (7) находим, что

$$\frac{\pi x^2}{2} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \iff x^2 = 1 + 4n \iff |x| = \sqrt{1 + 4n},$$

где n — целое число, такое, что

$$1 + 4n \geq 0 \iff n \geq -\frac{1}{4}.$$

Значит, n — целое неотрицательное число.

Первое уравнение системы (7) приводим к виду

$$|y| = 3 - \sqrt{1 + 4n}.$$

Отсюда, в виду того что $|y| \geq 0$ при любом y , получаем:

$$\sqrt{1 + 4n} \leq 3 \iff 0 \leq 1 + 4n \leq 9 \iff -\frac{1}{4} \leq n \leq 2.$$

Следовательно, целое неотрицательное число $n = 0$, или $n = 1$, или $n = 2$.

Таким образом, система (7) равносильна совокупности трех систем:

$$\begin{cases} |x| = 1, \\ |y| = 2, \end{cases} \quad \begin{cases} |x| = \sqrt{5}, \\ |y| = 3 - \sqrt{5}, \end{cases} \quad \begin{cases} |x| = 3, \\ |y| = 0. \end{cases}$$

Отсюда находим множество решений системы (7), которое состоит из десяти упорядоченных пар:

$$\begin{aligned} &(-1, -2), (-1, 2), (1, -2), (1, 2), (-\sqrt{5}, \sqrt{5} - 3), \\ &(-\sqrt{5}, 3 - \sqrt{5}), (\sqrt{5}, \sqrt{5} - 3), (\sqrt{5}, 3 - \sqrt{5}), (-3, 0), (3, 0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } &\{(-1, -2), (-1, 2), (1, -2), (1, 2), (-\sqrt{5}, \sqrt{5} - 3), \\ &(-\sqrt{5}, 3 - \sqrt{5}), (\sqrt{5}, \sqrt{5} - 3), (\sqrt{5}, 3 - \sqrt{5}), (-3, 0), (3, 0)\}. \end{aligned}$$

Задача 6. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = \sin(x + y), \\ |x| + |y| = 1. \end{cases} \quad (8)$$

Решение. Первое уравнение системы (8) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \iff \\ \iff 2 \sin \frac{x+y}{2} \left(\cos \frac{x-y}{2} - \cos \frac{x+y}{2} \right) &= 0 \iff \\ \iff 4 \sin \frac{x+y}{2} \sin \left(-\frac{y}{2} \right) \sin \frac{x}{2} &= 0 \iff \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} \sin \frac{x+y}{2} = 0. \end{aligned}$$

Тогда система (8) равносильна совокупности трех систем:

$$\begin{cases} \sin \frac{x}{2} = 0, \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2\pi k, \\ |x| + |y| = 1, \forall k \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin \frac{y}{2} = 0, \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2\pi k, \\ |x| + |y| = 1, \forall k \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin \frac{x+y}{2} = 0, \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = 2\pi k, \\ |x| + |y| = 1, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Первая система совокупности имеет решения только при $k = 0$ (при других k модуль $|x| > 1$), и ее решениями будут упорядоченные пары чисел

$$(0, -1) \text{ и } (0, 1).$$

Аналогично получаем решения второй системы совокупности в виде упорядоченных пар

$$(-1, 0) \text{ и } (1, 0).$$

Третья система совокупности имеет решения только при $k = 0$, так как при других k модуль $|2\pi k| > 6$ и

$$|x| + |y| \geq |x+y| = |2\pi k| > 6.$$

Следовательно,

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ |x| + |y| = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -x, \\ 2|x| = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = -0,5, \\ y = 0,5, \end{cases} \\ \begin{cases} x = 0,5, \\ y = -0,5. \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), (-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1) \right\}.$$

В некоторых случаях, прежде чем исключить переменную, бывает полезно выполнить некоторые преобразования.

Задача 7. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x \cos y + \sin^2 \frac{x}{2} \sin y = \cos^2 \frac{x}{2} \sin y, \\ 2x - y = \frac{\pi}{2}. \end{cases} \quad (9)$$

Решение. Первое уравнение системы (9) равносильно уравнению

$$\sin x \cos y - \sin y \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) = 0 \iff$$

$$\iff \sin x \cos y - \sin y \cos x = 0 \iff \sin(x - y) = 0.$$

Тогда система (9) равносильна системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin(x - y) = 0, \\ 2x - y = \frac{\pi}{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} y = 2x - \frac{\pi}{2}, \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} y = 2x - \frac{\pi}{2}, \\ \cos x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ y = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{2} (2n + 1), \frac{\pi}{2} (4n + 1) \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 8. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin(\pi(x-y)) + \sqrt{3} \cos(\pi(x-y)) = -2, \\ x^2 + y^2 = \frac{25}{72}. \end{cases} \quad (10)$$

Решение. Преобразуем первое уравнение системы (10):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sin(\pi(x-y)) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\pi(x-y)) &= -1 \iff \\ \iff \sin(\pi(x-y)) \cos \frac{\pi}{3} + \cos(\pi(x-y)) \sin \frac{\pi}{3} &= -1 \iff \\ \iff \sin\left(\pi\left(x-y+\frac{1}{3}\right)\right) &= -1 \iff \pi\left(x-y+\frac{1}{3}\right) = \pi\left(-\frac{1}{2}+2k\right) \iff \\ \iff x-y &= -\frac{5}{6} + 2k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Из второго уравнения системы (10) следует, что

$$x^2 = \frac{25}{72} - y^2 \implies x^2 \leq \frac{25}{72} \iff |x| \leq \frac{5}{6\sqrt{2}} \iff -\frac{5\sqrt{2}}{12} \leq x \leq \frac{5\sqrt{2}}{12}.$$

Аналогично получаем оценку:

$$-\frac{5\sqrt{2}}{12} \leq y \leq \frac{5\sqrt{2}}{12} \iff -\frac{5\sqrt{2}}{12} \leq -y \leq \frac{5\sqrt{2}}{12}.$$

Следовательно,

$$-\frac{5\sqrt{2}}{6} \leq x-y \leq \frac{5\sqrt{2}}{6}.$$

Значит,

$$-\frac{5\sqrt{2}}{6} \leq -\frac{5}{6} + 2k \leq \frac{5\sqrt{2}}{6} \iff \frac{5(1-\sqrt{2})}{12} \leq k \leq \frac{5(1+\sqrt{2})}{12}.$$

Так как

$$\begin{aligned}
 50 < 289 &\iff \sqrt{50} < \sqrt{289} \iff 5\sqrt{2} < 17 \iff \\
 &\iff -5\sqrt{2} > -17 \iff 5 - 5\sqrt{2} > -12 \iff \frac{5(1-\sqrt{2})}{12} > -1,
 \end{aligned}$$

а

$$50 > 49 \iff 5\sqrt{2} > 7 \iff 5 + 5\sqrt{2} > 12 \iff \frac{5(1+\sqrt{2})}{12} > 1,$$

но

$$50 < 361 \iff 5\sqrt{2} < 19 \iff 5 + 5\sqrt{2} < 24 \iff \frac{5(1+\sqrt{2})}{12} < 2,$$

то целое число $k = 0$ или $k = 1$.

Если $k = 0$, то $x - y = -\frac{5}{6}$.

Подставив $x = y - \frac{5}{6}$ во второе уравнение системы (8), получим:

$$\begin{aligned}
 \left(y - \frac{5}{6}\right)^2 + y^2 &= \frac{25}{72} \iff 2y^2 - \frac{5}{3}y + \frac{25}{36} - \frac{25}{72} = 0 \iff \\
 &\iff y^2 - \frac{5}{6}y + \frac{25}{144} = 0 \iff \left(y - \frac{5}{12}\right)^2 = 0 \iff y = \frac{5}{12}.
 \end{aligned}$$

Тогда

$$x = \frac{5}{12} - \frac{5}{6} = -\frac{5}{12}.$$

Следовательно, упорядоченная пара $\left(-\frac{5}{12}, \frac{5}{12}\right)$ будет решением системы (10).

Если $k = 1$, то $x - y = \frac{7}{6}$.

Подставив $x = y + \frac{7}{6}$ во второе уравнение системы (10), получим:

$$\left(y + \frac{7}{6}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{72} \iff 2y^2 + \frac{7}{3}y + \frac{49}{36} - \frac{25}{72} = 0 \iff$$

$$\Leftrightarrow y^2 + 2 \cdot \frac{7}{12}y + \frac{49}{144} - \frac{49}{144} + \frac{73}{144} = 0 \Leftrightarrow \left(y + \frac{7}{12}\right)^2 + \frac{24}{144} = 0.$$

Это уравнение не имеет решений, так как выражение в его левой части положительное при любом y .

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{5}{12}, \frac{5}{12} \right) \right\}.$$

Рассмотренные в задачах 1 – 8 системы состояли из одного тригонометрического уравнения и одного алгебраического уравнения. Методом исключения переменной решаются и системы, у которых каждое уравнение содержит тригонометрические функции.

Задача 9. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 2 \sin x \sin y + \cos x = 0, \\ 1 + \sin y \cos x = 2 \cos^2 y \sin x. \end{cases} \quad (11)$$

Решение. Из первого уравнения системы (11) находим, что

$$\cos x = -2 \sin x \sin y.$$

Тогда из второго уравнения системы (11) получаем:

$$\begin{aligned} 1 + \sin y(-2 \sin x \sin y) &= 2 \cos^2 y \sin x \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 1 &= 2 \sin x (\sin^2 y + \cos^2 y) \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Система (11) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin x = 0,5, \\ \cos x = -2 \sin y \sin x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0,5, \\ \sin y = -\cos x. \end{cases}$$

Поскольку уравнение

$$\sin x = 0,5 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

то система (11) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \\ \sin y = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = (-1)^{n+1} \cdot \frac{\pi}{3} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \\ \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{3} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k, -\frac{\pi}{3} + 2\pi p \right), \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{4\pi}{3} + 2\pi p \right), \right.$
 $\left. \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{3} + 2\pi p \right), \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \frac{2\pi}{3} + 2\pi p \right) \right\}, \forall k, p \in \mathbb{Z}.$

Задача 10. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y = 1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y, \\ \sin 2y - \sqrt{2} \sin x = 1. \end{cases} \quad (12)$$

Решение. Поскольку тригонометрическая система

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y = 0, \\ 1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x = -\operatorname{tg} y, \\ 1 + \operatorname{tg}^2 y = 0 \end{cases}$$

не имеет решений, так как сумма $1 + a^2 \neq 0$ при любом $a \in \mathbb{R}$, то возможно деление первого уравнения системы (12) на $1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y$.

В результате получаем, что первое уравнение системы (12) равносильно уравнению

$$\frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y} = 1. \quad (13)$$

Использував формулу тангенса суммы

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta},$$

которая имеет место, когда $\alpha + \beta$, α , β не равны $\frac{\pi}{2} + \pi l$, $\forall l \in \mathbb{Z}$, устанавливаем, что уравнение (13) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(x + y) = 1 &\iff x + y = \frac{\pi}{4} + \pi m \iff \\ &\iff y = -x + \frac{\pi}{4} + \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}, \end{aligned} \quad (14)$$

при условии, что

$$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}, \quad (15)$$

$$y \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

При любых целых m и k

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} + \pi k \neq -x + \frac{\pi}{4} + \pi m &\iff x \neq -\frac{\pi}{4} + \pi(m - k) \iff \\ &\iff x \neq -\frac{\pi}{4} + \pi p, \forall p \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad (16)$$

Таким образом, из первого уравнения системы (12) получено, что неизвестная y выражается через неизвестную x по формуле (14) при условии, что неизвестная x удовлетворяет неравенствам (15) и (16).

Заменой (14) второе уравнение системы (12) приводим к виду

$$\begin{aligned} \sin\left(-2x + \frac{\pi}{2} + 2\pi m\right) - \sqrt{2} \sin x &= 1 \iff \\ \iff \cos 2x - \sqrt{2} \sin x - 1 &= 0 \iff (1 - \cos 2x) + \sqrt{2} \sin x = 0 \iff \\ \iff 2 \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x &= 0 \iff \sqrt{2} \sin x(1 + \sqrt{2} \sin x) = 0 \iff \\ \iff \begin{cases} \sin x = 0, \\ \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} x = \pi s, \\ x = (-1)^{s+1} \cdot \frac{\pi}{4} + \pi s, \end{cases} \forall s \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Поскольку неизвестная x такая, что выполняются неравенства (15) и (16), а $(-1)^{s+1} \cdot \frac{\pi}{4} + \pi s = -\frac{\pi}{4} + \pi p$ при $s = p = 2r$, $r \in \mathbb{Z}$, то из всего

множества полученных значений x системе (12) удовлетворяют лишь

$$x = \pi s, \forall s \in \mathbb{Z}, \text{ и } x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi r, \forall r \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, решениями системы (12) будут:

$$\begin{cases} x = \pi s, \\ y = \frac{\pi}{4} + \pi(m - s), \forall m \in \mathbb{Z}, \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi s, \forall s \in \mathbb{Z}, \\ y = \frac{\pi}{4} + \pi q, \forall q \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

и

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi(2r + 1), \\ y = \pi(m - 2r - 1), \forall m \in \mathbb{Z}, \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi(2r + 1), \forall r \in \mathbb{Z}, \\ y = \pi q, \forall q \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\pi r, \frac{\pi}{4} (4q + 1) \right), \left(\frac{\pi}{4} (8r + 5), \pi q \right) \right\}, \forall r, q \in \mathbb{Z}.$$

Одна из специфических особенностей тригонометрических систем состоит в составлении множества решений.

В задачах 4 – 6 и 8 множество решений тригонометрической системы состоит из конечного числа упорядоченных пар; в задачах 1 – 3, 7, 9 и 10 множество решений бесконечно.

В задачах 1 – 3 и 7 множество решений составлено с использованием *одного* целочисленного параметра, а в задачах 9 и 10 множество решений системы составлено с использованием *двух* целочисленных параметров.

Каждое из этих множеств решений предопределено системой, отражает ее суть и получено вполне обоснованно.

Возможный характер ошибок в этой специфической особенности тригонометрических систем рассмотрим на основании задачи 10.

Если в равенствах $x = \pi s$ и $x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi r$ вместо s и r написать m , т.е. тот параметр, который был уже использован в записи $y = -x + \frac{\pi}{4} + \pi m$, то получим значения:

$$x = \pi m, y = -\pi m + \frac{\pi}{4} + \pi m = \frac{\pi}{4}, \forall m \in \mathbb{Z},$$

и

$$x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi m, y = -\frac{5\pi}{4} - 2\pi m + \frac{\pi}{4} + \pi m = -\pi(m+1),$$

где m — любое целое число.

Они будут решениями системы (12). Однако эти числа составляют лишь часть решений системы (12).

Рассуждаем следующим образом.

Поскольку $y = -x + \frac{\pi}{4} + \pi m$, а при каждом фиксированном целом m переменная $x = \pi s$, где s — любое целое число, то значение переменной

$$y = -\pi s + \frac{\pi}{4} + \pi m = \frac{\pi}{4} + \pi(m-s)$$

при выделенном целом m и произвольном целом s .

В силу произвольности выбора m может быть любым целым числом, поэтому решениями системы (12) будут все упорядоченные пары чисел

$$\left(\pi s, \frac{\pi}{4} + \pi q\right), \forall s, q \in \mathbb{Z}.$$

Аналогично для $x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi r, \forall r \in \mathbb{Z}$, при каждом фиксированном целом m получаем множество значений переменной

$$y = -\left(\frac{5\pi}{4} + 2\pi r\right) + \frac{\pi}{4} + \pi m = \pi(m-2r-1),$$

где r — любое целое число.

Далее, учитывая, что рассуждения проводились для про-

извольного целого числа m , заключаем, что при любых целых r и q упорядоченные пары чисел $\left(\frac{\pi}{4} + \pi(2r + 1), \pi q\right)$ будут решениями системы (12).

В задачах 1 – 10 системы методом исключения переменной сводились к решению одного уравнения.

Методом исключения переменной можно тригонометрическую систему привести к системе с меньшим числом уравнений.

Задача 11. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} x + y + z = \pi, \\ \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z = 6. \end{cases} \quad (17)$$

Решение. Из первого уравнения системы (17) выражаем

$$z = \pi - (x + y).$$

При этом

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ \operatorname{tg} y \operatorname{tg}(\pi - (x + y)) = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ \operatorname{tg} y \operatorname{tg}(x + y) = -6 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ \operatorname{tg} y \cdot \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y} = -6 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y + \operatorname{tg}^2 y = 12 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ 3 + \operatorname{tg}^2 y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ \operatorname{tg}^2 y = 9 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 3, \\ |\operatorname{tg} y| = 3 \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \begin{cases} \operatorname{tg} y = -3, \\ \operatorname{tg} x = -1, \end{cases} \\ \begin{cases} \operatorname{tg} y = 3, \\ \operatorname{tg} x = 1 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \\ y = -\operatorname{arctg} 3 + \pi k, \end{cases} \\ \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = \operatorname{arctg} 3 + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Значит, множество упорядоченных троек

$$\left\{ \left(-\frac{\pi}{4} + \pi n, -\arctg 3 + \pi k, \frac{5\pi}{4} + \arctg 3 - \pi(n+k) \right), \right. \\ \left. \left(\frac{\pi}{4} + \pi n, \arctg 3 + \pi k, \frac{3\pi}{4} - \arctg 3 - \pi(n+k) \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}$$

является множеством решений системы (17).

Пусть

$$A = \arctg 2 + \arctg 3.$$

Тогда

$$\operatorname{tg} A = \operatorname{tg}(\arctg 2 + \arctg 3) = \frac{\operatorname{tg} \arctg 2 + \operatorname{tg} \arctg 3}{1 - \operatorname{tg} \arctg 2 \operatorname{tg} \arctg 3} = \frac{2 + 3}{1 - 2 \cdot 3} = -1.$$

Найдем A по заданному значению тангенса этого аргумента.

Для того чтобы эта задача разрешалась однозначно, нужно указать пределы изменения A .

Так как

$$\frac{\pi}{4} < \arctg 2 < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{4} < \arctg 3 < \frac{\pi}{2},$$

то сумма арктангенсов

$$\frac{\pi}{2} < \arctg 2 + \arctg 3 < \pi.$$

Значит, из равенства $\operatorname{tg} A = -1$ следует, что $A = \frac{3\pi}{4}$, т.е.

$$\arctg 2 + \arctg 3 = \frac{3\pi}{4}.$$

Отсюда

$$\frac{3\pi}{4} - \arctg 3 = \arctg 2, \quad \text{а} \quad \arctg 3 - \frac{3\pi}{4} = -\arctg 2,$$

и множество решений системы (17) состоит из упорядоченных троек

$$\left(-\frac{\pi}{4} + \pi n, -\arctg 3 + \pi k, -\arctg 2 - \pi(n+k-2) \right),$$

$$\left(\frac{\pi}{4} + \pi n, \arctg 3 + \pi k, \arctg 2 - \pi(n + k)\right), \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{\pi}{4} + \pi n, -\arctg 3 + \pi k, -\arctg 2 - \pi(n + k - 2) \right), \right. \\ \left. \left(\frac{\pi}{4} + \pi n, \arctg 3 + \pi k, \arctg 2 - \pi(n + k) \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Рассмотрим случай, когда исключением переменной не получаем оптимальный путь решения тригонометрической системы уравнений.

Задача 12. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} = \operatorname{tg} \frac{x+y}{2}, \\ \cos 2x = -\frac{1}{2}. \end{cases} \quad (18)$$

Решение. Тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} = \operatorname{tg} \frac{x+y}{2} &\iff \frac{\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{2}\right)}{\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2}} - \frac{\sin \frac{x+y}{2}}{\cos \frac{x+y}{2}} = 0 \iff \\ &\iff \frac{\sin \frac{x+y}{2} \left(\cos \frac{x+y}{2} - \cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \right)}{\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x+y}{2}} = 0 \iff \\ &\iff \frac{\sin \frac{x+y}{2} \left(\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} - \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} - \cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \right)}{\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x+y}{2}} = 0 \iff \\ &\iff \frac{\sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2}}{\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x+y}{2}} = 0 \iff \begin{cases} \sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2} \sin \frac{x+y}{2} = 0, \\ \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \neq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Второе уравнение системы (18)

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \iff x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

При этом $\sin \frac{x}{2} \neq 0$ и $\cos \frac{x}{2} \neq 0$, значит, первое уравнение системы (18) равносильно тому, что

$$\sin \frac{y}{2} \sin \frac{x+y}{2} = 0, \text{ а } \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x+y}{2} \neq 0.$$

Если $\sin \frac{y}{2} = 0$, то $\cos \frac{y}{2} \neq 0$.

Уравнение

$$\sin \frac{y}{2} = 0 \iff y = 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

значит, упорядоченные пары

$$\left(-\frac{\pi}{3} + \pi k, 2\pi n\right) \text{ и } \left(\frac{\pi}{3} + \pi k, 2\pi n\right)$$

при любых целых k и n являются решениями системы (18), так как

$$\cos \frac{x+y}{2} = \cos \left(\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} k + \pi n\right) \neq 0.$$

Если $\sin \frac{x+y}{2} = 0$, то $\cos \frac{x+y}{2} \neq 0$.

Уравнение

$$\sin \frac{x+y}{2} = 0 \iff x+y = 2\pi n \iff y = -x + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Если $x = -\frac{\pi}{3} + \pi k$, то $y = \frac{\pi}{3} + \pi(2n - k)$, $\forall k, n \in \mathbb{Z}$.

Если $x = \frac{\pi}{3} + \pi k$, то $y = -\frac{\pi}{3} + \pi(2n - k)$, $\forall k, n \in \mathbb{Z}$.

Если $y = \pm \frac{\pi}{3} + \pi(2n - k)$, то

$$\cos \frac{y}{2} = \cos \left(\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} (2n - k)\right) \neq 0, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, упорядоченные пары чисел

$$\left(-\frac{\pi}{3} + \pi k, \frac{\pi}{3} + \pi(2n - k)\right), \left(\frac{\pi}{3} + \pi k, -\frac{\pi}{3} + \pi(2n - k)\right), \forall k, n \in \mathbb{Z},$$

являются решениями системы (18).

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{\pi}{3} + \pi k, 2\pi n\right), \left(-\frac{\pi}{3} + \pi k, \frac{\pi}{3} + \pi(2n - k)\right), \right. \\ \left. \left(\frac{\pi}{3} + \pi k, 2\pi n\right), \left(\frac{\pi}{3} + \pi k, -\frac{\pi}{3} + \pi(2n - k)\right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Замечание 1. Второе уравнение системы (18)

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \iff x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Это позволяет исключить переменную x , приведя первое уравнение системы (18) к уравнениям:

$$\operatorname{tg}\left(\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} k\right) + \operatorname{tg} \frac{y}{2} = \operatorname{tg}\left(\frac{y}{2} \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} k\right), \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Эти тригонометрические уравнения решаются весьма не компактно. Поэтому метод исключения переменной в случае системы (18) нельзя считать предпочтительным в сравнении с предложенным.

Задача 13. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} - \operatorname{ctg} \frac{z}{2} = 0, \\ \cos(x - y - z) = 0,5, \\ x + y + z = \pi. \end{cases} \quad (19)$$

Решение. Методом исключения переменной, выразив из третьего уравнения системы (19)

$$z = \pi - (x + y)$$

и подставив полученный результат в первое и второе уравнения системы (19), получим систему из двух тригонометрических уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} - \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x+y}{2}\right) = 0, \\ \cos(x - y - \pi + (x + y)) = 0,5 \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} = \operatorname{tg} \frac{x+y}{2}, \\ \cos 2x = -0,5. \end{cases}$$

Полученная система решена в предыдущей задаче.

На основании множества решений системы (18), учитывая то, как неизвестная z выражается из третьего уравнения системы (19) через неизвестные x и y , находим множество решений системы (19).

Ответ:

$$\left\{ \left(-\frac{\pi}{3} + \pi k, 2\pi n, \frac{4\pi}{3} - \pi(k+2n) \right), \left(-\frac{\pi}{3} + \pi k, \frac{\pi}{3} + \pi(2n-k), \pi(1-2n) \right), \right. \\ \left. \left(\frac{\pi}{3} + \pi k, 2\pi n, \frac{2\pi}{3} - \pi(k+2n) \right), \left(\frac{\pi}{3} + \pi k, -\frac{\pi}{3} + \pi(2n-k), \pi(1-2n) \right) \right\},$$

где k и n — любые целые числа.

Рассмотрим систему, на примере которой покажем еще один специфический подход в решении тригонометрических систем, который часто предпочтительнее метода исключения переменной.

Задача 14. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos(x-y) = \frac{1}{2}, \\ \cos(x+y) = -\frac{1}{2}. \end{cases} \quad (20)$$

Решение. С п о с о б 1. Уравнения

$$\cos(x-y) = \frac{1}{2} \iff x-y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

$$\cos(x+y) = -\frac{1}{2} \iff x+y = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Система (20) равносильна совокупности четырех систем:

$$\begin{cases} x-y = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x+y = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi(k+n), \\ y = \frac{\pi}{6} + \pi(k-n), \end{cases} \forall k, n \in \mathbb{Z};$$

$$\begin{cases} x - y = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x + y = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + \pi(k + n), \\ y = -\frac{\pi}{2} + \pi(k - n), \forall k, n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x + y = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \pi(k + n), \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi(k - n), \forall k, n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x + y = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + \pi(k + n), \\ y = -\frac{\pi}{6} + \pi(k - n), \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

С п о с о б 2. Из первого уравнения системы (20) находим, что

$$\cos(x - y) = \frac{1}{2} \iff x - y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n \iff x = y \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Тогда система (20) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x = y + \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ \cos\left(2y + \frac{\pi}{3} + 2\pi n\right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ \cos\left(2y + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ 2y + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi l, \end{cases} \\ \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ 2y + \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi l \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi(2n + l), \\ y = \frac{\pi}{6} + \pi l, \end{cases} \\ \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + \pi(2n + l), \\ y = -\frac{\pi}{2} + \pi l, \forall n, l \in \mathbb{Z}; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ \cos\left(2y - \frac{\pi}{3} + 2\pi n\right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \\
& \iff \begin{cases} \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ 2y - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi l, \end{cases} \\ \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ 2y - \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi l \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \pi(2n + l), \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi l, \end{cases} \\ \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + \pi(2n + l), \\ y = -\frac{\pi}{6} + \pi l, \forall n, l \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{cases}
\end{aligned}$$

Если заменить целое число l на разность $k - n$ целых чисел k и n , то полученные решения системы (20) приведем к видам, которые они имеют в способе 1.

Наоборот, если в решениях системы (20), найденных способом 1, заменить целое число k на сумму $l + n$ целых чисел l и n , то получим решения этой системы, найденные способом 2.

Такие замены правомочны, так как k, l, n — любые целые числа.

Ответ:

$$\begin{aligned}
& \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \pi(k+n), \frac{\pi}{6} + \pi(k-n) \right), \left(-\frac{\pi}{6} + \pi(k+n), -\frac{\pi}{2} + \pi(k-n) \right), \right. \\
& \left. \left(\frac{\pi}{6} + \pi(k+n), \frac{\pi}{2} + \pi(k-n) \right), \left(-\frac{\pi}{2} + \pi(k+n), -\frac{\pi}{6} + \pi(k-n) \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

Замечание 2. Во втором способе решения легко допустить ошибку, осуществив при $x = y \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$, где n — любое целое число, во втором уравнении системы (20) следующий переход:

$$\cos\left(2y \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n\right) = -\frac{1}{2} \iff \begin{cases} \cos\left(2y + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}, \\ \cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

При этом не указав, что уравнение

$$\cos\left(2y + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

рассматривается при $x = y + \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}$, а уравнение

$$\cos\left(2y - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

рассматривается при $x = y - \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}$.

Оценивая два способа решения, можем констатировать, что, отказавшись от метода исключения переменной в рассмотренной задаче, нашли более оптимальный и простой метод ее решения.

В этом и заключается еще один специфический подход к решению систем тригонометрических уравнений: *проведение таких тождественных преобразований, после которых одно или несколько уравнений распадутся на простейшие уравнения видов:*

$$\sin(\alpha x + \beta y) = a, \quad \cos(\alpha x + \beta y) = a,$$

$$\operatorname{tg}(\alpha x + \beta y) = a, \quad \operatorname{ctg}(\alpha x + \beta y) = a.$$

Приведем решения, основанные на таком подходе.

Задача 15. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin(x - y) = 3 \sin x \cos y - 1, \\ \sin(x + y) = -2 \cos x \sin y. \end{cases} \quad (21)$$

Решение. Система (21) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin x \cos y - \cos x \sin y = 3 \sin x \cos y - 1, \\ \sin x \cos y + \cos x \sin y = -2 \cos x \sin y \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} 2 \sin x \cos y + \sin y \cos x = 1, \\ \sin x \cos y + 3 \sin y \cos x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -5 \sin x \cos y = -3, \\ -5 \sin y \cos x = 1 \end{cases} \iff$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \cos y = \frac{3}{5}, \\ \sin y \cos x = -\frac{1}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \cos y + \cos x \sin y = \frac{2}{5}, \\ \sin x \cos y - \cos x \sin y = \frac{4}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x+y) = \frac{2}{5}, \\ \sin(x-y) = \frac{4}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2}{5} + \pi n, \\ x-y = (-1)^m \cdot \arcsin \frac{4}{5} + \pi m \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \left((-1)^n \cdot \arcsin \frac{2}{5} + (-1)^m \cdot \arcsin \frac{4}{5} + \pi(n+m) \right), \\ y = \frac{1}{2} \left((-1)^n \cdot \arcsin \frac{2}{5} + (-1)^{m+1} \cdot \arcsin \frac{4}{5} + \pi(n-m) \right), \end{cases}
\end{aligned}$$

где m и n — любые целые числа.

$$\begin{aligned}
&\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{1}{2} \left((-1)^n \cdot \arcsin \frac{2}{5} + (-1)^m \cdot \arcsin \frac{4}{5} + \pi(n+m) \right), \right. \right. \\
&\left. \left. \frac{1}{2} \left((-1)^n \cdot \arcsin \frac{2}{5} + (-1)^{m+1} \cdot \arcsin \frac{4}{5} + \pi(n-m) \right) \right) \right\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

Задача 16. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos^2 x \sin y - \sin x \cos x \cos y - \sin x \cos(x-y) = 0, \\ \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2y = 0. \end{cases} \quad (22)$$

Решение. Первое уравнение системы (22) равносильно уравнению

$$\cos^2 x \sin y - \sin x (\cos x \cos y + \cos x \cos y + \sin x \sin y) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \cos^2 x \sin y - \sin^2 x \sin y - 2 \sin x \cos x \cos y = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sin y \cos 2x - \cos y \sin 2x = 0 \Leftrightarrow \sin(y-2x) = 0.$$

Второе уравнение системы (22) равносильно уравнению

$$\frac{\sin x \cos 2y + \cos x \sin 2y}{\cos x \cos 2y} = 0 \iff \frac{\sin(x + 2y)}{\cos x \cos 2y} = 0.$$

Тогда система (22) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin(y - 2x) = 0, \\ \sin(x + 2y) = 0, \\ \cos x \cos 2y \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y - 2x = \pi n, \\ 2y + x = \pi m, \\ \cos x \cos 2y \neq 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{5}(m - 2n), \\ y = \frac{\pi}{5}(2m + n), \\ x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}s, \forall s \in \mathbb{Z}, \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{5}(m - 2n), \\ y = \frac{\pi}{5}(2m + n), \forall m, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Все полученные значения неизвестных x и y являются решениями системы (22), так как если допустить равенство

$$\frac{\pi}{5}(m - 2n) = \frac{\pi}{2} + \pi k \iff m - 2n - 5k = \frac{5}{2}$$

и равенство

$$\frac{\pi}{5}(2m + n) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}s \iff 4m + 2n - 5s = \frac{5}{2},$$

то всякий раз получим противоречие, состоящее в том, что алгебраическая сумма целых чисел является дробным числом $2,5$.

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{5}(m - 2n), \frac{\pi}{5}(2m + n) \right) \right\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

§ 2. Метод подстановки (замены переменных)

Следующий распространенный подход в решении тригонометрических систем состоит в замене переменных.

Если система содержит несколько комбинаций тригонометрических функций или приводится к такого вида системе, то следует проверить возможность сведения этой системы к более простой системе (в частности, к алгебраической) путем обозначения этих комбинаций новыми переменными.

Задача 1. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 3x + 4 \sin y = -11, \\ -2x + 5 \sin y = \frac{7}{2}. \end{cases} \quad (1)$$

Решение. Подстановкой

$$\sin y = u$$

тригонометрическую систему (1) приводим к линейной системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3x + 4u = -11, \\ -2x + 5u = \frac{7}{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} 2 \cdot 4u + 3 \cdot 5u = 2 \cdot (-11) + 3 \cdot \frac{7}{2}, \\ 5 \cdot 3x - 4 \cdot (-2x) = 5 \cdot (-11) - 4 \cdot \frac{7}{2} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} 23u = -\frac{23}{2}, \\ 23x = -69 \end{cases} \iff \begin{cases} u = -\frac{1}{2}, \\ x = -3. \end{cases} \end{aligned}$$

Тогда система (1) равносильна системе

$$\begin{cases} x = -3, \\ \sin y = -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3, \\ y = (-1)^{m+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(-3, (-1)^{m+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi m \right) \right\}, \forall m \in \mathbb{Z}.$

Задача 2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin^2(-2x) - (3 - \sqrt{2}) \operatorname{tg} 5y = \frac{1}{2} (3\sqrt{2} - 1), \\ \operatorname{tg}^2 5y + (3 - \sqrt{2}) \sin(-2x) = \frac{1}{2} (3\sqrt{2} - 1). \end{cases} \quad (2)$$

Решение. Подстановкой

$$\sin(-2x) = u, \quad \operatorname{tg} 5y = v$$

тригонометрическую систему (2) приводим к алгебраической системе

$$\begin{cases} u^2 - (3 - \sqrt{2})v = \frac{3\sqrt{2} - 1}{2}, \\ v^2 + (3 - \sqrt{2})u = \frac{3\sqrt{2} - 1}{2}. \end{cases} \quad (3)$$

Из системы (3) получаем, что

$$\begin{aligned} u^2 - (3 - \sqrt{2})v &= v^2 + (3 - \sqrt{2})u \iff \\ \iff (u^2 - v^2) - (3 - \sqrt{2})(v + u) &= 0 \iff \\ \iff (v + u)(u - v - 3 + \sqrt{2}) &= 0 \iff \begin{cases} v = -u, \\ v = u - 3 + \sqrt{2}. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, система (3) равносильна совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{cases} v = -u, \\ u^2 - (3 - \sqrt{2})v = \frac{3\sqrt{2} - 1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} v = -u, \\ u^2 + (3 - \sqrt{2})u - \frac{3\sqrt{2} - 1}{2} = 0 \end{cases}$$

имеет два решения:

$$u_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad v_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{и} \quad u_2 = \frac{\sqrt{2}(1 - 3\sqrt{2})}{2}, \quad v_2 = \frac{\sqrt{2}(3\sqrt{2} - 1)}{2}.$$

Вторая система

$$\begin{cases} v = u - 3 + \sqrt{2}, \\ u^2 - (3 - \sqrt{2})v = \frac{3\sqrt{2} - 1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} v = u - 3 + \sqrt{2}, \\ u^2 - (3 - \sqrt{2})u + \frac{23 - 15\sqrt{2}}{2} = 0 \end{cases}$$

решений не имеет, так как содержит квадратное уравнение с отрицательным дискриминантом

$$D = (\sqrt{2} - 3)^2 - 2(23 - 15\sqrt{2}) = 24\sqrt{2} - 35 < 0.$$

Итак, у системы (3) два решения (u_1, v_1) и (u_2, v_2) , причем

$$|u_1| < 1, \quad \text{а} \quad |u_2| > 1.$$

Так как

$$|\sin(-2x)| \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

то система (2) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin(-2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \operatorname{tg} 5y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2}k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = -\frac{1}{5} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{5}n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left((-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2}k, -\frac{1}{5} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{5}n \right) \right\}, \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 4 \sin y - 6\sqrt{2} \cos x = 5 + 4 \cos^2 y, \\ \cos 2x = 0. \end{cases} \quad (4)$$

Решение. Система (4) равносильна системе

$$\begin{cases} 4 \sin y - 6\sqrt{2} \cos x = 9 - 4 \sin^2 y, \\ 2 \cos^2 x - 1 = 0. \end{cases}$$

Подстановкой

$$\cos x = u, \quad \sin y = v$$

эту тригонометрическую систему приводим к алгебраической системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4v^2 + 4v - 6\sqrt{2}u - 9 = 0, \\ 2u^2 - 1 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 4v^2 + 4v - 6\sqrt{2}u - 9 = 0, \\ |u| = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \begin{cases} u = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ 4v^2 + 4v - 15 = 0, \end{cases} \\ \begin{cases} u = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ 4v^2 + 4v - 3 = 0 \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} u = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \left(v - \frac{3}{2}\right)\left(v + \frac{5}{2}\right) = 0, \end{cases} \\ \begin{cases} u = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \left(v - \frac{1}{2}\right)\left(v + \frac{3}{2}\right) = 0 \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

с решениями

$$\begin{aligned} u_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, v_1 = -\frac{3}{2}; \quad u_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, v_2 = \frac{1}{2}; \\ u_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}, v_3 = -\frac{5}{2}; \quad u_4 = \frac{\sqrt{2}}{2}, v_4 = \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

причем

$$|v_1| > 1, \quad |v_3| > 1, \quad |v_4| > 1, \quad \text{а} \quad |u_2| < 1, \quad |v_2| < 1.$$

Учитывая подстановку и то, что

$$|\cos \alpha| \leq 1, \quad |\sin \alpha| \leq 1, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R},$$

систему (4) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \sin y = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = (-1)^m \cdot \frac{\pi}{6} + \pi m, \quad \forall m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, (-1)^m \cdot \frac{\pi}{6} + \pi m \right) \right\}, \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 3 является еще одним подтверждением того, что не всегда следует сразу использовать возможность исключения переменной из системы (из второго уравнения системы (4) можно найти x , а затем подставить в первое уравнение). Необходимо проверить другие возможности, которые иногда дают более рациональный путь решения.

Так, в задаче 12 предыдущего параграфа были предварительно выполнены преобразования, а в задаче 3 данного параграфа осуществлена замена.

Задача 4. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} [\sin x] \cdot \{\sin y\} = \sin x, \\ [\sin y] \cdot \{\sin x\} = -\sin y, \end{cases} \quad (5)$$

где $[p]$ — целая часть числа p , $\{p\}$ — дробная часть числа p .

Решение. Сумма

$$[p] + \{p\} = p, \quad \forall p \in \mathbb{R}.$$

Поэтому система (5) равносильна системе

$$\begin{cases} [\sin x] \cdot \{\sin y\} = [\sin x] + \{\sin x\}, \\ [\sin y] \cdot \{\sin x\} = -[\sin y] - \{\sin y\}. \end{cases} \quad (6)$$

Полагая, что

$$[\sin x] = m, \quad [\sin y] = n, \quad \{\sin x\} = a, \quad \{\sin y\} = b,$$

тригонометрическую систему (6) приводим к алгебраической системе

$$\begin{cases} mb = m + a, \\ na = -n - b. \end{cases} \quad (7)$$

Поскольку $|\sin \alpha| \leq 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$, то

$$0 \leq a < 1, \quad 0 \leq b < 1$$

а целые числа m, n таковы, что

$$|m| \leq 1, \quad |n| \leq 1.$$

В зависимости от m рассмотрим три логические возможности:

$$m = -1; \quad m = 0; \quad m = 1.$$

Если $m = -1$, то система (7) имеет вид:

$$\begin{cases} -b = -1 + a, \\ na = -n - b \end{cases} \iff \begin{cases} -b = -1 + a, \\ na = -n - 1 + a \end{cases} \iff \begin{cases} b = 1 - a, \\ (a + 1)n = a - 1. \end{cases}$$

Так как $0 \leq a < 1$, то $a + 1 \neq 0$, а значит,

$$n = \frac{a - 1}{a + 1} \iff n = 1 - \frac{2}{a + 1}.$$

Отсюда

$$\frac{2}{a + 1} = t, \quad \text{т.е.} \quad a + 1 = \frac{2}{t},$$

где t — целое ненулевое число.

Поскольку $0 \leq a < 1$, то $1 \leq a + 1 < 2$, а значит, $1 < t \leq 2$, и целое число $t = 2$.

Тогда при $a + 1 = \frac{2}{t}$, $b = 1 - a$ имеем

$$a = 0, \quad b = 1,$$

что невозможно, так как $0 \leq b < 1$.

Значит, при $m = -1$ у системы (7) решений нет.

Если $m = 0$, то из первого уравнения системы (7) следует, что

$$a = 0.$$

При этом второе уравнение системы (7) обращается в равенство

$$n + b = 0.$$

Учитывая обозначения, систему (5) приводим к виду

$$\begin{cases} [\sin x] = 0, \\ \{\sin x\} = 0, \\ \sin y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \sin x = 0, \\ \sin y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = \pi l, \quad \forall l \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

так как равенства $[p] = \{p\} = 0$ равносильны тому, что $p = 0$.

При $m = 1$ первое уравнение системы (7) приводим к равенству

$$b = a + 1,$$

которое невозможно при условии, что $0 \leq a < 1, 0 \leq b < 1$.

Ответ: $\{(\pi k, \pi l)\}, \forall k, l \in \mathbb{Z}$.

Иногда подстановка не столь очевидна, как об этом можно судить по рассмотренным задачам. Требуется предварительно выполнить ряд преобразований, прежде чем увидеть нужную подстановку.

Задача 5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} x(\cos y + \cos z) = 2, \\ x(\cos 2y + \cos 2z) = -2, \\ x(\cos 3y + \cos 3z) = -4. \end{cases} \quad (8)$$

Решение. Используя формулы

$$\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1, \quad \cos 3t = 4 \cos^3 t - 3 \cos t, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

систему (8) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} x(\cos y + \cos z) = 2, \\ x(\cos^2 y + \cos^2 z) = x - 1, \\ 4x(\cos^3 y + \cos^3 z) - 3x(\cos y + \cos z) = -4 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x(\cos y + \cos z) = 2, \\ x(\cos^2 y + \cos^2 z) = x - 1, \\ 2x(\cos^3 y + \cos^3 z) = 1. \end{cases}$$

Приняв обозначения

$$\cos y = a, \quad \cos z = b,$$

переходим к алгебраической системе

$$\begin{cases} x(a + b) = 2, \\ x(a^2 + b^2) = x - 1, \\ 2x(a^3 + b^3) = 1 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \begin{cases} x(a + b) = 2, \\ x(a + b)^2 - 2abx = x - 1, \\ 2x(a + b)((a + b)^2 - 3ab) = 1 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a+b=\frac{2}{x}, \\ ab=\frac{4+x-x^2}{2x^2}, \\ 4((a+b)^2-3ab)=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=\frac{2}{x}, \\ ab=\frac{4+x-x^2}{2x^2}, \\ 5x^2-6x-8=0. \end{cases}$$

У квадратного уравнения

$$5x^2 - 6x - 8 = 0$$

два корня: $x = -0,8$ и $x = 2$.

Если $x = -0,8$, то $a+b = -2,5$; если учесть подстановку, то

$$\cos y + \cos z = -2,5,$$

что невозможно, так как $|\cos \alpha| \leq 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

При $x = 2$ получаем, что

$$a+b=1, \quad ab=0,25.$$

По обратной теореме Виета a и b — корни квадратного уравнения

$$\lambda^2 - \lambda + 0,25 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 0,5)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0,5.$$

Значит, $a = b = 0,5$.

Учитывая подстановку, получаем:

$$\cos y = 0,5 \Leftrightarrow y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z};$$

$$\cos z = 0,5 \Leftrightarrow z = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \quad \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, множество решений системы (8) состоит из упорядоченных троек:

$$\left(2, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \left(2, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \\ \left(2, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \left(2, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(2, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \left(2, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \right.$$

$$\left(2, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi m\right), \left(2, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi m\right)\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 6. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sin y - \cos y, \\ 2 \sin 2x = \frac{3}{2} + \sin 2y. \end{cases} \quad (9)$$

Решение. Поскольку при любых действительных x и y

$$(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x,$$

$$(\sin y - \cos y)^2 = \sin^2 y + \cos^2 y - 2 \sin y \cos y = 1 - \sin 2y,$$

то

$$2 \sin 2x = 2(\sin x + \cos x)^2 - 2, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$\sin 2y = 1 - (\sin y - \cos y)^2, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Таким образом, система (9) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sin y - \cos y, \\ 2(\sin x + \cos x)^2 = \frac{9}{2} - (\sin y - \cos y)^2. \end{cases}$$

Подстановкой

$$\sin x + \cos x = u, \quad \sin y - \cos y = v$$

эту тригонометрическую систему приводим к алгебраической системе

$$\begin{cases} u = \frac{\sqrt{2}}{2} + v, \\ 2u^2 = \frac{9}{2} - v^2 \end{cases} \iff \begin{cases} u = \frac{\sqrt{2}}{2} + v, \\ 6v^2 + 4\sqrt{2}v - 7 = 0. \end{cases}$$

Квадратное уравнение

$$6v^2 + 4\sqrt{2}v - 7 = 0 \iff \begin{cases} v = -\frac{7\sqrt{2}}{6}, \\ v = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$$

Следовательно, решениями алгебраической системы будут

$$u_1 = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, v_1 = -\frac{7\sqrt{2}}{6} \quad \text{и} \quad u_2 = \sqrt{2}, v_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Таким образом, система (9) равносильна совокупности двух тригонометрических систем.

Первая система

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin x + \cos x = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, \\ \sin y - \cos y = -\frac{7\sqrt{2}}{6} \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, \\ \sin y - \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = -\frac{7\sqrt{2}}{6} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} 2\sin\frac{\pi}{4}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, \\ 2\cos\frac{\pi}{4}\sin\left(y - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{7\sqrt{2}}{6} \end{cases} \iff \begin{cases} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{2}{3}, \\ \sin\left(y - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{7}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

не имеет решений, так как

$$\left|\sin\left(y - \frac{\pi}{4}\right)\right| \leq 1, \forall y \in \mathbb{R}.$$

Вторая система

$$\begin{cases} \sin x + \cos x = \sqrt{2}, \\ \sin y - \cos y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sqrt{2}, \\ \sin y - \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \iff$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin \frac{\pi}{4} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2}, \\ 2 \cos \frac{\pi}{4} \sin \left(y - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 1, \\ \sin \left(y - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}, \\ y = \frac{\pi}{4} + (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{\pi}{4} + (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$

Задача 7. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \arcsin x \cdot \arcsin y = \frac{\pi^2}{12}, \\ \arccos x \cdot \arccos y = \frac{\pi^2}{24}. \end{cases} \quad (10)$$

Решение. Используя формулу

$$\arcsin t + \arccos t = \frac{\pi}{2}, \quad \forall t \in [-1; 1],$$

систему (10) заменяем равносильной системой

$$\begin{cases} \arcsin x \cdot \arcsin y = \frac{\pi^2}{12}, \\ \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x \right) \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin y \right) = \frac{\pi^2}{24}. \end{cases}$$

Подстановкой

$$\arcsin x = u, \quad \arcsin y = v$$

эту обратную тригонометрическую систему приводим к алгебраической системе

$$\begin{cases} uv = \frac{\pi^2}{12}, \\ \left(\frac{\pi}{2} - u\right)\left(\frac{\pi}{2} - v\right) = \frac{\pi^2}{24} \end{cases} \iff \begin{cases} uv = \frac{\pi^2}{12}, \\ u + v = \frac{7\pi}{12}. \end{cases}$$

Систему решим, следуя обратной теореме Виета.

Составим вспомогательное приведенное квадратное уравнение

$$\lambda^2 - \frac{7\pi}{12}\lambda + \frac{\pi^2}{12} = 0,$$

корнями которого являются числа $\frac{\pi}{3}$ и $\frac{\pi}{4}$.

Тогда корнями алгебраической системы будут

$$u_1 = \frac{\pi}{3}, v_1 = \frac{\pi}{4} \quad \text{и} \quad u_2 = \frac{\pi}{4}, v_2 = \frac{\pi}{3}.$$

Значит, система (10) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \arcsin x = \frac{\pi}{3}, \\ \arcsin y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \arcsin x = \frac{\pi}{4}, \\ \arcsin y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right\}.$

Задача 8. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x : \operatorname{tg} y : \operatorname{tg} z = 1 : 2 : 3, \\ x + y + z = \pi. \end{cases} \quad (11)$$

Решение. Поскольку

$$\operatorname{tg}(x + y + z) = \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y + \operatorname{tg} z - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y - \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z - \operatorname{tg} z \operatorname{tg} x},$$

а при $x + y + z = \pi$ значение $\operatorname{tg}(x + y + z) = 0$, то для системы (11) справедливо тождество

$$\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y + \operatorname{tg} z = \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y \operatorname{tg} z \quad (12)$$

(считаем, что x, y, z не равны $\frac{\pi}{2} + \pi l, \forall l \in \mathbb{Z}$).

Обозначим через t коэффициент пропорциональности для первых двух уравнений системы (11). Тогда

$$\operatorname{tg} x = t, \quad \operatorname{tg} y = 2t, \quad \operatorname{tg} z = 3t.$$

В соответствии с тождеством (12) получаем, что

$$t + 2t + 3t = t \cdot 2t \cdot 3t \iff 6t = 6t^3 \iff t(t^2 - 1) = 0,$$

т.е. $t = 0, t = \pm 1$.

Если $t = 0$, то

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} y = \operatorname{tg} z = 0,$$

и

$$x = \pi k, \quad y = \pi m, \quad z = \pi n, \quad (13)$$

где k, m, n — целые числа.

Подставив во второе уравнение системы (11) значения (13), устанавливаем, что целые числа k, m, n связаны равенством

$$n = 1 - k - m.$$

Решениями системы (11) будут упорядоченные тройки

$$(\pi k, \pi m, \pi(1 - k - m)), \quad \forall k, m \in \mathbb{Z}.$$

Если $t = 1$, то

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} y = 2, \\ \operatorname{tg} z = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = \arctg 2 + \pi m, \quad \forall m \in \mathbb{Z}, \\ z = \arctg 3 + \pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (14)$$

Подставив значения (14) во второе уравнение системы (11), с уче-

том того, что сумма арктангенсов (см. задачу 11 из параграфа 1)

$$\operatorname{arctg} 2 + \operatorname{arctg} 3 = \frac{3\pi}{4},$$

устанавливаем, что

$$n = -(k + m).$$

Решениями системы (11) будут упорядоченные тройки

$$\left(\frac{\pi}{4} + \pi k, \operatorname{arctg} 2 + \pi m, \operatorname{arctg} 3 - \pi(k + m) \right), \forall k, m \in \mathbb{Z}.$$

Если $t = -1$, то

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x = -1, \\ \operatorname{tg} y = -2, \\ \operatorname{tg} z = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = -\operatorname{arctg} 2 + \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}, \\ z = -\operatorname{arctg} 3 + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (15)$$

Подставив значения (15) во второе уравнение системы (11), находим, что

$$n = 2 - k - m.$$

Решениями системы (11) будут упорядоченные тройки

$$\left(-\frac{\pi}{4} + \pi k, -\operatorname{arctg} 2 + \pi m, -\operatorname{arctg} 3 + \pi(2 - k - m) \right), \forall k, m \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:

$$\begin{aligned} & \left\{ (\pi k, \pi m, \pi(1 - k - m)), \left(\frac{\pi}{4} + \pi k, \operatorname{arctg} 2 + \pi m, \operatorname{arctg} 3 - \pi(k + m) \right), \right. \\ & \left. \left(-\frac{\pi}{4} + \pi k, -\operatorname{arctg} 2 + \pi m, -\operatorname{arctg} 3 + \pi(2 - k - m) \right) \right\}, \forall k, m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Задача 9. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x : \sin y : \sin z = 2 : 3 : 4, \\ x + y + z = \pi. \end{cases} \quad (16)$$

Решение. Если

$$x + y + z = \pi, \quad (17)$$

то

$$\sin x = \sin(\pi - (y + z)) = \sin(y + z),$$

$$\sin y = \sin(\pi - (x + z)) = \sin(x + z),$$

$$\sin z = \sin(\pi - (x + y)) = \sin(x + y).$$

Используя формулу синуса суммы, получаем, что для системы (16) справедлива система уравнений:

$$\begin{cases} \sin y \cos z + \cos y \sin z = \sin x, \\ \sin x \cos z + \cos x \sin z = \sin y, \\ \sin x \cos y + \cos x \sin y = \sin z. \end{cases}$$

Обозначим через t коэффициент пропорциональности для первых двух уравнений системы (16). Тогда

$$\sin x = 2t, \quad \sin y = 3t, \quad \sin z = 4t. \quad (18)$$

Следовательно, система (16) равносильна системе

$$\begin{cases} 3t \cos z + 4t \cos y = 2t, \\ 2t \cos z + 4t \cos x = 3t, \\ 2t \cos y + 3t \cos x = 4t, \\ x + y + z = \pi \end{cases} \quad (19)$$

при условии (18).

Если $t = 0$, то

$$\sin x = \sin y = \sin z = 0,$$

и

$$x = \pi k, \quad y = \pi m, \quad z = \pi n, \quad (20)$$

где k, m, n — целые числа.

Подставив значения (20) в уравнение (17), получим, что

$$n = 1 - k - m.$$

Решениями системы (16) будут упорядоченные тройки чисел

$$(\pi k, \pi m, \pi(1 - k - m)), \forall k, m \in \mathbb{Z}.$$

Пусть $t \neq 0$. Разделим на коэффициент пропорциональности t первые три уравнения системы (19) и получим систему трех линейных уравнений относительно $\cos x$, $\cos y$ и $\cos z$:

$$\begin{cases} 3 \cos z + 4 \cos y = 2, \\ 2 \cos z + 4 \cos x = 3, \\ 2 \cos y + 3 \cos x = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x = \frac{7}{8}, \\ \cos y = \frac{11}{16}, \\ \cos z = -\frac{1}{4}, \end{cases}$$

решениями которой являются упорядоченные тройки чисел

$$\left(\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n \right), \quad (21)$$

$$\left(\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n \right), \quad (22)$$

$$\left(\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, -\arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n \right), \quad (23)$$

$$\left(\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, -\arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n \right), \quad (24)$$

$$\left(-\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n \right), \quad (25)$$

$$\left(-\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n \right), \quad (26)$$

$$\left(-\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, -\arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n \right), \quad (27)$$

$$\left(-\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, -\arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n \right), \quad (28)$$

где k, m, n — целые числа.

Пусть

$$A = \arccos \frac{7}{8} + \arccos \frac{11}{16}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \cos A &= \cos \left(\arccos \frac{7}{8} + \arccos \frac{11}{16} \right) = \\ &= \cos \arccos \frac{7}{8} \cos \arccos \frac{11}{16} - \sin \arccos \frac{7}{8} \sin \arccos \frac{11}{16} = \\ &= \frac{7}{8} \cdot \frac{11}{16} - \sqrt{1 - \frac{49}{64}} \cdot \sqrt{1 - \frac{121}{256}} = \frac{77 - \sqrt{15} \cdot \sqrt{135}}{8 \cdot 16} = \frac{77 - 45}{8 \cdot 16} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Найдем A по заданному значению косинуса этого аргумента.

Для того чтобы задача разрешалась однозначно, нужно указать пределы изменения A .

Так как

$$0 < \arccos \frac{7}{8} < \frac{\pi}{2} \quad \text{и} \quad 0 < \arccos \frac{11}{16} < \frac{\pi}{2},$$

то сумма арккосинусов

$$0 < \arccos \frac{7}{8} + \arccos \frac{11}{16} < \pi.$$

Следовательно,

$$\cos A = \frac{1}{4} \implies A = \arccos \frac{1}{4}.$$

Итак,

$$\arccos \frac{7}{8} + \arccos \frac{11}{16} = \arccos \frac{1}{4}. \quad (29)$$

Только те упорядоченные тройки (x, y, z) из (21) – (28) будут решениями системы (16), в которых числа x, y, z удовлетворяют уравнению (17). С учетом равенства (29) в каждом из случаев (21) – (28) устанавливаем следующее.

С л у ч а й (21):

$$\begin{aligned} \arccos \frac{7}{8} + 2\pi k + \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n = \pi &\iff \\ \iff \arccos \frac{1}{4} - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi(k + m + n) = 0 &\iff n = -(k + m). \end{aligned}$$

Среди упорядоченных троек (21) решениями системы (16) будут

$$\left(\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \pi - \arccos \frac{1}{4} - 2\pi(k + m) \right), \forall k, m \in \mathbb{Z}.$$

С л у ч а й (22):

$$\begin{aligned} \arccos \frac{7}{8} + 2\pi k + \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n = \pi &\iff \\ \iff \arccos \frac{1}{4} + \arccos \frac{1}{4} + 2\pi(k + m + n - 1) = 0 &\iff \\ \iff \arccos \frac{1}{4} = \pi(1 - k - m - n). \end{aligned}$$

Это равенство не выполняется, так как из равенства $\arccos \frac{1}{4} = \pi p$ следует, что $\cos \pi p = \frac{1}{4}$, но это не верно, ибо $\cos \pi p = (-1)^p, \forall p \in \mathbb{Z}$.

Итак, среди упорядоченных троек (22) решений системы (16) нет.

С л у ч а й (23):

$$\begin{aligned} \arccos \frac{7}{8} + 2\pi k - \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n = \pi &\iff \\ \iff \left(\arccos \frac{7}{8} - \arccos \frac{1}{4} \right) - \arccos \frac{11}{16} + 2\pi(k + m + n) = 0 &\iff \\ \iff \arccos \frac{11}{16} = \pi(k + m + n). \end{aligned}$$

Это равенство не выполняется, так как из равенства $\arccos \frac{11}{16} = \pi l$

следует, что $\cos \pi l = \frac{11}{16}$, но это не верно, ибо $\cos \pi l = (-1)^l, \forall l \in \mathbb{Z}$.

Итак, среди упорядоченных троек (23) решений системы (16) нет.

С л у ч а й (24):

$$\begin{aligned} \arccos \frac{7}{8} + 2\pi k - \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n = \pi &\iff \\ \iff \arccos \frac{7}{8} + \left(\arccos \frac{1}{4} - \arccos \frac{11}{16} \right) = 2\pi(1 - k - m - n) &\iff \\ \iff \arccos \frac{7}{8} = \pi(1 - k - m - n). \end{aligned}$$

Это равенство не выполняется, так как из равенства $\arccos \frac{7}{8} = \pi q$ следует, что $\cos \pi q = \frac{7}{8}$, но это не верно, ибо $\cos \pi q = (-1)^q, \forall q \in \mathbb{Z}$.

Итак, среди упорядоченных троек (24) решений системы (16) нет.

С л у ч а й (25):

$$\begin{aligned} -\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k + \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n = \pi &\iff \\ \iff -\arccos \frac{7}{8} + \left(\arccos \frac{11}{16} - \arccos \frac{1}{4} \right) = -2\pi(k + m + n) &\iff \\ \iff \arccos \frac{7}{8} = \pi(k + m + n). \end{aligned}$$

Как и в случае (24), это равенство не выполняется.

Итак, среди упорядоченных троек (25) решений системы (16) нет.

С л у ч а й (26):

$$\begin{aligned} -\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k + \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n = \pi &\iff \\ \iff \left(\arccos \frac{1}{4} - \arccos \frac{7}{8} \right) + \arccos \frac{11}{16} = 2\pi(1 - k - m - n) &\iff \\ \iff \arccos \frac{11}{16} = \pi(1 - k - m - n). \end{aligned}$$

Как и в случае (23), это равенство не выполняется.

Итак, среди упорядоченных троек (26) решений системы (16) нет.

С л у ч а й (27):

$$\begin{aligned}
 & -\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k - \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \pi - \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n = \pi \iff \\
 & \iff -\left(\arccos \frac{7}{8} + \arccos \frac{11}{16}\right) - \arccos \frac{1}{4} = -2\pi(k + m + n) \iff \\
 & \iff \arccos \frac{1}{4} = \pi(k + m + n).
 \end{aligned}$$

Как и в случае (21), это равенство не выполняется.

Итак, среди упорядоченных троек (27) решений системы (16) нет.

С л у ч а й (28):

$$\begin{aligned}
 & -\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k - \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m + \arccos \frac{1}{4} - \pi + 2\pi n = \pi \iff \\
 & \iff -\left(\arccos \frac{7}{8} + \arccos \frac{11}{16}\right) + \arccos \frac{1}{4} = 2\pi(1 - k - m - n) \iff \\
 & \iff n = 1 - k - m.
 \end{aligned}$$

Среди упорядоченных троек (28) решениями системы (16) будут

$$\left(-\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, -\arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \arccos \frac{1}{4} + \pi - 2\pi(k + m)\right),$$

где k и m — любые целые числа.

$$\begin{aligned}
 \text{Ответ: } & \left\{\left(\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, \arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \pi - \arccos \frac{1}{4} - 2\pi(k + m)\right), \right. \\
 & \left(-\arccos \frac{7}{8} + 2\pi k, -\arccos \frac{11}{16} + 2\pi m, \arccos \frac{1}{4} + \pi - 2\pi(k + m)\right), \\
 & \left.\left(\pi k, \pi m, \pi(1 - k - m)\right)\right\}, \forall k, m \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

К тригонометрическим системам могут быть приведены и алгебраические системы, что встречается редко, но может дать эффективный способ решения.

Задача 10. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x + x^2y = y, \\ 2y + y^2z = z, \\ 2z + z^2x = x. \end{cases} \quad (30)$$

Решение. Поскольку при $|x| = 1$ из первого уравнения системы (30) получаем, что

$$\pm 2 + y = y;$$

при $|y| = 1$ из второго уравнения системы (30) получаем, что

$$\pm 2 + z = z;$$

при $|z| = 1$ из третьего уравнения системы (30) получаем, что

$$\pm 2 + x = x,$$

то система (30) не имеет решений, у которых

$$|x| = 1, \quad |y| = 1, \quad |z| = 1.$$

Значит, система (30) равносильна системе

$$\begin{cases} y = \frac{2x}{1 - x^2}, \\ z = \frac{2y}{1 - y^2}, \\ x = \frac{2z}{1 - z^2}. \end{cases}$$

Используя формулу тангенса двойного аргумента

$$\operatorname{tg} 2u = \frac{2 \operatorname{tg} u}{1 - \operatorname{tg}^2 u},$$

которая имеет смысл при $u \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n$, $u \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$, и положив

$$x = \operatorname{tg} u,$$

получим тригонометрическую систему

$$\begin{cases} y = \operatorname{tg} 2u, \\ z = \operatorname{tg} 4u, \\ x = \operatorname{tg} 8u, \\ x = \operatorname{tg} u \end{cases} \iff \begin{cases} \operatorname{tg} 8u - \operatorname{tg} u = 0, \\ x = \operatorname{tg} u, \\ y = \operatorname{tg} 2u, \\ z = \operatorname{tg} 4u. \end{cases}$$

Тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 8u - \operatorname{tg} u = 0 &\iff \frac{\sin 7u}{\cos 8u \cos u} = 0 \iff \sin 7u = 0 \iff \\ &\iff u = \frac{\pi n}{7}, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$x = \operatorname{tg} \frac{\pi n}{7}, \quad y = \operatorname{tg} \frac{2\pi n}{7}, \quad z = \operatorname{tg} \frac{4\pi n}{7}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\operatorname{tg} \frac{\pi n}{7}, \operatorname{tg} \frac{2\pi n}{7}, \operatorname{tg} \frac{4\pi n}{7} \right) \right\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

§ 3. Тригонометрические системы специальных видов

1. Системы, в которых одно уравнение алгебраическое, а другое содержит тригонометрические функции

Задача 1. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = -\frac{1}{2}, \\ x + y = \frac{2\pi}{3}. \end{cases} \quad (1)$$

Решение. С учетом второго уравнения системы (1) преобразуем первое уравнение этой системы:

$$\begin{aligned} \cos x + \cos y &= -\frac{1}{2} \iff 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = -\frac{1}{2} \implies \\ \implies 2 \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{x-y}{2} &= -\frac{1}{2} \iff \cos \frac{x-y}{2} = -\frac{1}{2} \iff \\ \iff \begin{cases} \frac{x-y}{2} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \\ \frac{x-y}{2} = \frac{4\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} &\iff \begin{cases} x-y = \frac{4\pi}{3} + 4\pi k, \\ x-y = \frac{8\pi}{3} + 4\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Тригонометрическая система (1) равносильна совокупности двух алгебраических систем:

$$\begin{cases} x-y = \frac{4\pi}{3} + 4\pi k, \\ x+y = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi + 2\pi k, \\ y = -\frac{\pi}{3} - 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x-y = \frac{8\pi}{3} + 4\pi k, \\ x+y = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{5\pi}{3} + 2\pi k, \\ y = -\pi - 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(\pi + 2\pi k, -\frac{\pi}{3} - 2\pi k \right), \left(\frac{5\pi}{3} + 2\pi k, -\pi - 2\pi k \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$

Аналогичным методом могут быть решены системы

$$\begin{cases} \sin x \pm \sin y = a, \\ x \pm y = b \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \cos x \pm \cos y = a, \\ x \pm y = b, \end{cases} \quad (2)$$

где знаки берутся в любом сочетании.

Задача 2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x - \sin y = \frac{1}{2}, \\ x - y = \frac{\pi}{6}. \end{cases} \quad (3)$$

Решение. Если $x - y = \frac{\pi}{6}$, то

$$\begin{aligned} \sin x - \sin y = \frac{1}{2} &\iff 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2} = \frac{1}{2} \implies \\ &\implies 2 \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{x+y}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Вычислим

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

Тогда из первого уравнения системы (1) с учетом выполненных преобразований получаем:

$$\begin{aligned} 2 \cdot \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \cdot \cos \frac{x+y}{2} &= \frac{1}{2} \iff \cos \frac{x+y}{2} = \frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} \iff \\ \iff \cos \frac{x+y}{2} &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \iff \frac{x+y}{2} = \pm \arccos \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + 2\pi k \iff \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow x + y = \pm 2 \arccos \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + 4\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Вычислим

$$\begin{aligned} \arccos \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} &= \arccos \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \\ &= \arccos \left(\cos \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{4} \right) = \\ &= \arccos \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) = \arccos \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

Тригонометрическая система (3) равносильна совокупности двух алгебраических систем:

$$\begin{cases} x + y = -\frac{\pi}{6} + 4\pi k, \\ x - y = \frac{\pi}{6} \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = 2\pi k, \\ y = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = \frac{\pi}{6} + 4\pi k, \\ x - y = \frac{\pi}{6} \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \\ y = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(2\pi k, -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \right), \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k, 2\pi k \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$

Системы вида (знаки берутся в любом сочетании)

$$\begin{cases} \sin x \pm \cos y = a, \\ x \pm y = b \end{cases} \quad (4)$$

сводятся к системам (2), если использовать формулы приведения, например:

$$\sin x = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \quad \text{или} \quad \cos x = \sin \left(\frac{\pi}{2} \pm x \right) \quad \text{и др.}$$

Задача 3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = 1, \\ x + y = \frac{\pi}{3}. \end{cases} \quad (5)$$

Решение. Система (5) такова, что ее первое уравнение

$$\sin x + \cos y = 1 \iff \sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = 1 \iff$$

$$\iff 2 \sin\left(\frac{x-y}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

Учитывая, что $x + y = \frac{\pi}{3}$, получаем:

$$2 \cos\left(\frac{x+y}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) = 2 \cos\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6}\right) =$$

$$= 2 \sqrt{\frac{1 + \cos \frac{\pi}{6}}{2}} = 2 \sqrt{\frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \sqrt{2 + \sqrt{3}}.$$

Тогда система (5) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin\left(\frac{x-y}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}, \\ x + y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \sin\left(\frac{x-y}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2 - \sqrt{3}}, \\ x + y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x - y = -\frac{\pi}{2} + (-1)^n \cdot 2 \arcsin \sqrt{2 - \sqrt{3}} + 2\pi n, \\ x + y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + (-1)^n \cdot \arcsin \sqrt{2 - \sqrt{3}} + \pi n, \\ y = \frac{5\pi}{12} + (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \sqrt{2 - \sqrt{3}} - \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Преобразовав сложный корень

$$\begin{aligned} \sqrt{2 - \sqrt{3}} &= \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{4 - 2\sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3 - 2\sqrt{3} + 1}}{2} = \\ &= \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2}}{2} = \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - 1)}{2}, \end{aligned}$$

получаем, что множество упорядоченных пар (A, B) , где

$$A = -\frac{\pi}{12} + (-1)^n \cdot \arcsin \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - 1)}{2} + \pi n,$$

$$B = \frac{5\pi}{12} + (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - 1)}{2} - \pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

является множеством решений системы (5).

$$\text{Ответ: } \{(A, B)\}, A = -\frac{\pi}{12} + (-1)^n \cdot \arcsin \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - 1)}{2} + \pi n,$$

$$B = \frac{5\pi}{12} + (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \frac{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - 1)}{2} - \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 4. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 5(\sin 2x + \sin 2y) = 2(1 + \cos^2(x - y)), \\ x + y = \frac{\pi}{6}. \end{cases} \quad (6)$$

Решение. Преобразуем первое уравнение системы (6) с учетом ее второго уравнения:

$$\begin{aligned} 10 \sin(x + y) \cos(x - y) &= 2 + 2 \cos^2(x - y) \implies \\ \implies 10 \sin \frac{\pi}{6} \cos(x - y) &= 2 + 2 \cos^2(x - y) \iff \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Longleftrightarrow 2\cos^2(x-y) - 5\cos(x-y) + 2 = 0 \Longleftrightarrow \\
&\Longleftrightarrow (2\cos(x-y) - 1)(\cos(x-y) - 2) = 0 \Longleftrightarrow \\
&\Longleftrightarrow \cos(x-y) = \frac{1}{2} \Longleftrightarrow x-y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},
\end{aligned}$$

так как $|\cos(x-y)| \leq 1, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

Система (6) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{aligned}
\begin{cases} x-y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ x+y = \frac{\pi}{6} \end{cases} &\Longleftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + \pi k, \\ y = \frac{\pi}{4} - \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}; \end{cases} \\
\begin{cases} x-y = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ x+y = \frac{\pi}{6} \end{cases} &\Longleftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \\ y = -\frac{\pi}{12} - \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}
\end{aligned}$$

Ответ: $\left\{ \left(-\frac{\pi}{12} + \pi k, \frac{\pi}{4} - \pi k \right), \left(\frac{\pi}{4} + \pi k, -\frac{\pi}{12} - \pi k \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Системы видов (2) и (4) (например, системы (1), (3) и (5)) могут быть решены методом исключения переменной, который бывает предпочтительнее предложенного в предыдущих задачах. Такова, например, задача 5.

Задача 5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = 1, \\ x + y = 180^\circ. \end{cases} \quad (7)$$

Решение. Из второго уравнения системы (7) найдем

$$y = 180^\circ - x$$

и подставим в первое уравнение этой системы:

$$\begin{aligned}
&\sin x + \sin(180^\circ - x) = 1 \Longleftrightarrow \sin x + \sin x = 1 \Longleftrightarrow \\
&\Longleftrightarrow \sin x = 0,5 \Longleftrightarrow x = (-1)^k \cdot 30^\circ + 180^\circ \cdot k, \forall k \in \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

Если $x = 30^\circ + 360^\circ \cdot m, \forall m \in \mathbb{Z}$, то

$$y = 150^\circ - 360^\circ \cdot m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Если $x = 150^\circ + 360^\circ \cdot m, \forall m \in \mathbb{Z}$, то

$$y = 30^\circ - 360^\circ \cdot m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\{(30^\circ \cdot (1 + 12m), 30^\circ \cdot (5 - 12m)),$
 $(30^\circ \cdot (5 + 12m), 30^\circ \cdot (1 - 12m))\}, \forall m \in \mathbb{Z}.$

Системы (знаки берутся в любом сочетании)

$$\begin{cases} \sin^2 x \pm \sin^2 y = a, \\ x \pm y = b, \end{cases} \quad \begin{cases} \cos^2 x \pm \cos^2 y = a, \\ x \pm y = b, \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} \sin^2 x \pm \cos^2 y = a, \\ x \pm y = b \end{cases}$$

решаются с использованием тригонометрических формул

$$\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}, \forall t \in \mathbb{R}, \text{ и } \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}, \forall t \in \mathbb{R}.$$

Задача 6. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin^2 x - \sin^2 y = \frac{3}{4}, \\ x - y = \frac{\pi}{3}. \end{cases} \quad (9)$$

Решение. Тригонометрическое уравнение

$$\sin^2 x - \sin^2 y = \frac{3}{4} \iff 1 - \cos 2x - (1 - \cos 2y) = \frac{3}{2} \iff$$

$$\iff \cos 2y - \cos 2x = \frac{3}{2} \iff 2 \sin(x + y) \sin(x - y) = \frac{3}{2}.$$

Тогда система (9) равносильна системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin(x+y) \sin(x-y) = \frac{3}{4}, \\ x-y = \frac{\pi}{3} \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin(x+y) \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}, \\ x-y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} \sin(x+y) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ x-y = \frac{\pi}{3} \end{cases} &\iff \begin{cases} x+y = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{3} + \pi n, \\ x-y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} n, \\ y = -\frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} n, -\frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} n \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$

Задача 7. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos^2 \frac{x}{4} + \cos^2 \frac{y}{4} = \frac{1}{4}, \\ x+y = 600^\circ. \end{cases} \quad (10)$$

*Решение*¹. Тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{x}{4} + \cos^2 \frac{y}{4} = \frac{1}{4} &\iff 1 + \cos \frac{x}{2} + 1 + \cos \frac{y}{2} = \frac{1}{2} \iff \\ \iff \cos \frac{x}{2} + \cos \frac{y}{2} = -\frac{3}{2} &\iff 2 \cos \frac{x+y}{4} \cos \frac{x-y}{4} = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Тогда система (10) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos \frac{x+y}{4} \cos \frac{x-y}{4} = -\frac{3}{4}, \\ x+y = 600^\circ \end{cases} \iff \begin{cases} \cos 150^\circ \cos \frac{x-y}{4} = -\frac{3}{4}, \\ x+y = 600^\circ \end{cases} \iff$$

¹Предварительно можно выполнить замену $x = 4u, y = 4v$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos \frac{x-y}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ x+y = 600^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-y = \pm 120^\circ + 1440^\circ \cdot k, \\ x+y = 600^\circ \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x-y = -120^\circ + 1440^\circ \cdot k, \\ x+y = 600^\circ, \end{cases} \\ \begin{cases} x-y = 120^\circ + 1440^\circ \cdot k, \\ x+y = 600^\circ \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = 240^\circ + 720^\circ \cdot k, \\ y = 360^\circ - 720^\circ \cdot k, \end{cases} \\ \begin{cases} x = 360^\circ + 720^\circ \cdot k, \\ y = 240^\circ - 720^\circ \cdot k, \end{cases} \end{cases}$$

где k — любое целое число.

Ответ:

$$\{(240^\circ \cdot (1+3k), 360^\circ \cdot (1-2k)), (360^\circ \cdot (1+2k), 240^\circ \cdot (1-3k))\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Задача 8. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos^2 2x - \sin^2 3y = \frac{1}{4}, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3}. \end{cases} \quad (11)$$

*Решение*¹. Система (11) равносильна системе

$$\begin{cases} \frac{1 + \cos 4x}{2} - \frac{1 - \cos 6y}{2} = \frac{1}{4}, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 4x + \cos 6y = \frac{1}{2}, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cos \frac{4x+6y}{2} \cos \frac{4x-6y}{2} = \frac{1}{2}, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow$$

¹Предварительно можно выполнить подстановку $2x = u$, $3y = v$.

$$\begin{aligned}
& \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cos(2x + 3y) \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(2x + 3y) = \frac{1}{2}, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} 2x + 3y = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3}, \end{cases} \\ \begin{cases} 2x + 3y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ 2x - 3y = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi k}{2}, \\ y = \frac{\pi(3k+1)}{9}, \end{cases} \\ \begin{cases} x = \frac{\pi(3k-1)}{6}, \\ y = \frac{\pi k}{3}, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi k}{2}, \frac{\pi(3k+1)}{9} \right), \left(\frac{\pi(3k-1)}{6}, \frac{\pi k}{3} \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Следующий класс образуют системы, у которых одно уравнение содержит произведение тригонометрических функций, а другое — сумму или разность их аргументов:

$$\begin{cases} \sin x \sin y = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x \cos y = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cos y = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = b. \end{cases} \quad (13)$$

Задача 9. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos \pi x \cos \pi y = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y - x = \frac{1}{4}. \end{cases} \quad (14)$$

*Решение*¹. Тригонометрическое уравнение

$$\cos \pi x \cos \pi y = \frac{\sqrt{2}}{2} \iff \cos \pi(x - y) + \cos \pi(x + y) = \sqrt{2}.$$

При $y - x = \frac{1}{4}$ значение

$$\cos \pi(x - y) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Тогда система (14) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos \pi(x + y) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ y - x = \frac{1}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} \pi(x + y) = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \\ y - x = \frac{1}{4} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \begin{cases} y + x = \frac{1}{4} + 2n, \\ y - x = \frac{1}{4}, \end{cases} \\ \begin{cases} y + x = -\frac{1}{4} + 2n, \\ y - x = \frac{1}{4} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = n, \\ y = \frac{1}{4} + n, \end{cases} \\ \begin{cases} x = -\frac{1}{4} + n, \\ y = n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $\left\{\left(n, \frac{1}{4} + n\right), \left(-\frac{1}{4} + n, n\right)\right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$

¹ Полагая, что $\pi x = u$, $\pi y = v$, получим систему вида (12).

Задача 10. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x \cos y = \frac{\sqrt{6}}{4}, \\ x - y = \frac{\pi}{12}. \end{cases} \quad (15)$$

Решение. Преобразуем первое уравнение системы (15) с учетом второго уравнения этой системы:

$$\begin{aligned} \sin x \cos y = \frac{\sqrt{6}}{4} &\iff \frac{1}{2} (\sin(x - y) + \sin(x + y)) = \frac{\sqrt{6}}{4} \implies \\ &\implies \sin \frac{\pi}{12} + \sin(x + y) = \frac{\sqrt{6}}{2}. \end{aligned}$$

Поскольку

$$\sin \frac{\pi}{12} = \sin\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos \frac{\pi}{6}}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2},$$

то

$$\begin{aligned} \sin(x + y) &= \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \iff \\ \iff x + y &= (-1)^k \cdot \arcsin\left(\frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}\right) + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Вычислим

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{6}}{2} - \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \frac{\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}}}{2} = \\ &= \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6} - \sqrt{3 - 2\sqrt{3}} + 1}{2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \arcsin \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} = \arcsin \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \\
& = \arcsin \left(\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \right) = \arcsin \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \\
& = \arcsin \sin \frac{7\pi}{12} = \arcsin \sin \left(\pi - \frac{5\pi}{12} \right) = \arcsin \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}.
\end{aligned}$$

Тогда

$$x + y = (-1)^k \cdot \frac{5\pi}{12} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

а система (15) равносильна алгебраической системе

$$\begin{cases} x + y = (-1)^k \cdot \frac{5\pi}{12} + \pi k, \\ x - y = \frac{\pi}{12}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Полагая, что

$$k = 2s \quad \text{и} \quad k = 2s + 1, \quad s \in \mathbb{Z},$$

получаем, что система (15) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x + y = \frac{5\pi}{12} + 2\pi s, \\ x - y = \frac{\pi}{12} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi s, \\ y = \frac{\pi}{6} + \pi s, \quad \forall s \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = \frac{7\pi}{12} + 2\pi s, \\ x - y = \frac{\pi}{12} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi s, \\ y = \frac{\pi}{4} + \pi s, \quad \forall s \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{4} + \pi s, \frac{\pi}{6} + \pi s \right), \left(\frac{\pi}{3} + \pi s, \frac{\pi}{4} + \pi s \right) \right\}, \quad \forall s \in \mathbb{Z}.$$

Задача 11. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y = 1, \\ x - y = \frac{\pi}{6}. \end{cases} \quad (16)$$

*Решение*¹. Учитывая второе уравнение системы (16), преобразуем первое уравнение этой системы:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y = 1 &\iff \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 1 \implies \operatorname{tg} x \operatorname{tg} \left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 \iff \\ &\iff \operatorname{tg} x \cdot \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} \frac{\pi}{6}}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} \frac{\pi}{6}} = 1 \iff \operatorname{tg} x \cdot \frac{\operatorname{tg} x - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \operatorname{tg} x \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} = 1 \iff \\ &\iff \frac{\sqrt{3} \operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} x + \sqrt{3}} = 1 \iff \frac{\sqrt{3} \operatorname{tg}^2 x - 2 \operatorname{tg} x - \sqrt{3}}{\operatorname{tg} x + \sqrt{3}} = 0 \iff \\ &\iff \frac{\left(\operatorname{tg} x + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)(\operatorname{tg} x - \sqrt{3})}{\operatorname{tg} x + \sqrt{3}} = 0 \iff \begin{cases} \operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \\ \operatorname{tg} x = \sqrt{3}, \end{cases} \end{aligned}$$

т.е.

$$x = -\frac{\pi}{6} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{3} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если $x = -\frac{\pi}{6} + \pi k$, то $y = -\frac{\pi}{3} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Если $x = \frac{\pi}{3} + \pi k$, то $y = \frac{\pi}{6} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\left\{\left(-\frac{\pi}{6} + \pi k, -\frac{\pi}{3} + \pi k\right), \left(\frac{\pi}{3} + \pi k, \frac{\pi}{6} + \pi k\right)\right\}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

¹Другой способ решения приведен в задаче 13.

Задача 12. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 5 - 2\sqrt{6}, \\ x + y = \frac{\pi}{4}. \end{cases} \quad (17)$$

Решение. Тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 5 - 2\sqrt{6} &\iff \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y} = 5 - 2\sqrt{6} \iff \\ &\iff \frac{\cos(x - y) - \cos(x + y)}{\cos(x - y) + \cos(x + y)} = 5 - 2\sqrt{6}. \end{aligned}$$

Учитывая, что $x + y = \frac{\pi}{4}$, получаем:

$$\begin{aligned} \frac{\cos(x - y) - \cos \frac{\pi}{4}}{\cos(x - y) + \cos \frac{\pi}{4}} = 5 - 2\sqrt{6} &\iff \frac{\cos(x - y) - \frac{\sqrt{2}}{2}}{\cos(x - y) + \frac{\sqrt{2}}{2}} = 5 - 2\sqrt{6} \iff \\ &\iff \frac{\cos(x - y) - \frac{\sqrt{2}}{2} - (5 - 2\sqrt{6})\left(\cos(x - y) + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\cos(x - y) + \frac{\sqrt{2}}{2}} = 0 \iff \\ &\iff \begin{cases} \cos(x - y) = \frac{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})}, \\ \cos(x - y) \neq -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \iff \cos(x - y) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \end{aligned}$$

так как

$$\frac{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})} = \frac{(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{2\sqrt{2}(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Тогда система (17) равносильна системе

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} \cos(x - y) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} x - y = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \iff \\
& \iff \begin{cases} \begin{cases} x - y = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ x + y = \frac{\pi}{4}, \end{cases} \\ \begin{cases} x - y = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ x + y = \frac{\pi}{4} \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{5\pi}{24} + \pi n, \\ y = \frac{\pi}{24} - \pi n, \end{cases} \\ \begin{cases} x = \frac{\pi}{24} + \pi n, \\ y = \frac{5\pi}{24} - \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi(5 + 24n)}{24}, \frac{\pi(1 - 24n)}{24} \right), \left(\frac{\pi(1 + 24n)}{24}, \frac{\pi(5 - 24n)}{24} \right) \right\}$$

при любом целом n .

Другой способ решения систем (13) состоит в использовании производных пропорций.

Задача 13. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \operatorname{ctg} y = 2, \\ x + y = 60^\circ. \end{cases} \quad (18)$$

Решение. По пропорции

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

составим производную пропорцию

$$\frac{a + b}{a - b} = \frac{c + d}{c - d}.$$

На ее основании преобразуем первое уравнение системы (18):

$$\operatorname{tg} x \operatorname{ctg} y = 2 \iff \frac{\sin x \cos y}{\cos x \sin y} = 2 \iff$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\sin x \cos y - \cos x \sin y} = \frac{2+1}{2-1} \Leftrightarrow \frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = 3.$$

Тогда система (18) равносильна системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = 3, \\ x+y = 60^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x-y) = \frac{\sqrt{3}}{6}, \\ x+y = 60^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x-y = (-1)^k \cdot \left(\frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{6} \right)^\circ + 180^\circ \cdot k, \\ x+y = 60^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30^\circ + (-1)^k \cdot \left(\frac{90}{\pi} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{6} \right)^\circ + 90^\circ \cdot k, \\ y = 30^\circ + (-1)^{k+1} \cdot \left(\frac{90}{\pi} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{6} \right)^\circ - 90^\circ \cdot k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\{(30^\circ + (-1)^k \cdot \varphi^\circ + 90^\circ \cdot k, 30^\circ + (-1)^{k+1} \cdot \varphi^\circ - 90^\circ \cdot k)\},$
 $\forall k \in \mathbb{Z}, \text{ где } \varphi = \frac{90}{\pi} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{6}.$

Наряду с методом исключения переменной могут быть использованы производные пропорции при решении систем, у которых одно уравнение содержит частное тригонометрических функций синус и косинус, а другое — сумму или разность их аргументов:

$$\begin{cases} \frac{\sin x}{\sin y} = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\cos x}{\cos y} = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\sin x}{\cos y} = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\cos y}{\sin x} = a, \\ x \pm y = b. \end{cases} \quad (19)$$

Задача 14. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\cos x}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ x - y = -\frac{\pi}{6}. \end{cases} \quad (20)$$

*Решение*¹. С учетом второго уравнения системы (20) преобразуем первое уравнение этой системы:

$$\begin{aligned}
 \frac{\cos x}{\cos y} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \frac{\cos\left(y - \frac{\pi}{6}\right)}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3} \cos\left(y - \frac{\pi}{6}\right) - \cos y}{\sqrt{3} \cos y} = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3} \left(\cos y \cos \frac{\pi}{6} + \sin y \sin \frac{\pi}{6} \right) - \cos y}{\cos y} = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \frac{\frac{3}{2} \cos y + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin y - \cos y}{\cos y} = 0 \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{2} \cos y + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin y}{\cos y} = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \frac{\cos \frac{\pi}{3} \cos y + \sin \frac{\pi}{3} \sin y}{\cos y} = 0 \Leftrightarrow \frac{\cos\left(y - \frac{\pi}{3}\right)}{\cos y} = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \cos\left(y - \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow y = \frac{5\pi}{6} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},
 \end{aligned}$$

так как $\cos\left(\frac{5\pi}{6} + \pi k\right) \neq 0, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Тогда

$$x = \frac{2\pi}{3} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{2\pi}{3} + \pi k, \frac{5\pi}{6} + \pi k \right) \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Задача 15. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\sin x}{\sin y} = 2, \\ x + y = \frac{2\pi}{3}. \end{cases} \quad (21)$$

¹ Другой способ решения приведен в задаче 15.

Решение¹. По пропорции $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ составим производную пропорцию

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}.$$

На ее основании преобразуем первое уравнение системы (21):

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{\sin y} = 2 &\iff \frac{\sin x + \sin y}{\sin x - \sin y} = \frac{2+1}{2-1} \iff \\ &\iff \frac{\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}}{\cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}} = 3 \iff \operatorname{tg} \frac{x+y}{2} \operatorname{ctg} \frac{x-y}{2} = 3. \end{aligned}$$

Учитывая, что $x+y = \frac{2\pi}{3}$, находим

$$\operatorname{tg} \frac{x+y}{2} = \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}.$$

Тогда система (21) равносильна системе

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} \frac{x-y}{2} = \sqrt{3}, \\ x+y = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x-y = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x+y = \frac{2\pi}{3}, \end{cases}$$

из которой находим

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad y = \frac{\pi}{6} - \pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{2} (1+2n), \frac{\pi}{6} (1-6n) \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$

Кроме метода исключения переменной, системы видов

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y = a, \\ x \pm y = b; \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{ctg} x \pm \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = b; \end{cases}$$

¹ Другой способ решения приведен в задаче 14.

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \pm \operatorname{ctg} y = a, \\ x \pm y = b, \end{cases} \quad (22)$$

где знаки берутся в любом сочетании, могут быть решены с использованием формул суммы и разности тангенсов и котангенсов.

Задача 16. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y = 2, \\ x + y = \frac{3\pi}{4}. \end{cases} \quad (23)$$

Решение. Из второго уравнения системы (23) следует:

$$x = \frac{3\pi}{4} - y.$$

При этом первое уравнение будет иметь вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{4} - y\right) - \operatorname{tg} y = 2 &\iff \frac{\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} - \operatorname{tg} y}{1 + \operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} \operatorname{tg} y} - \operatorname{tg} y = 2 \iff \\ &\iff \frac{1 + \operatorname{tg} y}{1 - \operatorname{tg} y} + \operatorname{tg} y + 2 = 0 \iff \frac{\operatorname{tg}^2 y - 3}{1 - \operatorname{tg} y} = 0 \iff \\ &\iff \begin{cases} \operatorname{tg} y = -\sqrt{3}, \\ \operatorname{tg} y = \sqrt{3} \end{cases} \iff \begin{cases} y = -\frac{\pi}{3} + \pi n, \\ y = \frac{\pi}{3} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, множеством решений системы (23) будет

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{12} - \pi n, -\frac{\pi}{3} + \pi n \right), \left(\frac{5\pi}{12} - \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{12} - \pi n, -\frac{\pi}{3} + \pi n \right), \left(\frac{5\pi}{12} - \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 17. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y = \frac{2}{\sqrt{3}}, \\ x - y = \frac{\pi}{6}. \end{cases} \quad (24)$$

Решение. Первое уравнение системы (24) равносильно уравнению

$$\frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y} = \frac{2}{\sqrt{3}} \iff \frac{2 \sin(x+y)}{\cos(x+y) + \cos(x-y)} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Поскольку $x - y = \frac{\pi}{6}$, то

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x+y)}{\cos(x+y) + \frac{\sqrt{3}}{2}} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iff \sqrt{3} \sin(x+y) = \cos(x+y) + \frac{\sqrt{3}}{2} \iff \\ &\iff \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(x+y) - \frac{1}{2} \cos(x+y) = \frac{\sqrt{3}}{4} \iff \\ &\iff \cos \frac{\pi}{6} \sin(x+y) - \sin \frac{\pi}{6} \cos(x+y) = \frac{\sqrt{3}}{4} \iff \\ &\iff \sin\left((x+y) - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} \iff x+y = \frac{\pi}{6} + (-1)^k \cdot \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4} + \pi k, \end{aligned}$$

где k — любое целое число.

Отсюда, учитывая, что $x - y = \frac{\pi}{6}$, находим:

$$x = \frac{\pi}{6} + A, \quad y = A,$$

где $A = \frac{(-1)^k}{2} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi k}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{6} + A, A \right) \right\}, A = \frac{(-1)^k}{2} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi k}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Задача 18. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} y = 3, \\ |x - y| = \frac{\pi}{3}. \end{cases} \quad (25)$$

Решение. Первое уравнение системы (25) равносильно уравнению

$$\frac{\sin x \sin y + \cos x \cos y}{\cos x \sin y} = 3 \iff \frac{\cos(x - y)}{\cos x \sin y} = 3.$$

Учитывая четность функции косинус, составляем тождество

$$\cos(x - y) = \cos |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

на основании которого при $|x - y| = \frac{\pi}{3}$ первое уравнение системы (25) приводим к виду

$$\begin{aligned} \frac{\cos \frac{\pi}{3}}{\cos x \sin y} = 3 &\iff 2 \cos x \sin y = \frac{1}{3} \iff \\ &\iff \sin(y - x) + \sin(y + x) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Раскрывая модуль, систему (25) заменяем равносильной совокупностью двух систем.

Первая система

$$\begin{cases} \sin(y - x) + \sin(y + x) = \frac{1}{3}, \\ y - x = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin(y + x) = \frac{2 + 3\sqrt{3}}{6}, \\ y - x = -\frac{\pi}{3}, \end{cases}$$

и не имеет решений, так как

$$|\sin(y + x)| \leq 1, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

а

$$16 < 27 \iff 4 < 3\sqrt{3} \iff 6 < 2 + 3\sqrt{3} \iff 1 < \frac{2 + 3\sqrt{3}}{6}.$$

Вторая система

$$\begin{cases} \sin(y-x) + \sin(y+x) = \frac{1}{3}, \\ y-x = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin(y+x) = \frac{2-3\sqrt{3}}{6}, \\ y-x = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} y+x = (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2-3\sqrt{3}}{6} + \pi n, \\ y-x = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{1}{2} \arcsin \frac{2-3\sqrt{3}}{6} + \frac{\pi}{2} n, \\ y = \frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{1}{2} \arcsin \frac{2-3\sqrt{3}}{6} + \frac{\pi}{2} n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{1}{2} \arcsin \frac{2-3\sqrt{3}}{6} + \frac{\pi}{2} n, \right. \right. \\ \left. \left. \frac{\pi}{6} + (-1)^n \cdot \frac{1}{2} \arcsin \frac{2-3\sqrt{3}}{6} + \frac{\pi}{2} n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

2. Системы, в которых оба уравнения содержат тригонометрические функции

1. Общим подходом к решению объединены тригонометрические системы видов:

$$\begin{cases} \sin x \sin y = a, \\ \cos x \cos y = b \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \sin x \cos y = a, \\ \cos x \sin y = b. \end{cases} \quad (1)$$

Задача 1. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{4}, \\ \cos x \cos y = \frac{3}{4}. \end{cases} \quad (2)$$

Решение. Сложением и вычитанием (из второго уравнения первого) уравнений системы (2) приводим эту систему к равносильной системе

$$\begin{cases} \sin x \sin y + \cos x \cos y = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}, \\ \cos x \cos y - \sin x \sin y = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} \cos(x - y) = 1, \\ \cos(x + y) = \frac{1}{2} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x - y = 2\pi k, \\ \begin{cases} x + y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x + y = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} x - y = 2\pi k, \\ \begin{cases} x + y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x + y = \frac{\pi}{3} + 2\pi n \end{cases} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + \pi(n + k), \\ y = -\frac{\pi}{6} + \pi(n - k), \end{cases} \\ \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \pi(n + k), \\ y = \frac{\pi}{6} + \pi(n - k), \end{cases} \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{\pi}{6} + \pi(n+k), -\frac{\pi}{6} + \pi(n-k) \right), \right. \\ \left. \left(\frac{\pi}{6} + \pi(n+k), \frac{\pi}{6} + \pi(n-k) \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin(x - 2^\circ) \cos(2y + 1^\circ) = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{4}, \\ \sin(2y + 1^\circ) \cos(x - 2^\circ) = -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{4}. \end{cases} \quad (3)$$

Решение. Система (3) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin(x - 2^\circ) \cos(2y + 1^\circ) + \sin(2y + 1^\circ) \cos(x - 2^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \sin(x - 2^\circ) \cos(2y + 1^\circ) - \sin(2y + 1^\circ) \cos(x - 2^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \sin(x + 2y - 1^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \sin(x - 2y - 3^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases} \quad (4)$$

Система (4) равносильна совокупности четырех систем:

$$\begin{cases} x + 2y - 1^\circ = -60^\circ + 360^\circ \cdot k, \\ x - 2y - 3^\circ = 45^\circ + 360^\circ \cdot n \end{cases} \iff \begin{cases} x = -5^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k + n), \\ y = -26^\circ 45' + 90^\circ \cdot (k - n); \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - 1^\circ = -60^\circ + 360^\circ \cdot k, \\ x - 2y - 3^\circ = 135^\circ + 360^\circ \cdot n \end{cases} \iff \begin{cases} x = 39^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k + n), \\ y = -49^\circ 15' + 90^\circ \cdot (k - n); \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - 1^\circ = -120^\circ + 360^\circ \cdot k, \\ x - 2y - 3^\circ = 45^\circ + 360^\circ \cdot n \end{cases} \iff \begin{cases} x = -39^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k + n), \\ y = -41^\circ 45' + 90^\circ \cdot (k - n); \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y - 1^\circ = -120^\circ + 360^\circ \cdot k, \\ x - 2y - 3^\circ = 135^\circ + 360^\circ \cdot n \end{cases} \iff \begin{cases} x = 9^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k + n), \\ y = -64^\circ 15' + 90^\circ \cdot (k - n), \end{cases}$$

где k и n — любые целые числа.

Ответ: $\{(-5^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k+n), -26^\circ 45' + 90^\circ \cdot (k-n)), (39^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k+n), -49^\circ 15' + 90^\circ \cdot (k-n)), (-39^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k+n), -41^\circ 45' + 90^\circ \cdot (k-n)), (9^\circ 30' + 180^\circ \cdot (k+n), -64^\circ 15' + 90^\circ \cdot (k-n))\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}$.

2. К решению систем (1) приводятся системы:

$$\begin{cases} \sin x \sin y = a, \\ \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = b, \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \sin y = a, \\ \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y = b, \end{cases} \quad \begin{cases} \cos x \cos y = a, \\ \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = b, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x \cos y = a, \\ \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y = b, \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cos y = a, \\ \operatorname{tg} x \operatorname{ctg} y = b, \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x \cos y = a, \\ \operatorname{ctg} x \operatorname{tg} y = b. \end{cases}$$

Задача 3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x \cos y = -\frac{1}{2}, \\ \operatorname{tg} x \operatorname{ctg} y = 1. \end{cases} \quad (5)$$

Решение. Система уравнений (5) равносильна системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin x \cos y = -\frac{1}{2}, \\ \frac{\sin x \cos y}{\cos x \sin y} = 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin x \cos y = -\frac{1}{2}, \\ \cos x \sin y = -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \sin x \cos y + \cos x \sin y = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}, \\ \sin x \cos y - \cos x \sin y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \sin(x+y) = -1, \\ \sin(x-y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ x-y = \pi k \end{cases} \iff \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}(2n+k), \\ y = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}(2n-k), \forall n, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{4}(4n+2k-1), \frac{\pi}{4}(4n-2k-1) \right) \right\}, \forall n, k \in \mathbb{Z}.$

Задача 4. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{4}, \\ 3 \operatorname{tg} x = \operatorname{ctg} y. \end{cases} \quad (6)$$

Решение. Система (6) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{4}, \\ \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y = 3 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{4}, \\ \frac{\cos x \cos y}{\sin x \sin y} = 3. \end{cases}$$

Полученная система равносильна системе (2).

Ответ: $\left\{ \left(-\frac{\pi}{6} + \pi(n+k), -\frac{\pi}{6} + \pi(n-k) \right), \right. \\ \left. \left(\frac{\pi}{6} + \pi(n+k), \frac{\pi}{6} + \pi(n-k) \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$

3. Системы (знаки берутся в любом сочетании)

$$\begin{cases} \sin x \pm \sin y = a, \\ \cos x \pm \cos y = b \end{cases}$$

решаются с использованием формул суммы и разности тригонометрических функций синус и косинус.

Задача 5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = 1, \\ \cos x - \cos y = \sqrt{3}. \end{cases} \quad (7)$$

Решение. Используя формулу суммы синусов и формулу разности косинусов, систему (7) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = 1, \\ -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} = \sqrt{3}. \end{cases} \quad (8)$$

Разделим второе уравнение системы (8) на первое уравнение этой системы. В результате получим уравнение

$$\operatorname{tg} \frac{x-y}{2} = -\sqrt{3} \iff x-y = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Теперь систему (7) заменим равносильной системой

$$\begin{aligned} \begin{cases} x-y = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \\ \cos x - \cos y = \sqrt{3} \end{cases} &\iff \begin{cases} y = x + \frac{2\pi}{3} - 2\pi k, \\ \cos x - \cos y = \sqrt{3} \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} y = x + \frac{2\pi}{3} - 2\pi k, \\ \cos x - \cos\left(x + \frac{2\pi}{3} - 2\pi k\right) = \sqrt{3}, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned} \quad (9)$$

Так как

$$\cos(\alpha - 2\pi k) = \cos \alpha, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то второе уравнение системы (9) равносильно уравнению

$$\begin{aligned} \cos x - \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) &= \sqrt{3} \iff -2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \iff \\ \iff -2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) &= \sqrt{3} \iff \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \iff \\ \iff x + \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{2} + 2\pi m \iff x = \frac{\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Из первого уравнения системы (9) находим

$$y = \frac{\pi}{6} + 2\pi m + \frac{2\pi}{3} - 2\pi k = \frac{5\pi}{6} + 2\pi(m - k), \forall m, k \in \mathbb{Z}.$$

Итак, решениями системы (7) будут упорядоченные пары чисел

$$\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi m, \frac{5\pi}{6} + 2\pi(m - k)\right), \forall m, k \in \mathbb{Z}.$$

Заметим, что вне зависимости от $m \in \mathbb{Z}$ разность $m - k$ является произвольным целым числом (так как k — любое целое число).

Поэтому решения системы (7) можно записать с помощью упорядоченных пар

$$\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi m, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right), \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi m, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right)\right\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

4. С использованием формул суммы и разности тангенсов решаются некоторые тригонометрические системы, у которых одно из уравнений имеет вид:

$$\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y = a.$$

Задача 6. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y = 2, \\ \cos x \cos y = 0,5. \end{cases} \quad (10)$$

Решение. Система уравнений (10) равносильна системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y} = 2, \\ \cos x \cos y = \frac{1}{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin(x+y) = 1, \\ 2 \cos x \cos y = 1 \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} \sin(x+y) = 1, \\ \cos(x-y) + \cos(x+y) = 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin(x+y) = 1, \\ \cos(x-y) = 1 \end{cases} \iff \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \\ x - y = 2\pi n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi(k + n), \\ y = \frac{\pi}{4} + \pi(k - n), \forall n, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Было использовано, что если $\sin(x + y) = 1$, то $\cos(x + y) = 0$.

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{4} + \pi(k + n), \frac{\pi}{4} + \pi(k - n) \right) \right\}, \forall n, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 7. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y = 1, \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases} \quad (11)$$

Решение. В соответствии с формулой разности тангенсов система (11) равносильна системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} \frac{\sin(x - y)}{\cos x \cos y} = 1, \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x - y) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \cos x \cos y = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = (-1)^l \cdot \frac{\pi}{4} + \pi l, \forall l \in \mathbb{Z}, \\ \cos(x - y) + \cos(x + y) = \sqrt{2}. \end{cases} \end{aligned} \quad (12)$$

Если $l = 2k$, то

$$x - y = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

при этом второе уравнение системы (12) примет вид:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right) + \cos(x + y) = \sqrt{2} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} + \cos(x + y) = \sqrt{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \cos(x + y) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x + y = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Таким образом, при $l = 2k, \forall k \in \mathbb{Z}$ система (12) равносильна со-

вокупности двух алгебраических систем:

$$\begin{cases} x - y = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \\ x + y = \frac{\pi}{4} + 2\pi n \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi(k + n), \\ y = \pi(n - k), \forall k, n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \\ x + y = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi(k + n), \\ y = -\frac{\pi}{4} + \pi(n - k), \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Если $l = 2k + 1$, то

$$x - y = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

при этом второе уравнение системы (12) примет вид:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{3\pi}{4} + 2\pi k\right) + \cos(x + y) &= \sqrt{2} \iff -\frac{\sqrt{2}}{2} + \cos(x + y) = \sqrt{2} \iff \\ \iff \cos(x + y) &= \frac{3\sqrt{2}}{2}, \end{aligned}$$

и не имеет решений, так как $\frac{3\sqrt{2}}{2} > 1$, а $\cos(x + y) \leq 1, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{4} + \pi(k + n), \pi(n - k) \right), \left(\pi(k + n), -\frac{\pi}{4} + \pi(n - k) \right) \right\},$$

где k и n — любые целые числа.

5. С использованием формул произведения тригонометрических функций синус и косинус решаются, например, такие системы.

Задача 8. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} = 2, \\ \operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y = -\frac{9}{5}. \end{cases} \quad (13)$$

Решение. Система (13) равносильна системе

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + \operatorname{tg} \frac{y}{2} = 2, \\ \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}} + \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{y}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{y}{2}} = -\frac{9}{5}. \end{cases}$$

Подстановкой

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = u \neq 0, \quad \operatorname{tg} \frac{y}{2} = v \neq 0$$

получаем:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} u + v = 2, \\ v - vu^2 + u - uv^2 = -\frac{18}{5}uv \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} u + v = 2, \\ (u + v)(1 - uv) = -\frac{18}{5}uv \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} u + v = 2, \\ 2(1 - uv) = -\frac{18}{5}uv \end{cases} \iff \begin{cases} u + v = 2, \\ uv = -\frac{5}{4}. \end{cases} \end{aligned}$$

Согласно обратной теореме Виета u и v являются корнями приведенного квадратного уравнения

$$\lambda^2 - 2\lambda - \frac{5}{4} = 0 \iff \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\left(\lambda - \frac{5}{2}\right) = 0 \iff \begin{cases} \lambda = -\frac{1}{2}, \\ \lambda = 2\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Следовательно, решениями алгебраической системы будут упорядоченные пары

$$\left(-\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2}\right) \quad \text{и} \quad \left(2\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Итак, система (13) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = -\frac{1}{2}, \\ \operatorname{tg} \frac{y}{2} = 2\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi k, \\ y = 2 \operatorname{arctg} 2\frac{1}{2} + 2\pi n, \forall k, n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 2\frac{1}{2}, \\ \operatorname{tg} \frac{y}{2} = -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \operatorname{arctg} 2\frac{1}{2} + 2\pi k, \\ y = -2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi n, \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(-2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi k, 2 \operatorname{arctg} 2\frac{1}{2} + 2\pi n \right), \right.$
 $\left. \left(2 \operatorname{arctg} 2\frac{1}{2} + 2\pi k, -2 \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + 2\pi n \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$

Задача 9. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x - \frac{1}{\sin x} = \sin y, \\ \cos x - \frac{1}{\cos x} = \cos y. \end{cases} \quad (14)$$

Решение. Система (14) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin^2 x - 1 = \sin x \sin y, \\ \cos^2 x - 1 = \cos x \cos y \end{cases} \iff \begin{cases} -\cos^2 x = \sin x \sin y, \\ -\sin^2 x = \cos x \cos y. \end{cases}$$

Сложим первое и второе уравнения:

$$\begin{aligned} -(\cos^2 x + \sin^2 x) &= \cos x \cos y + \sin x \sin y \iff \cos(x-y) = -1 \iff \\ &\iff x-y = \pi + 2\pi k \iff x = \pi + 2\pi k + y, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Подставим это значение x в первое уравнение:

$$\begin{aligned} -\cos^2 y &= -\sin^2 y \iff \cos^2 y - \sin^2 y = 0 \iff \\ &\iff \cos 2y = 0 \iff y = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Тогда

$$x = \frac{5\pi}{4} + \pi\left(2k + \frac{n}{2}\right), \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Значит, множество решений системы (14) состоит из упорядоченных пар:

$$\left\{ \left(\frac{5\pi}{4} + \pi\left(2k + \frac{n}{2}\right), \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \right) \right\}, \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{5\pi}{4} + \pi\left(2k + \frac{n}{2}\right), \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \right) \right\}, \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}.$

Задача 10. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{1}{2}, \\ \cos x \cos y = \frac{1}{4}. \end{cases} \quad (15)$$

Решение. Первое уравнение системы (15) преобразуем с использованием формулы произведения косинусов.

В результате получим систему, равносильную системе (15):

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = 1, \\ \cos x \cos y = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Пусть

$$\cos x = u, \quad \cos y = v.$$

Тогда

$$u + v = 1, \quad uv = \frac{1}{4}.$$

По обратной теореме Виета u и v являются корнями приведенного квадратного уравнения

$$\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0 \iff \left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \iff \lambda = \frac{1}{2}.$$

Значит,

$$u = v = 0,5.$$

Система (15) равносильна системе двух простейших тригонометрических уравнений:

$$\cos x = 0,5 \quad \text{и} \quad \cos y = 0,5.$$

Множество решений системы (15) состоит из множества упорядоченных пар чисел:

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi m, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi m, \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \\ & \left(\frac{\pi}{3} + 2\pi m, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \left(\frac{\pi}{3} + 2\pi m, \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \forall m, n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } & \left\{ \left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi m, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi m, \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \right. \\ & \left. \left(\frac{\pi}{3} + 2\pi m, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \left(\frac{\pi}{3} + 2\pi m, \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right) \right\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Задача 11. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin^2 x + \cos^2 y = \frac{11}{16}, \\ \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{5}{8}. \end{cases} \quad (16)$$

Решение. Первое уравнение системы (16) преобразуем с использованием основного тригонометрического тождества, а второе уравнение — с использованием формулы произведения синуса на косинус.

В результате получим систему, равносильную системе (16):

$$\begin{cases} \sin^2 x + 1 - \sin^2 y = \frac{11}{16}, \\ \frac{1}{2}(\sin x + \sin y) = \frac{5}{8} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin^2 x - \sin^2 y = -\frac{5}{16}, \\ \sin x + \sin y = \frac{5}{4} \end{cases} \iff$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \begin{cases} (\sin x - \sin y)(\sin x + \sin y) = -\frac{5}{16}, \\ \sin x + \sin y = \frac{5}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x - \sin y = -\frac{1}{4}, \\ \sin x + \sin y = \frac{5}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2}, \\ \sin y = \frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = (-1)^m \cdot \arcsin \frac{3}{4} + \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}. \end{cases}
\end{aligned}$$

Ответ: $\left\{ \left((-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k, (-1)^m \cdot \arcsin \frac{3}{4} + \pi m \right) \right\}, \forall k, m \in \mathbb{Z}.$

6. Тригонометрические системы, содержащие уравнения

$$\sin^2 x \pm \sin^2 y = a, \cos^2 x \pm \cos^2 y = a, \sin^2 x \pm \cos^2 y = a,$$

решаются с использованием основного тригонометрического тождества. Например, так решалась система (16).

Задача 12. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos 2x + 2 \cos y = 1, \\ \sin^2 x + \cos^2 y = \frac{3}{4}. \end{cases} \quad (17)$$

Решение. Система (17) равносильна системе

$$\begin{cases} 1 - 2 \sin^2 x + 2 \cos y = 1, \\ \sin^2 x + \cos^2 y = \frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin^2 x - \cos y = 0, \\ \sin^2 x + \cos^2 y = \frac{3}{4}. \end{cases}$$

Пусть

$$u = \sin^2 x, \quad v = \cos y.$$

Тогда

$$\begin{cases} u - v = 0, \\ u + v^2 = \frac{3}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} u = v, \\ v^2 + v - \frac{3}{4} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} u = v, \\ \left(v + \frac{3}{2}\right)\left(v - \frac{1}{2}\right) = 0, \end{cases}$$

и решениями будут

$$u = v = -1\frac{1}{2} \quad \text{и} \quad u = v = \frac{1}{2}.$$

Учитывая, что в силу замены $u \geq 0$, получаем, что система (17) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin^2 x = \frac{1}{2}, \\ \cos y = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} |\sin x| = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \cos y = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n, \\ y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \end{cases} \\ \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n, \\ y = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \end{cases} \end{cases}$$

где n и k — любые целые числа.

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \right), \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n, \frac{\pi}{3} + 2\pi k \right) \right\}, \forall n, k \in \mathbb{Z}$.

Задача 13. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = 0,5, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = 1,75. \end{cases} \quad (18)$$

Решение. Второе уравнение системы (18) равносильно уравнению

$$1 - \cos^2 x + 1 - \cos^2 y = 1,75 \iff \cos^2 x + \cos^2 y = 0,25.$$

Из первого уравнения системы (18) выразим

$$\cos y = 0,5 - \cos x.$$

Тогда

$$\cos^2 x + (0,5 - \cos x)^2 = 0,25 \iff 2 \cos^2 x - \cos x = 0 \iff$$

$$\iff \cos x(2 \cos x - 1) = 0 \iff \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x = 0,5. \end{cases}$$

Следовательно, система (18) равносильна совокупности двух тригонометрических систем:

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos y = 0,5 - \cos x \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos y = 0,5 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = 90^\circ + 180^\circ \cdot k, \\ y = \pm 60^\circ + 360^\circ \cdot n, \forall k, n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos x = 0,5, \\ \cos y = 0,5 - \cos x \end{cases} \iff \begin{cases} \cos x = 0,5, \\ \cos y = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = \pm 60^\circ + 360^\circ \cdot k, \\ y = 90^\circ + 180^\circ \cdot n, \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\{(90^\circ + 180^\circ \cdot k, 60^\circ + 360^\circ \cdot n), (90^\circ + 180^\circ \cdot k, -60^\circ + 360^\circ \cdot n), (60^\circ + 360^\circ \cdot k, 90^\circ + 180^\circ \cdot n), (-60^\circ + 360^\circ \cdot k, 90^\circ + 180^\circ \cdot n)\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$

Задача 14. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sqrt{2} \sin x = \sin y, \\ \sqrt{2} \cos x = \sqrt{5} \cos y. \end{cases} \quad (19)$$

Решение. Возведем обе части каждого уравнения в квадрат и сложим. Получим уравнение-следствие системы (19):

$$2 \sin^2 x + 2 \cos^2 x = \sin^2 y + 5 \cos^2 y \iff \sin^2 y + 5 \cos^2 y = 2 \iff$$

$$\iff 1 + 4 \cos^2 y = 2 \iff \cos^2 y = \frac{1}{4} \iff \cos y = \pm \frac{1}{2}.$$

а) Если

$$\cos y = \frac{1}{2},$$

то из второго уравнения системы (19) следует, что

$$\cos x = \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

Если

$$\cos x = \frac{\sqrt{10}}{4},$$

то

$$\sin x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

Если

$$\cos y = \frac{1}{2},$$

то

$$\sin y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Проверкой убеждаемся, что набор

$$\sin x = \frac{\sqrt{6}}{4}, \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

и набор

$$\sin x = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \sin y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

удовлетворяют первому уравнению системы (19); два других: набор

$$\sin x = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

и набор

$$\sin x = \frac{\sqrt{6}}{4}, \sin y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

первому уравнению системы (19) не удовлетворяют.

Если

$$\cos x = \frac{\sqrt{10}}{4}, \sin x = \frac{\sqrt{6}}{4},$$

то

$$x = \arccos \frac{\sqrt{10}}{4} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$\cos y = \frac{1}{2}, \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

то

$$y = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$\cos x = \frac{\sqrt{10}}{4}, \sin x = -\frac{\sqrt{6}}{4},$$

то

$$x = -\arccos \frac{\sqrt{10}}{4} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$\cos y = \frac{1}{2}, \sin y = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

то

$$y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

б) Если

$$\cos y = -\frac{1}{2},$$

то из второго уравнения системы (19) следует, что

$$\cos x = -\frac{\sqrt{10}}{4}.$$

Если

$$\cos y = -\frac{1}{2},$$

то

$$\sin y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Если

$$\cos x = -\frac{\sqrt{10}}{4},$$

то

$$\sin x = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

Проверкой убеждаемся, что из четырех возможных наборов первому уравнению системы (19) удовлетворяют только два набора: набор

$$\sin x = \frac{\sqrt{6}}{4}, \quad \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

и набор

$$\sin x = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \quad \sin y = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Если

$$\cos x = -\frac{\sqrt{10}}{4}, \quad \sin x = \frac{\sqrt{6}}{4},$$

то

$$x = \pi - \arccos \frac{\sqrt{10}}{4} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$\cos y = -\frac{1}{2}, \quad \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

то

$$y = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$\cos x = -\frac{\sqrt{10}}{4}, \quad \sin x = -\frac{\sqrt{6}}{4},$$

то

$$x = -\pi + \arccos \frac{\sqrt{10}}{4} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$\cos y = -\frac{1}{2}, \quad \sin y = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

то

$$y = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(A + 2\pi k, \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \left(-A + 2\pi k, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n \right), \right. \\ \left. \left(\pi - A + 2\pi k, \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \right), \left(-\pi + A + 2\pi k, -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n \right) \right\}, \quad \forall k, n \in \mathbb{Z},$$

где $A = \arccos \frac{\sqrt{10}}{4}$.

Задача 15. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 4 \sin x - 2 \sin y = 3, \\ 2 \cos x - \cos y = 0. \end{cases} \quad (20)$$

Решение. Система (20) равносильна системе уравнений

$$\begin{cases} \sin x = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \sin y, \\ \cos x = \frac{1}{2} \cos y. \end{cases} \quad (21)$$

Возведя уравнения системы (21) в квадрат, а затем складывая полученные равенства, получим уравнение, являющееся следствием сис-

темы (21):

$$1 = \frac{9}{16} + \frac{3}{4} \sin y + \frac{1}{4} \sin^2 y + \frac{1}{4} \cos^2 y \iff$$

$$\iff \sin y = \frac{1}{4} \iff y = (-1)^n \cdot \arcsin \frac{1}{4} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

При $\sin y = 0,25$ из первого уравнения системы (21) получим, что

$$\sin x = \frac{7}{8} \iff x = (-1)^m \cdot \arcsin \frac{7}{8} + \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Поскольку при решении использовалась операция возведения в квадрат, то могли появиться посторонние решения. Поэтому необходимо произвести отбор, подставив найденные значения x и y во второе уравнение системы (20).

Второе уравнение системы (20)

$$2 \cos x - \cos y = 0 \iff 2 \cos x = \cos y$$

требует, чтобы $\cos x$ и $\cos y$ были одного знака. Это возможно, если только m и n оба четные (соответствующие значения $\cos x$ и $\cos y$ будут положительными) или оба нечетные (соответствующие значения $\cos x$ и $\cos y$ будут отрицательными).

Итак, следует взять лишь

$$\begin{cases} x = \arcsin \frac{7}{8} + 2\pi k, \\ y = \arcsin \frac{1}{4} + 2\pi l \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = -\arcsin \frac{7}{8} + \pi(2k+1), \\ y = -\arcsin \frac{1}{4} + \pi(2l+1), \end{cases}$$

где k и l — целые числа.

Поскольку

$$2 \cos\left(\arcsin \frac{7}{8} + 2\pi k\right) = 2 \cos\left(\arcsin \frac{7}{8}\right) = 2\sqrt{1 - \sin^2\left(\arcsin \frac{7}{8}\right)} =$$

$$= 2\sqrt{1 - \frac{49}{64}} = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

$$\cos\left(\arcsin \frac{1}{4} + 2\pi l\right) = \cos\left(\arcsin \frac{1}{4}\right) = \sqrt{1 - \sin^2\left(\arcsin \frac{1}{4}\right)} =$$

$$= \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

$$\begin{aligned} 2 \cos\left(-\arcsin \frac{7}{8} + 2\pi k + \pi\right) &= 2 \cos\left(\pi - \arcsin \frac{7}{8}\right) = \\ &= -2 \cos\left(\arcsin \frac{7}{8}\right) = -\frac{\sqrt{15}}{4}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos\left(-\arcsin \frac{1}{4} + 2\pi l + \pi\right) &= \cos\left(\pi - \arcsin \frac{1}{4}\right) = \\ &= -\cos\left(\arcsin \frac{1}{4}\right) = -\frac{\sqrt{15}}{4}, \forall k, l \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

то система (20) равносильна совокупности систем:

$$\begin{aligned} &\left[\begin{cases} x = \arcsin \frac{7}{8} + 2\pi k, \\ y = \arcsin \frac{1}{4} + 2\pi l, \end{cases} \right. \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{cases} x = -\arcsin \frac{7}{8} + \pi(2k+1), \\ y = -\arcsin \frac{1}{4} + \pi(2l+1) \end{cases} \right. \\ &\Longleftrightarrow \quad \left\{ \begin{aligned} x &= (-1)^p \cdot \arcsin \frac{7}{8} + \pi p, \\ y &= (-1)^p \cdot \arcsin \frac{1}{4} + \pi(p+2q), \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

где k, l, p, q — целые числа.

Ответ:

$$\left\{ \left((-1)^p \cdot \arcsin \frac{7}{8} + \pi p, (-1)^p \cdot \arcsin \frac{1}{4} + \pi(p+2q) \right) \right\}, \forall p, q \in \mathbb{Z}.$$

Задача 16. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 6 \cos x + 4 \cos y = 5, \\ 3 \sin x + 2 \sin y = 0. \end{cases} \quad (22)$$

Решение. Первое уравнение системы (22) запишем в виде

$$6 \cos x = 5 - 4 \cos y,$$

а второе уравнение этой системы запишем в виде

$$6 \sin x = -4 \sin y.$$

Оба равенства возведем в квадрат и сложим:

$$\begin{aligned} 36 \cos^2 x + 36 \sin^2 x &= (5 - 4 \cos y)^2 + 16 \sin^2 y \iff \\ \iff 36 &= 25 - 40 \cos y + 16 \cos^2 y + 16 \sin^2 y \iff \\ \iff \cos y &= \frac{1}{8} \iff y = \pm \arccos \frac{1}{8} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Из первого уравнения системы (22) с учетом того, что $\cos y = \frac{1}{8}$, получаем простейшее тригонометрическое уравнение

$$\cos x = \frac{3}{4} \iff x = \pm \arccos \frac{3}{4} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

При возведении в квадрат могли быть получены посторонние корни. Выполним проверку.

При этом учтем, что

$$\sin\left(-\arccos \frac{1}{8}\right) = -\sin\left(\arccos \frac{1}{8}\right) = -\sqrt{1 - \frac{1}{64}} = -\frac{\sqrt{63}}{8} = -\frac{3\sqrt{7}}{8},$$

а

$$\sin\left(-\arccos \frac{3}{4}\right) = -\sin\left(\arccos \frac{3}{4}\right) = -\sqrt{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{\sqrt{7}}{4}.$$

Если

$$x = \arccos \frac{3}{4} + 2\pi m, \quad y = \arccos \frac{1}{8} + 2\pi k, \quad \forall k, m \in \mathbb{Z},$$

и если

$$x = -\arccos \frac{3}{4} + 2\pi m, \quad y = -\arccos \frac{1}{8} + 2\pi k, \quad \forall k, m \in \mathbb{Z},$$

то выражение $3 \sin x + 2 \sin y$ не равно нулю:

$$\begin{aligned} & 3 \sin\left(\arccos \frac{3}{4} + 2\pi m\right) + 2 \sin\left(\arccos \frac{1}{8} + 2\pi k\right) = \\ &= 3 \sin \arccos \frac{3}{4} + 2 \sin \arccos \frac{1}{8} = 3 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} + 2 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{3\sqrt{7}}{2}; \\ & 3 \sin\left(-\arccos \frac{3}{4} + 2\pi m\right) + 2 \sin\left(-\arccos \frac{1}{8} + 2\pi k\right) = \\ &= 3 \sin\left(-\arccos \frac{3}{4}\right) + 2 \sin\left(-\arccos \frac{1}{8}\right) = -\frac{3\sqrt{7}}{2}. \end{aligned}$$

Аналогичными вычислениями устанавливаем, что пары чисел

$$x = \arccos \frac{3}{4} + 2\pi m, \quad y = -\arccos \frac{1}{8} + 2\pi k, \quad \forall k, m \in \mathbb{Z}$$

и

$$x = -\arccos \frac{3}{4} + 2\pi m, \quad y = \arccos \frac{1}{8} + 2\pi k, \quad \forall k, m \in \mathbb{Z}$$

удовлетворяют второму уравнению системы (22). Следовательно, только они образуют множество решений системы (22).

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } \left\{ \left(-\arccos \frac{3}{4} + 2\pi m, \arccos \frac{1}{8} + 2\pi k \right), \right. \\ \left. \left(\arccos \frac{3}{4} + 2\pi m, -\arccos \frac{1}{8} + 2\pi k \right) \right\}, \quad \forall k, m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Задача 17. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 3 \cos 3x = \sin(x + 2y), \\ 3 \sin(2x + y) = -\cos 3y. \end{cases} \quad (23)$$

Решение. Заметим, что сумма аргументов косинусов в уравнениях системы, равная $3x + 3y$, совпадает с суммой аргументов синусов

$$(x + 2y) + (2x + y) = 3x + 3y.$$

Учитывая это обстоятельство, перемножим уравнения системы „крест-накрест“, т.е. умножим левую часть одного уравнения на правую часть другого.

В результате получим тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} & -3 \cos 3x \cos 3y = 3 \sin(x + 2y) \sin(2x + y) \iff \\ \iff & -\cos(3x - 3y) - \cos(3x + 3y) = \cos(-x + y) - \cos(3x + 3y) \iff \\ \iff & \cos(y - x) + \cos(3x - 3y) = 0 \iff \\ \iff & \cos(x - y) \cos(2x - 2y) = 0 \iff \\ \iff & \begin{cases} \cos(x - y) = 0, \\ \cos(2x - 2y) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Поскольку полученная совокупность равенств является следствием системы (23), то можем считать, что система (23) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \cos(x - y) = 0, \\ 3 \cos 3x = \sin(x + 2y), \\ 3 \sin(2x + y) = -\cos 3y \end{cases} \quad (24)$$

и

$$\begin{cases} \cos(2x - 2y) = 0, \\ 3 \cos 3x = \sin(x + 2y), \\ 3 \sin(2x + y) = -\cos 3y. \end{cases} \quad (25)$$

Из уравнения

$$\cos(x - y) = 0$$

находим, что

$$x = y + \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Поэтому система (24) равносильна системе

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ 3 \cos\left(3y + \frac{3\pi}{2} + 3\pi n\right) = \sin\left(3y + \frac{\pi}{2} + \pi n\right), \\ 3 \sin(3y + \pi + 2\pi n) = -\cos 3y \end{cases} \iff \\
& \iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ 3 \sin 3y = \cos 3y \end{cases} \iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ \operatorname{tg} 3y = \frac{1}{3} \end{cases} \iff \\
& \iff \begin{cases} y = \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \frac{\pi}{3} m, \\ x = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \frac{\pi}{3} (m + 3n), \forall m, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}
\end{aligned}$$

Из тригонометрического уравнения

$$\cos(2x - 2y) = 0$$

находим, что

$$x = y + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Поэтому система (25) равносильна системе

$$\begin{cases} x = y + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k, \\ 3 \cos\left(3y + \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{2} k\right) = \sin\left(3y + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k\right), \\ 3 \sin\left(3y + \frac{\pi}{2} + \pi k\right) = -\cos 3y, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (26)$$

Третье уравнение системы (26) равносильно уравнению

$$\begin{aligned}
& 3 \cos(3y + \pi k) + \cos 3y = 0 \iff \\
& \iff 3 \cdot (-1)^k \cdot \cos 3y + \cos 3y = 0 \iff
\end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow (3 \cdot (-1)^k + 1) \cos 3y = 0 \Longleftrightarrow \cos 3y = 0 \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow y = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} l, \forall k, l \in \mathbb{Z}.$$

Тогда второе уравнение системы (26) будет иметь вид:

$$3 \cos\left(\pi l + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{2} k\right) = \sin\left(\pi l + \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k\right) \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow 3 \sin\left(\pi l + \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{2} k\right) + \sin\left(\pi l + \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k\right) = 0 \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow 3 \cdot (-1)^l \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{2} k\right) + (-1)^l \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k\right) = 0 \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow (-1)^l \cdot (3 \cdot (-1)^k + 1) \sin\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} k\right) = 0.$$

Полученное равенство не выполняется ни при каких целых l и k . Поэтому система (25) решений не имеет.

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{3} \arctg \frac{1}{3} + \frac{\pi}{3} (m + 3n), \frac{1}{3} \arctg \frac{1}{3} + \frac{\pi}{3} m \right) \right\},$

где m и n — любые целые числа.

§ 4. Решения тригонометрических систем, удовлетворяющие заданным условиям

Среди тригонометрических систем выделим системы, у которых требуется найти решения, удовлетворяющие наперед заданным условиям.

При этом выделяются два подхода, когда начальные условия органически входят в процесс решения задач и когда сначала находятся все решения системы, а затем из полученного множества выделяются те, которые удовлетворяют начальным условиям. Во втором случае по сути решаются две самостоятельные задачи.

Задача 1. Найдите решения системы уравнений:

$$\begin{cases} \sin x = \sin 2y, \\ \cos x = \sin y, \end{cases} \quad (1)$$

удовлетворяющие условиям $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$.

Решение. Возведем уравнения системы (1) в квадрат и сложим. Получим уравнение

$$\begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x &= \sin^2 2y + \sin^2 y \iff 1 = 4 \sin^2 y \cos^2 y + \sin^2 y \iff \\ &\iff 4 \sin^2 y (1 - \sin^2 y) + \sin^2 y = 1 \iff 4 \sin^4 y - 5 \sin^2 y + 1 = 0 \iff \\ &\iff (4 \sin^2 y - 1)(\sin^2 y - 1) = 0 \iff \begin{cases} \sin^2 y = 0,25, \\ \sin^2 y = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Если $0 \leq y \leq \pi$, то $\sin y \geq 0$.

Поэтому систему (1) будем рассматривать в двух случаях, когда $\sin y = 1$ и когда $\sin y = 0,5$.

Если $\sin y = 1$, то $\cos y = 0$, а значит,

$$\sin 2y = 2 \sin y \cos y = 0.$$

Из системы (1) получаем, что

$$\sin x = 0 \quad \text{и} \quad \cos x = 1, \quad \text{т.е.} \quad \cos x = 1.$$

Система

$$\begin{cases} \cos x = 1, \\ \sin y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \forall l \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Условиям

$$0 \leq x \leq \pi, \quad 0 \leq y \leq \pi$$

удовлетворяют лишь

$$x = 0, \quad y = \frac{\pi}{2}.$$

Если $\sin y = \frac{1}{2}$, то

$$\cos y = \pm \sqrt{1 - \sin^2 y} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Пусть

$$\begin{cases} \sin y = \frac{1}{2}, \\ \cos y = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \iff y = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Условию $0 \leq y \leq \pi$ удовлетворяет $y = \frac{\pi}{6}$.

В этом случае из системы (1) получаем, что

$$\begin{cases} \sin x = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \iff x = \frac{\pi}{3} + 2\pi l, \forall l \in \mathbb{Z}.$$

Условию $0 \leq x \leq \pi$ удовлетворяет $x = \frac{\pi}{3}$.

Значит, $x = \frac{\pi}{3}$, $y = \frac{\pi}{6}$ — решение системы (1), удовлетворяющее условиям $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$.

Если

$$\sin y = \frac{1}{2}, \quad \cos y = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

то из первого уравнения системы (1) получаем уравнение

$$\sin x = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$

ни один корень которого не принадлежит отрезку $[0; \pi]$.

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right) \right\}.$$

Задача 2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos 6x + \cos 8x = 0, \\ \cos 3x = 2 \sin^2 2x. \end{cases} \quad (2)$$

Найдите решения, удовлетворяющие условию $|x| < 5$.

Решение. Уравнение

$$\cos 6x + \cos 8x = 0 \iff 2 \cos 7x \cos x = 0 \iff \begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos 7x = 0. \end{cases}$$

Если

$$\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

то

$$\cos 7x = \cos\left(\frac{7\pi}{2} + 7\pi k\right) = 0, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, первое уравнение системы (2) равносильно уравнению

$$\cos 7x = 0.$$

Уравнение

$$\begin{aligned} \cos 3x = 2 \sin^2 2x &\iff \cos 3x = 1 - \cos 4x \iff \\ &\iff \cos 3x + \cos 4x = 1 \iff \cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Следовательно, система (2) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos 7x = 0, \\ \cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (3)$$

Уравнение

$$\cos 7x = 0 \iff 2 \cos^2 \frac{7x}{2} - 1 = 0 \iff \cos^2 \frac{7x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Возведем второе уравнение системы (3) в квадрат и учтем, что

$$\cos^2 \frac{7x}{2} = \frac{1}{2}.$$

В результате получим равенство

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, система (3) равносильна системе трех уравнений

$$\cos^2 \frac{7x}{2} = \frac{1}{2}, \quad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{7x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2},$$

которая равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \cos \frac{7x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \cos \frac{7x}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \cos \frac{x}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases} \quad (4)$$

Если

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \iff \frac{x}{2} = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

то

$$\cos \frac{7x}{2} = \cos \left(\pm \frac{7\pi}{4} + 14\pi k \right) = \cos \left(\pm \frac{7\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, первая система совокупности (4) равносильна уравнению

$$\cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Если

$$\cos \frac{x}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff \frac{x}{2} = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то

$$\begin{aligned} \cos \frac{7x}{2} &= \cos\left(\pm \frac{21\pi}{4} + 14\pi k\right) = \cos\left(\pm \frac{21\pi}{4}\right) = \cos\left(\mp \frac{3\pi}{4} \pm 6\pi\right) = \\ &= \cos\left(\mp \frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Таким образом, вторая система совокупности (4) равносильна уравнению

$$\cos \frac{x}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Следовательно, совокупность (4) равносильна совокупности двух уравнений:

$$\begin{aligned} \cos \frac{x}{2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} &\iff \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \iff 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = 0 \iff \\ &\iff \cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Итак, $\left\{\frac{\pi}{2} + \pi k\right\}, \forall k \in \mathbb{Z}$, — множество решений системы (2).

Выделим те решения системы (2), которые по модулю меньше 5. Неравенство

$$\begin{aligned} \left|\frac{\pi}{2} + \pi k\right| < 5 &\iff -5 < \frac{\pi}{2} + \pi k < 5 \iff \\ &\iff -5 - \frac{\pi}{2} < \pi k < 5 - \frac{\pi}{2} \iff -\frac{5}{\pi} - \frac{1}{2} < k < \frac{5}{\pi} - \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

а значит, k принимает целые значения: $-2, \pm 1, 0$, так как

$$\pi > 2 \iff \frac{1}{\pi} < \frac{1}{2} \iff \frac{5}{\pi} < \frac{5}{2} \iff -\frac{5}{\pi} > -\frac{5}{2} \iff -\frac{5}{\pi} - \frac{1}{2} > -3,$$

$$10 > 3\pi \iff \frac{5}{\pi} > \frac{3}{2} \iff -\frac{5}{\pi} < -\frac{3}{2} \iff -\frac{5}{\pi} - \frac{1}{2} < -2,$$

$$10 > 3\pi \iff \frac{5}{\pi} > \frac{3}{2} \iff \frac{5}{\pi} - \frac{1}{2} > 1,$$

$$\pi > 2 \iff \frac{1}{\pi} < \frac{1}{2} \iff \frac{5}{\pi} < \frac{5}{2} \iff \frac{5}{\pi} - \frac{1}{2} < 2.$$

Итак, $\left\{ \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2} \right\}$ — искомое множество решений.

Ответ: $\left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}; \left\{ \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2} \right\}$.

Задача 3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = 0, \\ \sin^2 x + \cos^2 y = 0,5 \end{cases} \quad (5)$$

при $0 < x < \pi, 0 < y < \pi$.

Решение. Система (5) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos y = -\sin x, \\ \sin^2 x = 0,25. \end{cases}$$

Поскольку

$$\sin x > 0, \forall x \in (0; \pi),$$

то поставленная задача сводится к нахождению всех решений системы

$$\begin{cases} \cos y = -\sin x, \\ \sin x = 0,5 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos y = -0,5, \\ \sin x = 0,5, \end{cases}$$

удовлетворяющих условию $0 < x < \pi, 0 < y < \pi$.

Из всего множества решений

$$\left\{ (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k \right\}, \forall k \in \mathbb{Z},$$

уравнения

$$\sin x = 0,5$$

интервалу $(0; \pi)$ принадлежат два числа $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

У простейшего тригонометрического уравнения

$$\cos y = -0,5$$

множеством решений является

$$\left\{ \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right\}, \forall k \in \mathbb{Z},$$

а интервалу $(0; \pi)$ принадлежит только одно число $\frac{2\pi}{3}$.

Следовательно, множество решений поставленной задачи состоит из двух упорядоченных пар $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$ и $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$.

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right) \right\}.$$

Задача 4. Найдите решения системы уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sec y = 2\sqrt[3]{14}, \\ \sin x \sec y = \sqrt[3]{196} - 2, \end{cases} \quad (6)$$

удовлетворяющие условиям $0 < x < \pi, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$.

Решение. Подстановкой

$$\sin x = u, \sec y = v$$

тригонометрическую систему (6) приводим к алгебраической системе

$$\begin{cases} u + v = 2\sqrt[3]{14}, \\ uv = \sqrt[3]{196} - 2. \end{cases}$$

Согласно обратной теореме Виета числа u и v являются корнями квадратного уравнения

$$\lambda^2 - 2\sqrt[3]{14}\lambda + (\sqrt[3]{14})^2 - 2 = 0 \iff (\lambda - \sqrt[3]{14})^2 = 2 \iff$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \lambda = \sqrt[3]{14} - \sqrt{2}, \\ \lambda = \sqrt[3]{14} + \sqrt{2}. \end{cases}$$

Следовательно, множество упорядоченных пар

$$\{(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2}, \sqrt[3]{14} + \sqrt{2}), (\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}, \sqrt[3]{14} - \sqrt{2})\}$$

будет множеством решений алгебраической системы, а в соответствии с выполненной подстановкой тригонометрическая система (6) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \sin x = \sqrt[3]{14} - \sqrt{2}, \\ \sec y = \sqrt[3]{14} + \sqrt{2}, \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x = \sqrt[3]{14} + \sqrt{2}, \\ \sec y = \sqrt[3]{14} - \sqrt{2}. \end{cases}$$

Так как

$$0 < 2 - \sqrt{2} = \sqrt[3]{8} - \sqrt{2} < \sqrt[3]{14} - \sqrt{2},$$

а

$$\begin{aligned} 49 < 50 &\Longleftrightarrow 7 < 5\sqrt{2} \Longleftrightarrow 14 < 1 + 3\sqrt{2} + 6 + 2\sqrt{2} \Longleftrightarrow \\ &\Longleftrightarrow 14 < (1 + \sqrt{2})^3 \Longleftrightarrow \sqrt[3]{14} < 1 + \sqrt{2} \Longleftrightarrow \sqrt[3]{14} - \sqrt{2} < 1, \end{aligned}$$

то

$$0 < \sqrt[3]{14} - \sqrt{2} < 1.$$

Поскольку

$$0 < \sqrt[3]{14} - \sqrt{2} < 1, \quad \sqrt[3]{14} + \sqrt{2} > 1,$$

то вторая система совокупности решений не имеет, а множество

$$\begin{aligned} &\left\{ \left((-1)^n \cdot \arcsin(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2}) + \pi n, -\arccos \frac{1}{\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}} + 2\pi m \right), \right. \\ &\left. \left((-1)^n \cdot \arcsin(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2}) + \pi n, \arccos \frac{1}{\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}} + 2\pi m \right) \right\}, \end{aligned}$$

где n и m — целые числа, является множеством решений системы (6).

Среди чисел

$$x = (-1)^n \cdot \arcsin(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2}) + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

условию $0 < x < \pi$ удовлетворяют

$$\arcsin(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2}) \quad \text{и} \quad \pi - \arcsin(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2}).$$

Среди чисел

$$y = \pm \arccos \frac{1}{\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

условию $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ удовлетворяют

$$-\arccos \frac{1}{\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}} \quad \text{и} \quad \arccos \frac{1}{\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}}.$$

Множеством упорядоченных пар (x, y) , являющихся решениями системы (6) и удовлетворяющих условиям $0 < x < \pi$, $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$, будет множество пар чисел

$$\{(A, -B), (A, B), (\pi - A, -B), (\pi - A, B)\},$$

где $A = \arcsin(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2})$, $B = \arccos \frac{1}{\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}}$.

Ответ: $\{(A, -B), (A, B), (\pi - A, -B), (\pi - A, B)\}$, где

$$A = \arcsin(\sqrt[3]{14} - \sqrt{2}), \quad B = \arccos \frac{1}{\sqrt[3]{14} + \sqrt{2}}.$$

Задача 5. Найдите решения системы уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \sin y + 2 \operatorname{ctg} x \cos y = \sqrt{\frac{5}{2}}, \\ 2 \operatorname{ctg} x \sin y - \operatorname{tg} x \cos y = \sqrt{\frac{5}{2}}, \end{cases} \quad (7)$$

удовлетворяющие условию $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$, $0 < y < \pi$.

Решение. Возведя в квадрат оба уравнения системы (7), получаем равносильную ей систему

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x \sin^2 y + 4 \sin y \cos y + 4 \operatorname{ctg}^2 x \cos^2 y = \frac{5}{2}, \\ 4 \operatorname{ctg}^2 x \sin^2 y - 4 \sin y \cos y + \operatorname{tg}^2 x \cos^2 y = \frac{5}{2}, \\ \operatorname{tg} x \sin y + 2 \operatorname{ctg} x \cos y > 0, \\ 2 \operatorname{ctg} x \sin y - \operatorname{tg} x \cos y > 0. \end{cases}$$

Складывая первое и второе уравнения этой системы, получаем равносильную системе (7) новую систему

$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x + 4 \operatorname{ctg}^2 x = 5, \\ (\operatorname{tg} x \sin y + 2 \operatorname{ctg} x \cos y)^2 = \frac{5}{2}, \\ \operatorname{tg} x \sin y + 2 \operatorname{ctg} x \cos y > 0, \\ 2 \operatorname{ctg} x \sin y - \operatorname{tg} x \cos y > 0. \end{cases} \quad (8)$$

Тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^2 x + 4 \operatorname{ctg}^2 x = 5 &\iff \operatorname{tg}^4 x - 5 \operatorname{tg}^2 x + 4 = 0 \iff \\ &\iff (\operatorname{tg} x + 2)(\operatorname{tg} x + 1)(\operatorname{tg} x - 1)(\operatorname{tg} x - 2) = 0, \end{aligned}$$

что позволяет в отдельности рассмотреть четыре случая.

С л у ч а й 1. Если $\operatorname{tg} x = -2$, то

$$\operatorname{ctg} x = -\frac{1}{2} \quad \text{и} \quad x = \pi - \operatorname{arctg} 2,$$

так как $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Неравенства в системе (8) примут вид:

$$\begin{cases} 2 \sin y + \cos y < 0, \\ \sin y - 2 \cos y < 0 \end{cases} \implies 5 \sin y < 0,$$

что не возможно при $y \in (0; \pi)$.

С л у ч а й 2. Если $\operatorname{tg} x = -1$, то

$$\operatorname{ctg} x = -1 \quad \text{и} \quad x = \frac{3\pi}{4},$$

так как $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Неравенства в системе (8) примут вид:

$$\begin{cases} \sin y + 2 \cos y < 0, \\ 2 \sin y - \cos y < 0 \end{cases} \implies 5 \sin y < 0,$$

что не возможно при $y \in (0; \pi)$.

С л у ч а й 3. Если $\operatorname{tg} x = 1$, то

$$\operatorname{ctg} x = 1 \quad \text{и} \quad x = \frac{5\pi}{4},$$

так как $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Система (7) примет вид:

$$\begin{cases} \sin y + 2 \cos y = \sqrt{\frac{5}{2}}, \\ 2 \sin y - \cos y = \sqrt{\frac{5}{2}} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin y = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \\ \cos y = \frac{\sqrt{10}}{10}. \end{cases}$$

Поскольку $y \in (0; \pi)$, то из простейшего тригонометрического уравнения

$$\cos y = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

находим

$$y = \arccos \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

С учетом того, что

$$\sin \arccos \frac{\sqrt{10}}{10} = \sqrt{1 - \cos^2 \arccos \frac{\sqrt{10}}{10}} = \sqrt{1 - \frac{1}{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10},$$

получаем решение

$$x = \frac{5\pi}{4}, \quad y = \arccos \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

С л у ч а й 4. Если $\operatorname{tg} x = 2$, то с учетом того, что $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$, получаем:

$$\operatorname{ctg} x = \frac{1}{2} \quad \text{и} \quad x = \pi + \operatorname{arctg} 2.$$

Система (7) примет вид:

$$\begin{cases} 2 \sin y + \cos y = \sqrt{\frac{5}{2}}, \\ \sin y - 2 \cos y = \sqrt{\frac{5}{2}} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin y = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \\ \cos y = -\frac{\sqrt{10}}{10}. \end{cases}$$

Поскольку $y \in (0; \pi)$, то из уравнения

$$\cos y = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

находим

$$y = \pi - \arccos \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

С учетом того, что

$$\sin\left(\pi - \arccos \frac{\sqrt{10}}{10}\right) = \sin \arccos \frac{\sqrt{10}}{10} = \frac{3\sqrt{10}}{10},$$

получаем решение

$$x = \pi + \operatorname{arctg} 2, \quad y = \pi - \arccos \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{5\pi}{4}, \arccos \frac{\sqrt{10}}{10} \right), \left(\pi + \operatorname{arctg} 2, \pi - \arccos \frac{\sqrt{10}}{10} \right) \right\}.$$

Задача 6. Найдите решения системы уравнений:

$$\begin{cases} \log_2 x \log_y 2 + 1 = 0, \\ \sin x \cos y = 1 - \cos x \sin y, \end{cases} \quad (9)$$

удовлетворяющие условию $x + y < 8$.

Решение. Уравнение

$$\log_2 x \log_y 2 + 1 = 0 \iff \log_y 2 \log_2 x = -1 \iff \log_y x = -1 \iff$$

$$\iff \begin{cases} x > 0, \\ y > 0, \\ y \neq 1, \\ x = \frac{1}{y} \end{cases} \iff \begin{cases} x > 0, \\ y > 0, \\ y \neq 1, \\ xy = 1. \end{cases}$$

Уравнение

$$\sin x \cos y = 1 - \cos x \sin y \iff \sin x \cos y + \cos x \sin y = 1 \iff$$

$$\iff \sin(x + y) = 1 \iff x + y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Итак, необходимо найти решения системы

$$\begin{cases} xy = 1, \\ x + y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \end{cases}$$

такие, что $x > 0, y > 0, y \neq 1, x + y < 8$ при целых k .

Поскольку

$$x > 0, y > 0, x + y < 8,$$

то

$$0 < x + y < 8.$$

Тогда

$$0 < \frac{\pi}{2} + 2\pi k < 8 \iff -\frac{1}{4} < k < \frac{16 - \pi}{4\pi},$$

а значит, целое число k равно нулю или единице.

Таким образом, надо найти решения совокупности двух систем:

$$\begin{cases} xy = 1, \\ x + y = \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} xy = 1, \\ x + y = \frac{5\pi}{2}. \end{cases} \quad (10)$$

При этом решения каждой системы, если существуют, то удовлетворяют условиям $x > 0, y > 0, y \neq 1, x + y < 8$.

Согласно обратной теореме Виета решениями первой системы совокупности (10) являются корни квадратного уравнения

$$\lambda^2 - \frac{\pi}{2} \lambda + 1 = 0, \quad (11)$$

а решениями второй системы совокупности (10) являются корни квадратного уравнения

$$\lambda^2 - \frac{5\pi}{2} \lambda + 1 = 0. \quad (12)$$

Квадратное уравнение (11) корней не имеет, так как его дискриминант $D = \frac{\pi^2}{4} - 4 = \frac{1}{4}(\pi^2 - 16) < 0$.

Корнями уравнения (12) являются числа

$$\lambda_1 = \frac{1}{4}(5\pi - \sqrt{25\pi^2 - 16}) \quad \text{и} \quad \lambda_2 = \frac{1}{4}(5\pi + \sqrt{25\pi^2 - 16}).$$

Следовательно, $\{(\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_1)\}$ — множество решений совокупности (10), значит, и системы (9).

Ответ: $\{(\lambda_1, \lambda_2), (\lambda_2, \lambda_1)\}$, где $\lambda_1 = \frac{1}{4}(5\pi - \sqrt{25\pi^2 - 16})$,
 $\lambda_2 = \frac{1}{4}(5\pi + \sqrt{25\pi^2 - 16})$.

Задача 7. Найдите решения системы уравнений:

$$\begin{cases} y \sin x = \log_2 \left| \frac{y \sin x}{1 + 3y} \right|, \\ (6y^2 + 2y) \cdot (4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x}) = 25y^2 + 6y + 1, \end{cases} \quad (13)$$

удовлетворяющие условию $|y| \leq 1$.

Решение. Для краткости обозначим

$$4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x} = a.$$

Тогда второе уравнение системы (13) перепишем в виде

$$(25 - 6a)y^2 + (6 - 2a)y + 1 = 0. \quad (14)$$

Пусть $25 - 6a = 0$.

Из уравнения (14) находим $y = \frac{3}{7}$.

На основании первого уравнения системы (13) устанавливаем, что

$$-\frac{3}{7} \leq y \sin x = \log_2 \left| \frac{y \sin x}{1 + 3y} \right| = \log_2 \frac{3|\sin x|}{16} \leq \log_2 \frac{3}{16} < -2.$$

Получили противоречие:

$$-\frac{3}{7} < -2,$$

которое означает, что для любого решения системы (13) равенство

$$25 - 6a = 0$$

выполняться не может.

Корнями квадратного уравнения (14) относительно y являются

$$y_1 = -\frac{3 - a + \sqrt{a^2 - 16}}{25 - 6a}, \quad y_2 = -\frac{3 - a - \sqrt{a^2 - 16}}{25 - 6a}.$$

Поскольку

$$a^2 - 16 = \left(4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x}\right)^2 - 16 = \left(4^{\sin^2 x} - 4^{\cos^2 x}\right)^2,$$

то

$$y_1 = \frac{2 \cdot 4^{\sin^2 x} - 3}{25 - 6\left(4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x}\right)}, \quad y_2 = \frac{2 \cdot 4^{\cos^2 x} - 3}{25 - 6\left(4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x}\right)}.$$

Таким образом, система (13) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} y \sin x = \log_2 \left| \frac{y \sin x}{1 + 3y} \right|, \\ y = \frac{2 \cdot 4^{\sin^2 x} - 3}{25 - 6\left(4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x}\right)}; \end{cases} \quad (15)$$

$$\begin{cases} y \sin x = \log_2 \left| \frac{y \sin x}{1 + 3y} \right|, \\ y = \frac{2 \cdot 4^{\cos^2 x} - 3}{25 - 6(4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x})}. \end{cases} \quad (16)$$

Решим систему (15).

В силу второго уравнения системы (15) частное

$$\begin{aligned} \frac{1 + 3y}{y} &= 3 + \frac{1}{y} = 3 + \frac{25 - 6(4^{\sin^2 x} + 4^{\cos^2 x})}{2 \cdot 4^{\sin^2 x} - 3} = \\ &= \frac{16 - 6 \cdot 4^{\cos^2 x}}{2 \cdot 4^{\sin^2 x} - 3} = \frac{2 \cdot 4^{\cos^2 x} (2 \cdot 4^{\sin^2 x} - 3)}{2 \cdot 4^{\sin^2 x} - 3} = 2 \cdot 4^{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

При этом было использовано то, что для решений системы (15) выполняется условие $y \neq 0$, так как иначе в первом уравнении не будет иметь смысла выражение $\log_2 \left| \frac{y \sin x}{1 + 3y} \right|$.

Подставляя $2 \cdot 4^{\cos^2 x}$ вместо $\frac{1 + 3y}{y}$ в правую часть первого уравнения системы (15), находим:

$$\begin{aligned} \log_2 \left| \frac{y \sin x}{1 + 3y} \right| &= \log_2 |\sin x| - \log_2 \left| \frac{1 + 3y}{y} \right| = \\ &= \log_2 |\sin x| - \log_2 (2 \cdot 4^{\cos^2 x}) = \log_2 |\sin x| - 1 - 2 \cos^2 x. \end{aligned}$$

Используя условие $|y| \leq 1$, первое уравнение системы (15), а также очевидные неравенства $\log_2 |\sin x| \leq 0$ и $\cos^2 x \geq 0$, получаем

$$-1 \leq y \sin x = \log_2 |\sin x| - 1 - 2 \cos^2 x \leq -1.$$

Поэтому

$$\begin{cases} y \sin x = -1, \\ \log_2 |\sin x| = 0, \\ \cos x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y \sin x = -1, \\ |\sin x| = 1 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \begin{cases} \sin x = -1, \\ y = 1, \end{cases} \\ \begin{cases} \sin x = 1, \\ y = -1, \end{cases} \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ y = 1, \end{cases} \\ \begin{cases} \sin x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ y = -1, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{cases}$$

Подставляя

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, y = 1, \forall n \in \mathbb{Z},$$

во второе уравнение системы (15), получаем неверное равенство

$$1 = -1.$$

Подставляя

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, y = -1, \forall n \in \mathbb{Z},$$

в оба уравнения системы (15), убеждаемся, что эти числа являются решениями.

Итак, множеством решений системы (15) является множество упорядоченных пар чисел $\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n, -1\right), \forall n \in \mathbb{Z}$.

Решим систему (16).

Используя второе уравнение этой системы, подобно предыдущему, устанавливаем, что

$$\frac{1+3y}{y} = 2 \cdot 4^{\sin^2 x}.$$

Подставляя $2 \cdot 4^{\sin^2 x}$ вместо $\frac{1+3y}{y}$ в правую часть первого урав-

нения системы (16), так же как и ранее, находим, что

$$y \sin x = \log_2 |\sin x| - 1 - 2 \sin^2 x.$$

Используя условие $|y| \leq 1$, неравенства

$$\log_2 |\sin x| \leq 0 \quad \text{и} \quad \sin^2 x \geq 0,$$

как и ранее, получаем, что

$$-1 \leq y \sin x = \log_2 |\sin x| - 1 - 2 \sin^2 x \leq -1.$$

Отсюда следует, что для решений системы (16) должны выполняться следующие условия:

$$y \sin x = -1, \quad \log_2 |\sin x| = 0, \quad \sin x = 0,$$

что невозможно.

Значит, система (16) решений не имеет.

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n, -1 \right) \right\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 8. Найдите все значения параметра a , при которых система уравнений

$$\begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{z^2}, \\ \cos x \cos y = -\frac{(x+y)^2}{(a-\pi)^2}, \\ \sin(x-y) = \frac{2(x+y)}{(a-\pi)z} \end{cases} \quad (17)$$

имеет одно решение, удовлетворяющее условиям

$$0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \quad z > 0.$$

Решение. Перемножив почленно первые два уравнения системы (17), получим:

$$-\sin x \cos x \sin y \cos y = \frac{(x+y)^2}{(a-\pi)^2 z^2}.$$

Отсюда с учетом третьего уравнения системы (17) имеем

$$\begin{aligned}
-4 \sin x \cos x \sin y \cos y &= \sin^2(x - y) \iff -4 \sin x \cos x \sin y \cos y = \\
&= \sin^2 x \cos^2 y - 2 \sin x \cos x \sin y \cos y + \cos^2 x \sin^2 y \iff \\
\iff (\sin x \cos y + \cos x \sin y)^2 &= 0 \iff \sin^2(x + y) = 0 \iff \\
\iff \sin(x + y) &= 0 \iff x + y = \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

Поскольку

$$0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \quad \text{а} \quad \sin x \sin y = \frac{1}{z^2},$$

то

$$\sin y > 0, \quad \sin x > 0.$$

То, что $x = -y + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, означает:

$$\sin x = \sin(\pi n - y) = -\sin(y - \pi n) = (-1)^{n+1} \cdot \sin y.$$

Но $\sin y > 0, \sin x > 0$.

Следовательно, $(-1)^{n+1} = 1$, т.е.

$$n = 2m + 1, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

В итоге установлено:

$$\sin x = \sin y > 0, \quad x = -y + \pi(2m + 1), \quad m \in \mathbb{Z}.$$

Отсюда и из первого уравнения системы (17) получаем:

$$\sin x = \sin y = \frac{1}{z}.$$

Кроме того,

$$\cos x = \cos(-y + 2\pi m + \pi) = -\cos y.$$

Поэтому

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y = \frac{1}{z} (\cos y - \cos x) = \frac{2}{z} \cos y.$$

При этом из третьего уравнения системы (17) находим:

$$\frac{2}{z} \cos y = \frac{2(x+y)}{(a-\pi)z} \iff \cos y = \frac{x+y}{a-\pi} \text{ при } z > 0.$$

Таким образом, надо найти все значения параметра a , когда при целых m система

$$\begin{cases} \cos y = \frac{x+y}{a-\pi}, \\ x = \pi(2m+1) - y, \\ 0 < y \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} \cos y = \frac{\pi(2m+1)}{a-\pi}, \\ x = \pi(2m+1) - y, \\ 0 < y \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

имеет единственное решение. Для этого необходимо и достаточно, чтобы двойное неравенство

$$0 \leq \frac{\pi(2m+1)}{a-\pi} < 1$$

выполнялось при единственном целом m .

Если $a - \pi > 0$, то

$$0 \leq \frac{\pi(2m+1)}{a-\pi} < 1 \implies 0 \leq 2\pi m + \pi < a - \pi \iff -\frac{1}{2} \leq m < \frac{a}{2\pi} - 1.$$

На этом промежутке целое m принимает единственное значение $m = 0$ тогда и только тогда, когда

$$0 < \frac{a}{2\pi} - 1 \leq 1 \iff 2\pi < a \leq 4\pi.$$

Если $a - \pi < 0$, то

$$0 \leq \frac{\pi(2m+1)}{a-\pi} < 1 \implies a - \pi < 2\pi m + \pi \leq 0 \iff \frac{a}{2\pi} - 1 < m \leq -\frac{1}{2}.$$

На этом промежутке целое m принимает единственное значение $m = -1$ тогда и только тогда, когда

$$-2 \leq \frac{a}{2\pi} - 1 < -1 \iff -2\pi \leq a < 0.$$

Ответ: любое $a \in [-2\pi; 0) \cup (2\pi; 4\pi]$.

§ 5. Нестандартные решения систем, содержащих тригонометрические функции

Задача 1. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos 4x + \sin 2y = -2, \\ x - y = 2\pi. \end{cases} \quad (1)$$

Решение. При любых действительных x и y справедливы неравенства

$$\cos 4x \geq -1 \quad \text{и} \quad \sin 2y \geq -1.$$

Поэтому первое уравнение системы (1) равносильно системе уравнений

$$\begin{cases} \cos 4x = -1, \\ \sin 2y = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k, \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Для нахождения решений системы (1) во второе уравнение этой системы подставим найденные значения x и y :

$$-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k - \left(-\frac{\pi}{4} + \pi n\right) = 2\pi \iff k = 2(n+2).$$

Тогда решениями системы (1) будут

$$x = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}(2(n+2)) = \frac{3\pi}{4} + \pi(n+1), \quad y = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{3\pi}{4} + \pi(n+1), -\frac{\pi}{4} + \pi n \right) \right\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Задача 2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 2\sqrt{2} \cos^3 y, \\ \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = 2\sqrt{2} \sin^3 y. \end{cases} \quad (2)$$

Решение. По формуле приведения

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right),$$

значит, система (2) равносильна системе

$$\begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 2\sqrt{2} \cos^3 y, \\ \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 2\sqrt{2} \sin^3 y. \end{cases} \quad (3)$$

Перемножив уравнения системы (3), получим, что

$$\begin{aligned} 1 = 8 \cos^3 y \sin^3 y &\iff 1 = (2 \cos y \sin y)^3 \iff 1 = \sin^3 2y \iff \\ &\iff \sin 2y = 1 \iff y = \frac{\pi}{4} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Поскольку

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi n\right) &= (-1)^n \cdot \cos \frac{\pi}{4} = (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ \sin\left(\frac{\pi}{4} + \pi n\right) &= (-1)^n \cdot \sin \frac{\pi}{4} = (-1)^n \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, \end{aligned}$$

то при

$$y = \frac{\pi}{4} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}$$

из системы (3) получаем систему

$$\begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = (-1)^n, \\ \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = (-1)^n. \end{cases}$$

Отсюда при $n = 2l$ имеем:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 1 \iff x = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

При $n = 2l + 1$ получаем, что

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Тогда множество решений системы (2) будет состоять из упорядоченных пар чисел:

$$\left\{ \left(\pi k, \frac{\pi}{4} + 2\pi l \right), \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{4} + \pi(2l + 1) \right) \right\}, \forall k, l \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\pi k, \frac{\pi}{4} + 2\pi l \right), \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{4} + \pi(2l + 1) \right) \right\}, \forall k, l \in \mathbb{Z}.$$

Задача 3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sqrt{\sin y} \cdot \sin 2x = 0, \\ \cos x + \cos^2 y = 0,25 + \sin y. \end{cases} \quad (4)$$

Решение. Произведение двух выражений равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю, при условии, что произведение имеет смысл.

Поэтому система (4) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \sin y = 0, \\ \cos x + \cos^2 y = 0,25 + \sin y, \end{cases} \quad \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin 2x = 0, \\ \cos x + \cos^2 y = 0,25 + \sin y. \end{cases} \quad (5)$$

Первая система совокупности (5) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin y = 0, \\ \cos x + 1 - \sin^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} \iff \begin{cases} \sin y = 0, \\ \cos x = -0,75 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} y = \pi k, \\ x = \pm \arccos(-0,75) + 2\pi n \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} y = \pi k, \\ x = \pm (\pi - \arccos 0,75) + 2\pi n \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \begin{cases} x = -\arccos 0,75 + \pi(2n + 1), \\ y = \pi k, \end{cases} \\ \begin{cases} x = \arccos 0,75 + \pi(2n - 1), \\ y = \pi k, \end{cases} \end{cases} \forall n, k \in \mathbb{Z}.$$

Во второй системе совокупности (5) уравнение

$$\sin 2x = 0 \iff 2x = \pi n \iff x = \frac{\pi n}{2}, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Разобьем множество чисел

$$\left\{ \frac{\pi n}{2} \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}$$

на три подмножества: множество

$$\left\{ x: x = \frac{\pi}{2} + \pi k \right\}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

чисел x , для которых $\cos x = 0$; множество

$$\{x: x = 2\pi k\}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

чисел x , для которых $\cos x = 1$, а также множество

$$\{x: x = \pi(2k + 1)\}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

чисел x , для которых $\cos x = -1$.

При

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

вторую систему совокупности (5) приводим к системе

$$\begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \cos^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} \iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin^2 y + \sin y - 0,75 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ (\sin y + 1,5)(\sin y - 0,5) = 0 \end{cases} \iff \sin y = 0,5 \iff$$

$$\iff y = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, решениями системы (4) будут

$$\left(\frac{\pi}{2} + \pi k, (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n \right), \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

При

$$x = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

вторую систему совокупности (5) приводим к системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ 1 + \cos^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin^2 y + \sin y - \frac{7}{4} = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \left(\sin y + \frac{1 + 2\sqrt{2}}{2} \right) \left(\sin y - \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} \right) = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \sin y = \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} \iff y = (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Тогда решениями системы (4) будут

$$\left(2\pi k, (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} + \pi n \right), \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

При

$$x = (2k + 1)\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$$

вторую систему совокупности (5) приводим к системе

$$\begin{cases} \sin y \geq 0, \\ -1 + \cos^2 y = 0,25 + \sin y \end{cases} \iff \begin{cases} \sin y \geq 0, \\ \sin^2 y + \sin y + 0,25 = 0, \end{cases}$$

у которой нет решений, так как

$$\sin^2 y + \sin y + 0,25 > 0 \quad \text{при} \quad \sin y \geq 0.$$

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } &\left\{ \left(-\arccos \frac{3}{4} + \pi(2k + 1), \pi n \right), \left(\arccos \frac{3}{4} + \pi(2k - 1), \pi n \right), \right. \\ &\left. \left(\frac{\pi}{2} + \pi k, (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n \right), \left(2\pi k, (-1)^n \cdot \arcsin \frac{2\sqrt{2} - 1}{2} + \pi n \right) \right\}, \\ &\forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Задача 4. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 4 \operatorname{tg} 3x = 3 \operatorname{tg} 2y, \\ 2 \sin x \cos(x - y) = \sin y. \end{cases} \quad (6)$$

Решение. С п о с о б 1. Уравнение

$$\begin{aligned} 2 \sin x \cos(x - y) = \sin y &\Leftrightarrow 2 \sin x \cos x \cos y + 2 \sin^2 x \sin y - \sin y = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sin 2x \cos y + \sin y(2 \sin^2 x - 1) = 0 \Leftrightarrow \sin 2x \cos y - \cos 2x \sin y = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sin(2x - y) = 0 \Leftrightarrow 2x - y = \pi k \Leftrightarrow y = 2x - \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Подставим

$$y = 2x - \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

в первое уравнение системы (6):

$$\begin{aligned} 4 \operatorname{tg} 3x = 3 \operatorname{tg}(4x - 2\pi k) &\Leftrightarrow 4(\operatorname{tg} 4x - \operatorname{tg} 3x) = \operatorname{tg} 4x \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{4 \sin x}{\cos 4x \cos 3x} - \frac{\sin 4x}{\cos 4x} = 0 &\Leftrightarrow \frac{4 \sin x - \sin 4x \cos 3x}{\cos 4x \cos 3x} = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{4 \sin x - 4 \sin x \cos x \cos 2x \cos 3x}{\cos 4x \cos 3x} = 0 &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\sin x(1 - \cos x \cos 2x \cos 3x)}{\cos 4x \cos 3x} = 0, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Поскольку из уравнения

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x = 0$$

следует, что

$$\begin{cases} |\cos x| = 1, \\ |\cos 2x| = 1, \\ |\cos 3x| = 1 \end{cases} \Leftrightarrow |\cos x| = 1 \Leftrightarrow x = \pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

а

$$1 - \cos \pi n \cos 2\pi n \cos 3\pi n = 1 - (-1)^n \cdot 1 \cdot (-1)^n = 1 - 1 = 0,$$

то

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x = 0 \iff x = \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Кроме того,

$$\sin \pi n = 0, \cos 4\pi n = 1, \cos 3\pi n = (-1)^n.$$

Поэтому

$$\frac{\sin x(1 - \cos x \cos 2x \cos 3x)}{\cos 4x \cos 3x} = 0 \iff x = \pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

и система (6) равносильна системе

$$\begin{cases} x = \pi n, \\ y = 2\pi n + \pi k \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi n, \\ y = \pi(2n + k) \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pi n, \\ y = \pi m, \end{cases}$$

где k, m и n — целые числа.

С п о с о б 2. Уравнение (см. способ 1)

$$2 \sin x \cos(x - y) = \sin y \iff y = 2x + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Подставим

$$y = 2x + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

в первое уравнение системы (6):

$$\begin{aligned} 4 \operatorname{tg} 3x &= 3 \operatorname{tg}(4x + 2\pi k) \iff \frac{4 \sin 3x \cos 4x - 3 \cos 3x \sin 4x}{\cos 4x \cos 3x} = 0 \iff \\ &\iff \sin 3x \cos 4x - 3(\sin 4x \cos 3x - \sin 3x \cos 4x) = 0 \iff \\ &\iff \sin 3x \cos 4x - 3 \sin x = 0 \iff \frac{1}{2}(\sin 7x - \sin x) - 3 \sin x = 0 \iff \\ &\iff 7 \sin x = \sin 7x \iff x = \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

При этом было использовано неравенство (доказывается методом математической индукции)

$$\sin nx \leq n |\sin x|, \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N},$$

в котором равенство достигается лишь при $x = \pi m, \forall m \in \mathbb{Z}$, что позволило решить уравнение $7 \sin x = \sin 7x$.

Находим

$$y = \pi s, \forall s \in \mathbb{Z}$$

и составляем множество решений системы (6):

$$\{(\pi n, \pi m)\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\{(\pi n, \pi m)\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}$.

Задача 5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} x + \sin 2y = \sin 2x, \\ 2 \sin y \sin(x + y) = \cos x. \end{cases} \quad (7)$$

Решение. Уравнение

$$\begin{aligned} 2 \sin y \sin(x + y) = \cos x &\iff \cos x - \cos(x + 2y) = \cos x \iff \\ &\iff \cos(x + 2y) = 0 \iff 2y = \frac{\pi}{2} - x + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Уравнение

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} x + \sin 2y = \sin 2x &\iff \sin 2y = 2 \sin x \cos x - \frac{\cos x}{\sin x} \iff \\ &\iff \sin 2y = \frac{\cos x}{\sin x} (2 \sin^2 x - 1) \iff \sin 2y = -\frac{\cos x \cos 2x}{\sin x}. \end{aligned}$$

Система (7) равносильна системе

$$\begin{cases} \frac{\cos x \cos 2x}{\sin x} = -\sin 2y, \\ 2y = \frac{\pi}{2} - x + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (8)$$

Рассмотрим случаи, когда $k = 2p$ и $k = 2p + 1, \forall p \in \mathbb{Z}$.
Пусть

$$k = 2p, \forall p \in \mathbb{Z}.$$

Тогда

$$2y = \frac{\pi}{2} - x + 2\pi p, \quad \forall p \in \mathbb{Z},$$

а первое уравнение системы (8) приведем к виду

$$\begin{aligned} \frac{\cos x \cos 2x}{\sin x} = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x + 2\pi p\right) &\iff \frac{\cos x \cos 2x}{\sin x} = -\cos x \iff \\ &\iff \frac{\cos x(\cos 2x + \sin x)}{\sin x} = 0, \quad \forall p \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad (9)$$

Пусть

$$k = 2p + 1, \quad \forall p \in \mathbb{Z}.$$

Тогда

$$2y = \frac{3\pi}{2} - x + 2\pi p, \quad \forall p \in \mathbb{Z},$$

а первое уравнение системы (8) приведем к виду

$$\begin{aligned} \frac{\cos x \cos 2x}{\sin x} = -\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x + 2\pi p\right) &\iff \frac{\cos x \cos 2x}{\sin x} = \cos x \iff \\ &\iff \frac{\cos x(\cos 2x - \sin x)}{\sin x} = 0, \quad \forall p \in \mathbb{Z}. \end{aligned} \quad (10)$$

Если $\sin x = 0$, то

$$\sin x \pm \cos 2x = \sin x \pm (1 - 2\sin^2 x) \neq 0 \quad \text{и} \quad \cos x \neq 0.$$

Поэтому каждое из уравнений (9) и (10) равносильно уравнению, полученному из него умножением на $\sin x$.

Следовательно, система (8) равносильна совокупности:

$$\left[\begin{cases} \cos x(\sin x + \cos 2x) = 0, \\ 2y = \frac{\pi}{2} - x + 2\pi p, \\ \cos x(\sin x - \cos 2x) = 0, \\ 2y = \frac{\pi}{2} - x + \pi(2p + 1), \quad \forall p \in \mathbb{Z}. \end{cases} \right. \quad (11)$$

Значения x , при которых $\cos x = 0$, удовлетворяют обеим систе-

мам совокупности (11). Поэтому совокупность (11) равносильна совокупности трех систем:

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ 2y = \frac{\pi}{2} - x + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}; \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} \sin x + \cos 2x = 0, \\ 2y = \frac{\pi}{2} - x + 2\pi p, \forall p \in \mathbb{Z}; \end{cases} \quad (13)$$

$$\begin{cases} \sin x - \cos 2x = 0, \\ 2y = \frac{\pi}{2} - x + \pi(2p + 1), \forall p \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (14)$$

Решениями уравнения

$$\cos x = 0$$

являются

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Подставляя найденные значения x во второе уравнение системы (12), получаем, что

$$y = \frac{\pi}{2} (k - n), \forall n, k \in \mathbb{Z}.$$

Тогда решениями системы (12) будут упорядоченные пары

$$\left(\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} (k - n) \right).$$

Поскольку k — любое целое число, то $k - n$ можно заменить на m , и множеством решений системы (12) будет

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{2} m \right) \right\}, \forall m, n \in \mathbb{Z}. \quad (15)$$

Уравнение

$$\sin x + \cos 2x = 0 \iff \cos 2x = \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \iff$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{2} + x + 2\pi n, \\ 2x = -\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 2\pi n \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ x = \frac{\pi}{6}(4n - 1), \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Если

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

то из второго уравнения системы (13) находим, что

$$y = \pi(p - n), \forall n, p \in \mathbb{Z}.$$

Значит, множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \pi(p - n) \right) \right\}, \forall n, p \in \mathbb{Z}$$

является множеством решений системы (13).

Заметим, что это множество решений системы (13) является подмножеством множества решений (15) системы (12).

Если

$$x = \frac{\pi}{6}(4n - 1), \forall n \in \mathbb{Z},$$

то из второго уравнения системы (13) находим, что

$$y = \frac{\pi}{3}(3p - n + 1), \forall n, p \in \mathbb{Z}.$$

Значит, множество

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{6}(4n - 1), \frac{\pi}{3}(3p - n + 1) \right) \right\}, \forall n, p \in \mathbb{Z}$$

будет множеством решений системы (13).

Уравнение

$$\sin x - \cos 2x = 0 \Longleftrightarrow \cos 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{2} - x + 2\pi n, \\ 2x = -\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + 2\pi n \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6}(4n + 1), \\ x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Если

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

то из второго уравнения системы (14) находим, что

$$y = \pi(p - n + 1), \forall n, p \in \mathbb{Z}.$$

Значит, множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \pi(p - n + 1) \right) \right\}, \forall n, p \in \mathbb{Z}$$

является множеством решений системы (14).

Заметим, что это множество решений системы (14) является подмножеством множества решений (15) системы (12).

Если

$$x = \frac{\pi}{6} (4n + 1), \forall n \in \mathbb{Z},$$

то из второго уравнения системы (14) находим, что

$$y = \frac{\pi}{3} (3p - n + 2), \forall n, p \in \mathbb{Z}.$$

Значит, множество

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{6} (4n + 1), \frac{\pi}{3} (3p - n + 2) \right) \right\}, \forall n, p \in \mathbb{Z}$$

будет множеством решений системы (14).

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{2} (2n + 1), \frac{\pi}{2} p \right), \left(\frac{\pi}{6} (4n - 1), \frac{\pi}{3} (3p - n + 1) \right), \right. \\ \left. \left(\frac{\pi}{6} (4n + 1), \frac{\pi}{3} (3p - n + 2) \right) \right\}, \forall n, p \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Задача 6. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \left(\sqrt{3} \cos \frac{\pi x}{4} + \sin \frac{\pi(x - 2y)}{12} \right) \left(\sqrt{11 - x^2 - y^2 - 4x - 2y} - 6 \right) = 0, \\ \frac{1}{2} + 2 \sin \frac{\pi x}{12} \cos \frac{\pi y}{6} = 2 \cos \frac{\pi x}{12} \sin \frac{\pi y}{6} + \sin^2 \frac{\pi x}{8}. \end{cases} \quad (16)$$

Решение. Поскольку

$$\begin{aligned} 11 - x^2 - y^2 - 4x - 2y &= -(x^2 + 4x + 4) - (y^2 + 2y + 1) + 16 = \\ &= 16 - (x + 2)^2 - (y + 1)^2 \leq 16, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

то

$$\sqrt{11 - x^2 - y^2 - 4x - 2y} - 6 \leq 4 - 6 < 0, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

и система (16) равносильна системе

$$\begin{cases} (x + 2)^2 + (y + 1)^2 \leq 16, \\ \sqrt{3} \cos \frac{\pi x}{4} + \sin \frac{\pi(x - 2y)}{12} = 0, \\ \frac{1}{2} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{\pi x}{8} \right) + 2 \left(\sin \frac{\pi x}{12} \cos \frac{\pi y}{6} - \cos \frac{\pi x}{12} \sin \frac{\pi y}{6} \right) = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} (x + 2)^2 + (y + 1)^2 \leq 16, \\ \sqrt{3} \cos \frac{\pi x}{4} + \sin \frac{\pi(x - 2y)}{12} = 0, \\ \frac{1}{2} \cos \frac{\pi x}{4} + 2 \sin \frac{\pi(x - 2y)}{12} = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} (x + 2)^2 + (y + 1)^2 \leq 16, \\ \cos \frac{\pi x}{4} = 0, \\ \sin \frac{\pi(x - 2y)}{12} = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \begin{cases} (x + 2)^2 + (y + 1)^2 \leq 16, \\ x = 2 + 4m, \\ y = 1 + 2m - 6n \end{cases} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow 5(m + 1)^2 - 6n(m + 1) + 9n^2 - 4 \leq 0.$$

Полученное квадратичное неравенство (относительно $m + 1$) возможно, лишь когда дискриминант $D \geq 0$, т.е.

$$-144n^2 + 80 \geq 0 \Longleftrightarrow n^2 \leq \frac{5}{9} \implies n^2 < 1 \implies n = 0, \text{ ибо } n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, решениями системы (16) будут $x = -2, y = -1$.

Ответ: $\{(-2, -1)\}$.

Задача 7. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \arcsin\left(\frac{x}{2} + \sin y\right) = y - \frac{\pi}{3}, \\ x^2 + 2x \sin y + 3 \cos y = 0. \end{cases} \quad (17)$$

Решение. Система (17) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin \arcsin\left(\frac{x}{2} + \sin y\right) = \sin\left(y - \frac{\pi}{3}\right), \\ -1 \leq \frac{x}{2} + \sin y \leq 1, \\ -\frac{\pi}{2} \leq y - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}, \\ x^2 + 2x \sin y + 3 \cos y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sin y - \sqrt{3} \cos y, \\ -2 \leq x + 2 \sin y \leq 2, \\ -\frac{\pi}{6} \leq y \leq \frac{5\pi}{6}, \\ 4 \cos^2 y + 3 \cos y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sin y - \sqrt{3} \cos y, \\ -2 \leq \sin y - \sqrt{3} \cos y \leq 2, \\ -\frac{\pi}{6} \leq y \leq \frac{5\pi}{6}, \\ (\cos y + 1)\left(\cos y - \frac{1}{4}\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos y = \frac{1}{4}, \\ x = -\sin y - \frac{\sqrt{3}}{4}, \\ \frac{\sqrt{3}-8}{4} \leq \sin y \leq \frac{\sqrt{3}+8}{4}, \\ -\frac{\pi}{6} \leq y \leq \frac{5\pi}{6}, \end{cases}$$

так как $\cos y \neq -1$ при $-\frac{\pi}{6} \leq y \leq \frac{5\pi}{6}$.

Поскольку

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} > \cos y = \frac{1}{4},$$

то

$$\frac{\pi}{3} < \arccos \frac{1}{4} < \frac{\pi}{2},$$

значит,

$$-\frac{\pi}{2} < -\arccos \frac{1}{4} < -\frac{\pi}{3},$$

и система

$$\begin{cases} \cos y = \frac{1}{4}, \\ -\frac{\pi}{6} \leq y \leq \frac{5\pi}{6} \end{cases} \iff y = \arccos \frac{1}{4}.$$

Тогда

$$\sin y = \sin \arccos \frac{1}{4} = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

Учитывая, что

$$\frac{\sqrt{3}-8}{4} < \frac{\sqrt{4}-8}{4} = -\frac{3}{2} < \sin y < \frac{9}{4} = \frac{\sqrt{1}+8}{4} < \frac{\sqrt{3}+8}{4},$$

находим решение:

$$x = -\frac{\sqrt{15} + \sqrt{3}}{4} = -\frac{\sqrt{3}(1 + \sqrt{5})}{4}, \quad y = \arccos \frac{1}{4}.$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{\sqrt{3}(1 + \sqrt{5})}{4}, \arccos \frac{1}{4} \right) \right\}.$$

Задача 8. Найдите $\operatorname{tg} x$, если

$$\begin{cases} y \sin x + \cos x = 2, \\ -4 \sin x + 2y \cos x = -y. \end{cases} \quad (18)$$

Решение. Решая систему (18) как линейную относительно переменных $\sin x$ и $\cos x$, получим

$$\begin{cases} \sin x = \frac{5y}{4 + 2y^2}, \\ \cos x = \frac{8 - y^2}{4 + 2y^2}. \end{cases} \quad (19)$$

Для нахождения y воспользуемся основным тригонометрическим тождеством $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$\frac{(5y)^2}{(4+2y^2)^2} + \frac{(8-y^2)^2}{(4+2y^2)^2} = 1 \iff 25y^2 + (8-y^2)^2 = (4+2y^2)^2 \iff$$

$$\iff \begin{cases} y^2 = 3, \\ y^2 = -\frac{32}{6} \end{cases} \iff y^2 = 3 \iff \begin{cases} y = -\sqrt{3}, \\ y = \sqrt{3}. \end{cases}$$

Используя систему (19), находим

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{5y}{8-y^2} = \pm \sqrt{3}.$$

Ответ: $\pm \sqrt{3}$.

Задача 9. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1, \\ \cos x + \cos y + \cos z = 1, \\ x + y + z = \pi. \end{cases} \quad (20)$$

Решение. Первое уравнение системы (20) равносильно уравнению

$$\frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos 2y}{2} + \cos^2 z = 1 \iff \cos 2x + \cos 2y + 2 \cos^2 z = 0.$$

С учетом третьего уравнения системы (20) получаем

$$\begin{aligned} \cos 2x + \cos 2y + 2 \cos^2(\pi - (x + y)) &= 0 \iff \\ \iff 2 \cos(x + y)(\cos(x - y) + \cos(x + y)) &= 0 \iff \\ \iff 4 \cos(x + y) \cos x \cos y = 0 \iff 4 \cos(\pi - z) \cos x \cos y &= 0 \iff \\ \iff -4 \cos x \cos y \cos z = 0. \end{aligned}$$

Рассмотрим возможные случаи.

Если $\cos x = 0$, то из первых двух уравнений системы (20) имеем

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \cos^2 y + \cos^2 z = 1, \\ \cos y + \cos z = 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} \cos z = 1 - \cos y, \\ \cos^2 y + (1 - \cos y)^2 = 1 \end{cases} \iff \\
&\iff \begin{cases} \cos z = 1 - \cos y, \\ 2 \cos y (\cos y - 1) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} \cos y = 0, \\ \cos z = 1, \end{cases} \\ \begin{cases} \cos y = 1, \\ \cos z = 0. \end{cases} \end{cases}
\end{aligned}$$

Аналогично рассмотрев случаи $\cos y = 0$ и $\cos z = 0$, получаем, что система (20) равносильна совокупности трех систем.

Первая система

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos y = 0, \\ \cos z = 1, \\ x + y + z = \pi \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ z = 2\pi m, \\ x + y + z = \pi, \end{cases}$$

т.е.

$$x = \frac{\pi}{2} - \pi(2m + n), \quad y = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad z = 2\pi m, \quad \forall m, n \in \mathbb{Z},$$

так как

$$\frac{\pi}{2} + \pi k + \frac{\pi}{2} + \pi n + 2\pi m = \pi \quad \text{при } k = -(2m + n).$$

Вторая система

$$\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos y = 1, \\ \cos z = 0, \\ x + y + z = \pi \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \\ y = 2\pi n, \\ z = \frac{\pi}{2} + \pi m, \\ x + y + z = \pi, \end{cases}$$

т.е.

$$x = \frac{\pi}{2} - \pi(2n + m), \quad y = 2\pi n, \quad z = \frac{\pi}{2} + \pi m, \quad \forall m, n \in \mathbb{Z},$$

так как

$$\frac{\pi}{2} + \pi k + 2\pi n + \frac{\pi}{2} + \pi m = \pi \quad \text{при} \quad k = -(2n + m).$$

Третья система

$$\begin{cases} \cos x = 1, \\ \cos y = 0, \\ \cos z = 0, \\ x + y + z = \pi \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2\pi k, \\ y = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ z = \frac{\pi}{2} + \pi m, \\ x + y + z = \pi, \end{cases}$$

т.е.

$$x = 2\pi k, \quad y = \frac{\pi}{2} - \pi(2k + m), \quad z = \frac{\pi}{2} + \pi m, \quad \forall k, m \in \mathbb{Z},$$

так как

$$2\pi k + \frac{\pi}{2} + \pi n + \frac{\pi}{2} + \pi m = \pi \quad \text{при} \quad n = -(2k + m).$$

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(\frac{\pi}{2} - \pi(2m + n), \frac{\pi}{2} + \pi n, 2\pi m \right), \left(\frac{\pi}{2} - \pi(2n + m), 2\pi n, \frac{\pi}{2} + \pi m \right), \left(2\pi k, \frac{\pi}{2} - \pi(2k + m), \frac{\pi}{2} + \pi m \right) \right\}, \quad \forall k, n, m \in \mathbb{Z}.$$

Задача 10. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 2 \cos x = 3 \operatorname{tg} y, \\ 2 \cos y = 3 \operatorname{tg} z, \\ 2 \cos z = 3 \operatorname{tg} x. \end{cases} \quad (21)$$

Решение. Из уравнения $2 \cos y = 3 \operatorname{tg} z$ находим

$$\cos y = \frac{3}{2} \operatorname{tg} z.$$

Из уравнения $2 \cos x = 3 \operatorname{tg} y$ находим

$$2 \cos x = \frac{3 \sin y}{\cos y},$$

и получаем, что

$$\sin y = \frac{2}{3} \cos x \cos y.$$

Тогда $\sin y = \cos x \operatorname{tg} z$.

Теперь найдем сумму:

$$\begin{aligned} \cos^2 y + \sin^2 y &= \frac{9}{4} \operatorname{tg}^2 z + \cos^2 x \operatorname{tg}^2 z = \frac{9}{4} \operatorname{tg}^2 z \left(1 + \frac{4}{9} \cos^2 x\right) = \\ &= \frac{9}{4} \cdot \frac{1 - \cos^2 z}{\cos^2 z} \cdot \left(1 + \frac{4}{9} \cos^2 x\right). \end{aligned}$$

Из уравнения $2 \cos z = 3 \operatorname{tg} x$ находим

$$\cos z = \frac{3}{2} \operatorname{tg} x.$$

Тогда

$$\cos^2 y + \sin^2 y = \frac{9 \left(1 - \frac{9}{4} \operatorname{tg}^2 x\right)}{4 \cdot \frac{9}{4} \operatorname{tg}^2 x} \cdot \left(1 + \frac{4}{9} \cos^2 x\right).$$

В силу основного тригонометрического тождества получаем, что

$$\begin{aligned} \frac{(4 - 9 \operatorname{tg}^2 x)(9 + 4 \cos^2 x)}{36 \operatorname{tg}^2 x} &= 1 \iff \\ \iff 36 + 16 \cos^2 x - 81 \operatorname{tg}^2 x - 36 \sin^2 x &= 36 \operatorname{tg}^2 x \iff \\ \iff 52 \cos^2 x = 117 \operatorname{tg}^2 x \iff 4 \cos^2 x &= \frac{9(1 - \cos^2 x)}{\cos^2 x} \iff \\ \iff 4 \cos^4 x + 9 \cos^2 x - 9 &= 0 \iff (4 \cos^2 x - 3)(\cos^2 x + 3) = 0 \iff \\ \iff 4 \cos^2 x - 3 &= 0 \iff \cos^2 x = \frac{3}{4} \iff \\ \iff \cos 2x &= \frac{1}{2} \iff x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi l, \forall l \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Рассмотрим возможные случаи.

С л у ч а й 1. Пусть $l = 2k, \forall k \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то из третьего уравнения системы (21) получаем

$$\cos z = -\frac{\sqrt{3}}{2} \iff z = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то из третьего уравнения системы (21) получаем

$$\cos z = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff z = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

При

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

из первого уравнения системы (21) получаем

$$\operatorname{tg} y = \frac{\sqrt{3}}{3} \iff y = \frac{\pi}{6} + \pi p, \forall p \in \mathbb{Z}.$$

Заметим, что из второго уравнения системы (21) следует, что $\cos y$ и $\operatorname{tg} z$ должны быть одного знака.

Поэтому для

$$z = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}, \quad \text{и} \quad z = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}$$

имеем

$$p = 2n + 1,$$

следовательно,

$$y = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z};$$

а для

$$z = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m \quad \text{и} \quad z = \frac{\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z},$$

имеем

$$p = 2n,$$

следовательно,

$$y = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

В итоге получаем множество решений системы (21): $\left\{ \left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi m \right) \right\}, \forall k, n, m \in \mathbb{Z}.$

С л у ч а й 2. Пусть $l = 2k + 1, \forall k \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

т.е.

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то из третьего уравнения системы (21) получаем

$$\cos z = -\frac{\sqrt{3}}{2} \iff z = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

При

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

из первого уравнения системы (21) получаем

$$\operatorname{tg} y = -\frac{\sqrt{3}}{3} \iff y = -\frac{\pi}{6} + \pi p, \forall p \in \mathbb{Z}.$$

Так как $\cos y$ и $\operatorname{tg} z$ должны быть одного знака, то для

$$z = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z},$$

неизвестная

$$y = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z};$$

а для

$$z = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z},$$

неизвестная

$$y = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Тогда $\left\{ \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m \right) \right\}, \forall k, n, m \in \mathbb{Z}$, — множество решений системы (21).

Аналогично при

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

получаем множество решений системы (21): $\left\{ \left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi k, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi m \right) \right\}, \forall k, n, m \in \mathbb{Z}.$

Ответ: $\left\{ \left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi m \right), \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \right. \right.$

$$\begin{aligned} & -\frac{\pi}{6} + 2\pi m), \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi m\right), \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, -\frac{\pi}{6} + \right. \\ & + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m), \left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi k, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi m\right), \left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + \right. \\ & \left. + 2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi m\right)\}, \forall k, n, m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Задача 11. Найдите все упорядоченные тройки чисел (x, y, z) , являющиеся решением системы уравнений:

$$\begin{cases} 8 \cos x \cos y \cos(x - y) + 1 = 0, \\ x + y = z. \end{cases} \quad (22)$$

Решение. Тригонометрическое уравнение

$$\begin{aligned} & 8 \cos x \cos y \cos(x - y) + 1 = 0 \iff \\ & \iff 4(\cos(x + y) + \cos(x - y)) \cos(x - y) + 1 = 0 \iff \\ & \iff 4 \cos^2(x - y) + 4 \cos(x - y) \cos(x + y) + 1 = 0 \iff \\ & \iff (2 \cos(x - y) + \cos(x + y))^2 + 1 - \cos^2(x + y) = 0. \end{aligned}$$

Так как $\cos^2(x + y) \leq 1, \forall x, y \in \mathbb{R}$, то

$$1 - \cos^2(x + y) \geq 0, \forall x, y \in \mathbb{R},$$

и поэтому полученное равенство равносильно системе ("распадается" на систему двух уравнений)

$$\begin{cases} 2 \cos(x - y) + \cos(x + y) = 0, \\ \cos^2(x + y) = 1. \end{cases}$$

Следовательно, система (22) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \cos(x + y) = 1, \\ 2 \cos(x - y) + 1 = 0, \\ x + y = z, \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 2\pi n, \\ x - y = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \\ z = 2\pi n \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{cases} x + y = 2\pi n, \\ x - y = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \\ z = 2\pi n, \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi(n + k), \\ y = -\frac{\pi}{3} + \pi(n - k), \\ z = 2\pi n, \end{cases} \right.$$

$$\left[\begin{cases} x + y = 2\pi n, \\ x - y = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \\ z = 2\pi n \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x = -\frac{\pi}{3} + \pi(n + k), \\ y = \frac{\pi}{3} + \pi(n - k), \\ z = 2\pi n, \forall k, n \in \mathbb{Z}; \end{cases} \right.$$

$$\begin{cases} \cos(x + y) = -1, \\ 2 \cos(x - y) - 1 = 0, \\ x + y = z, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = \pi + 2\pi n, \\ x - y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ z = \pi + 2\pi n \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{cases} x + y = \pi + 2\pi n, \\ x - y = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ z = \pi + 2\pi n, \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x = \frac{2\pi}{3} + \pi(n + k), \\ y = \frac{\pi}{3} + \pi(n - k), \\ z = \pi + 2\pi n, \end{cases} \right.$$

$$\left[\begin{cases} x + y = \pi + 2\pi n, \\ x - y = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \\ z = \pi + 2\pi n \end{cases} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + \pi(n + k), \\ y = \frac{2\pi}{3} + \pi(n - k), \\ z = \pi + 2\pi n, \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \right.$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{3} + \pi(n + k), -\frac{\pi}{3} + \pi(n - k), 2\pi n \right), \left(-\frac{\pi}{3} + \pi(n + k), \right. \right.$

$\left. \frac{\pi}{3} + \pi(n - k), 2\pi n \right), \left(\frac{2\pi}{3} + \pi(n + k), \frac{\pi}{3} + \pi(n - k), \pi(2n + 1) \right),$

$\left. \left(\frac{\pi}{3} + \pi(n + k), \frac{2\pi}{3} + \pi(n - k), \pi(2n + 1) \right) \right\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}.$

Задача 12. Решите уравнение:

$$\operatorname{tg}^4 x + \operatorname{tg}^4 y + 2 \operatorname{ctg}^2 x \operatorname{ctg}^2 y = 3 + \sin^2(x + y). \quad (23)$$

Решение. Пусть

$$\operatorname{tg}^2 x = u, \quad \operatorname{tg}^2 y = v.$$

Тогда

$$\operatorname{tg}^4 x + \operatorname{tg}^4 y + 2 \operatorname{ctg}^2 x \operatorname{ctg}^2 y = u^2 + v^2 + \frac{2}{uv}.$$

Поскольку

$$(u - v)^2 \geq 0 \iff u^2 + v^2 \geq 2uv,$$

то при $u > 0, v > 0$

$$u^2 + v^2 + \frac{2}{uv} \geq 2uv + \frac{2}{uv} = 2\left(uv + \frac{1}{uv}\right) \geq 4,$$

так как при $a > 0$

$$(a - 1)^2 \geq 0 \iff a^2 + 1 \geq 2a \implies a + \frac{1}{a} \geq 2.$$

Итак, выражение в левой части уравнения (23) не меньше 4, а выражение в правой части — не больше 4, так как

$$\sin^2(x + y) \leq 1, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Поэтому уравнение (23) равносильно системе

$$\begin{cases} 3 + \sin^2(x + y) = 4, \\ \operatorname{tg}^2 x = \operatorname{tg}^2 y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \sin^2(x + y) = 1, \\ \operatorname{tg}^2 x = \operatorname{tg}^2 y = 1, \end{cases}$$

потому что равенство в нестрогом неравенстве

$$uv + \frac{1}{uv} \geq 2$$

достигается при $uv = 1$, а в неравенстве

$$u^2 + v^2 \geq 2uv$$

достигается при $u = v$.

Значит, в обоих неравенствах одновременно равенство достигается лишь при $u = v = 1$.

Система уравнений

$$\begin{cases} \sin^2(x+y) = 1, \\ \operatorname{tg}^2 x = 1, \\ \operatorname{tg}^2 y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ x = \pm \frac{\pi}{4} + \pi m, \\ y = \pm \frac{\pi}{4} + \pi k \end{cases} \iff \begin{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \pi m, \\ y = \frac{\pi}{4} + \pi k, \end{cases} \\ \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + \pi m, \\ y = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \end{cases} \end{cases}$$

где k, m и n — целые числа.

Ответ: $\left\{ \left(\frac{\pi}{4} + \pi m, \frac{\pi}{4} + \pi k \right), \left(-\frac{\pi}{4} + \pi m, -\frac{\pi}{4} + \pi k \right) \right\}, \forall k, m \in \mathbb{Z}$.

Задача 13. Исключите x и y из системы:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \cos x + \cos y = b, \\ \operatorname{tg} \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{y}{2} = \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}. \end{cases} \quad (24)$$

Решение. Уравнение

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{y}{2} = \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} &\iff \frac{\sin \frac{x}{2} \sin \frac{y}{2}}{\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2}} = \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} \iff \\ &\iff \frac{\cos \frac{x-y}{2} - \cos \frac{x+y}{2}}{\cos \frac{x-y}{2} + \cos \frac{x+y}{2}} = \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{1}. \end{aligned}$$

Используя свойство

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{c-d}{c+d}$$

пропорции $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, получаем, что

$$\frac{-\cos \frac{x+y}{2}}{\cos \frac{x-y}{2}} = \frac{\operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} - 1}{\operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} + 1} \iff \frac{\cos \frac{x+y}{2}}{\cos \frac{x-y}{2}} = \cos \alpha.$$

Далее,

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \cos x + \cos y = b \end{cases} \implies \begin{cases} (\sin x + \sin y)^2 = a^2, \\ (\cos x + \cos y)^2 = b^2 \end{cases} \implies$$

$$\implies \sin^2 x + 2 \sin x \sin y + \sin^2 y + \cos^2 x + 2 \cos x \cos y + \cos^2 y = a^2 + b^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 + 2(\sin x \sin y + \cos x \cos y) = a^2 + b^2 \Leftrightarrow 2 + 2 \cos(x-y) = a^2 + b^2 \Leftrightarrow$$

$$\iff 2(1 + \cos(x-y)) = a^2 + b^2 \iff 4 \cos^2 \frac{x-y}{2} = a^2 + b^2.$$

Итак,

$$\begin{cases} \frac{\cos \frac{x+y}{2}}{\cos \frac{x-y}{2}} = \cos \alpha, \\ 4 \cos^2 \frac{x-y}{2} = a^2 + b^2 \end{cases} \implies 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a^2 + b^2}{2} \cos \alpha \iff$$

$$\iff \cos x + \cos y = \frac{a^2 + b^2}{2} \cos \alpha,$$

а учитывая, что $\cos x + \cos y = b$, получаем:

$$b = \frac{a^2 + b^2}{2} \cos \alpha \iff 2b = (a^2 + b^2) \cos \alpha.$$

Ответ: $2b = (a^2 + b^2) \cos \alpha.$

§ 6. Тригонометрические системы с параметрами

Задача 1. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ x + y = 2b \end{cases} \quad (1)$$

относительно x и y .

Решение. Используя формулу преобразования суммы синусов в произведение, систему (1) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} 2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = a, \\ x + y = 2b \end{cases} \iff \begin{cases} \sin b \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2}, \\ x + y = 2b. \end{cases}$$

В зависимости от параметров a и b рассмотрим логически возможные случаи.

Если

$$\sin b = 0 \iff b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы будет следующим:

$$0 \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2}.$$

Это уравнение при $a \neq 0$ решений не имеет.

Если же $a = 0$, то любые действительные числа x и y будут его решениями.

Поэтому при

$$a \neq 0, b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (1) решений не имеет, а при

$$a = 0, b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (1) будет множество упорядоченных пар

$$\{(x, 2\pi k - x)\},$$

где x — любое действительное число, а k — любое целое число.

Если

$$\sin b \neq 0 \iff b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы является простейшим тригонометрическим уравнением

$$\cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2 \sin b}. \quad (2)$$

Если $\left| \frac{a}{2 \sin b} \right| \leq 1$, т.е. если

$$|a| \leq 2 |\sin b|,$$

то из уравнения (2) получаем равенство

$$x - y = \pm 2A + 4\pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

где $A = \arccos \frac{a}{2 \sin b}$.

Если $\left| \frac{a}{2 \sin b} \right| > 1$, т.е.

$$|a| > 2 |\sin b|,$$

то уравнение (2) решений не имеет.

Итак, при

$$|a| > 2 |\sin b|, b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (1) решений не имеет, а при

$$|a| \leq 2 |\sin b|, b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (1) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x - y = -2A + 4\pi n, \\ x + y = 2b \end{cases} \iff \begin{cases} x = b - A + 2\pi n, \\ y = b + A - 2\pi n, \end{cases} \forall n \in \mathbb{Z};$$

$$\begin{cases} x - y = 2A + 4\pi n, \\ x + y = 2b \end{cases} \iff \begin{cases} x = b + A + 2\pi n, \\ y = b - A - 2\pi n, \end{cases} \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\{(x, 2\pi k - x)\}, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$, при $a = 0, b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$;
 $\{(b + A + 2\pi n, b - A - 2\pi n), (b - A + 2\pi n, b + A - 2\pi n)\}, \forall n \in \mathbb{Z}$, при
 $|a| \leq 2|\sin b|, b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, A = \arccos \frac{a}{2 \sin b}$;
 $\emptyset$ при $a \neq 0, b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$, и при $|a| > 2|\sin b|, b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Замечание 1. Систему (1) можно решить методом исключения переменных.

Например, сначала из второго уравнения выразим переменную y через переменную x :

$$y = 2b - x.$$

Затем $y = 2b - x$ подставим в первое уравнение:

$$(1 - \cos 2b) \sin x + \sin 2b \cos x = a.$$

При таком методе решения систему (1) приводим к равносильной тригонометрической системе

$$\begin{cases} (1 - \cos 2b) \sin x + \sin 2b \cos x = a, \\ y = 2b - x. \end{cases}$$

Задача 2. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x - \sin y = a, \\ x - y = b \end{cases}$$

относительно x и y .

Ответ: $\{(x, x - 2\pi k)\}, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$, при $a = 0, b = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$;

$\emptyset$ при $a \neq 0, b = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$, при $|a| > 2\left|\sin \frac{b}{2}\right|, b \neq 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$;

$$\left\{ \left(\frac{b}{2} + A + 2\pi n, -\frac{b}{2} + A + 2\pi n \right), \left(\frac{b}{2} - A + 2\pi n, -\frac{b}{2} - A + 2\pi n \right) \right\},$$

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \text{ при } |a| \leq 2\left|\sin \frac{b}{2}\right|, b \neq 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, A = \arccos \frac{a}{2 \sin \frac{b}{2}}.$$

Задача 3. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ x - y = b \end{cases} \quad (3)$$

относительно x и y .

Решение. Используя формулу преобразования суммы синусов в произведение, систему (3) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} 2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = a, \\ x - y = b \end{cases} \iff \begin{cases} \cos \frac{b}{2} \cdot \sin \frac{x+y}{2} = \frac{a}{2}, \\ x - y = b. \end{cases}$$

В зависимости от параметров a и b рассмотрим логически возможные случаи.

Если

$$\cos \frac{b}{2} = 0 \iff \frac{b}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi k \iff b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы будет следующим:

$$0 \cdot \sin \frac{x+y}{2} = \frac{a}{2}.$$

Это уравнение при $a \neq 0$ решений не имеет.

Если же $a = 0$, то любые действительные числа x и y будут его решениями.

Поэтому при

$$a \neq 0, b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (3) решений не имеет, а при

$$a = 0, b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (3) будет множество упорядоченных пар

$$\{(x, x - \pi - 2\pi k)\},$$

где x — любое действительное число, а k — любое целое число.

Если

$$\cos \frac{b}{2} \neq 0 \iff \frac{b}{2} \neq \frac{\pi}{2} + \pi k \iff b \neq \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы является простейшим тригонометрическим уравнением

$$\sin \frac{x+y}{2} = \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}}. \quad (4)$$

Если $\left| \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}} \right| \leq 1$, т.е. если

$$|a| \leq 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|,$$

то из уравнения (4) получаем равенство

$$x+y = (-1)^m \cdot 2A + 2\pi m, \quad \forall m \in \mathbb{Z}, \quad (5)$$

где $A = \arcsin \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}}$.

Если $\left| \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}} \right| > 1$, т.е. если

$$|a| > 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|,$$

то уравнение (4) решений не имеет.

Итак, при

$$|a| > 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, \quad b \neq \pi + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (3) решений не имеет, а при

$$|a| \leq 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, \quad b \neq \pi + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (3) равносильна совокупности двух систем (в зависимости от четности или нечетности чисел m в равенстве (5)):

$$\begin{cases} x + y = 2A + 4\pi n, \\ x - y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = A + \frac{b}{2} + 2\pi n, \\ y = A - \frac{b}{2} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2\pi - 2A + 4\pi n, \\ x - y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} - A + (2n + 1)\pi, \\ y = -\frac{b}{2} - A + (2n + 1)\pi, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\{(x, x - \pi - 2\pi k)\}, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$, при $a = 0, b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$;

$$\left\{ \left(A + \frac{b}{2} + 2\pi n, A - \frac{b}{2} + 2\pi n \right), \left(\frac{b}{2} - A + (2n + 1)\pi, -\frac{b}{2} - A + (2n + 1)\pi \right) \right\},$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при } |a| \leq 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, b \neq \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, A = \arcsin \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}};$$

$$\emptyset \text{ при } a \neq 0, b = \pi + 2\pi k, \text{ при } |a| > 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, b \neq \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Замечание 2. Систему (3) можно решить методом исключения переменной. Например, сначала из второго уравнения выразим переменную y через переменную x :

$$y = x - b.$$

Затем $y = x - b$ подставим в первое уравнение:

$$(1 + \cos b) \sin x - \sin b \cos x = a.$$

При таком методе решения систему (3) приводим к равносильной тригонометрической системе

$$\begin{cases} (1 + \cos b) \sin x - \sin b \cos x = a, \\ y = x - b. \end{cases}$$

Задача 4. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} \quad (6)$$

относительно x и y .

Решение. Используя формулу преобразования суммы косинусов в произведение, систему (6) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} 2 \cos \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = a, \\ x+y = b \end{cases} \iff \begin{cases} \cos \frac{b}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2}, \\ x+y = b. \end{cases}$$

В зависимости от параметров a и b рассмотрим логически возможные случаи.

Если

$$\cos \frac{b}{2} = 0 \iff \frac{b}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi k \iff b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы будет следующим:

$$0 \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2}.$$

Это уравнение при $a \neq 0$ решений не имеет.

Если же $a = 0$, то любые действительные числа x и y будут его решениями.

Поэтому при

$$a \neq 0, b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (6) решений не имеет, а при

$$a = 0, b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (6) будет множество упорядоченных пар

$$\{(x, \pi - x + 2\pi k)\},$$

где x — любое действительное число, а k — любое целое число.

Если

$$\cos \frac{b}{2} \neq 0 \iff \frac{b}{2} \neq \frac{\pi}{2} + \pi k \iff b \neq \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы является простейшим тригонометрическим уравнением

$$\cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}}. \quad (7)$$

Если $\left| \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}} \right| \leq 1$, т.е. если

$$|a| \leq 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|,$$

то из уравнения (7) получаем равенство

$$x - y = \pm 2A + 4\pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z},$$

где $A = \arccos \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}}$.

Если $\left| \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}} \right| > 1$, т.е. если

$$|a| > 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|,$$

то уравнение (7) решений не имеет.

Итак, при

$$|a| > 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, \quad b \neq \pi + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (6) решений не имеет, а при

$$|a| \leq 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, \quad b \neq \pi + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (6) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x - y = -2A + 4\pi n, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} - A + 2\pi n, \\ y = \frac{b}{2} + A - 2\pi n, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{Z};$$

$$\begin{cases} x - y = 2A + 4\pi n, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} + A + 2\pi n, \\ y = \frac{b}{2} - A - 2\pi n, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\{(x, \pi - x + 2\pi k)\}, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$, при $a = 0, b = \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$;

$$\left\{ \left(\frac{b}{2} + A + 2\pi n, \frac{b}{2} - A - 2\pi n \right), \left(\frac{b}{2} - A + 2\pi n, \frac{b}{2} + A - 2\pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z},$$

при $|a| \leq 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, b \neq \pi + 2\pi k, \forall n \in \mathbb{Z}, \forall k \in \mathbb{Z}, A = \arccos \frac{a}{2 \cos \frac{b}{2}};$

$\emptyset$ при $a \neq 0, b = \pi + 2\pi k$, при $|a| > 2 \left| \cos \frac{b}{2} \right|, b \neq \pi + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Замечание 3. Систему (6) можно решить методом исключения переменной. Например, сначала из второго уравнения выразим переменную y через переменную x :

$$y = b - x.$$

Затем $y = b - x$ подставим в первое уравнение:

$$\sin b \sin x + (1 + \cos b) \cos x = a.$$

При таком методе решения систему (6) приводим к равносильной тригонометрической системе

$$\begin{cases} \sin b \sin x + (1 + \cos b) \cos x = a, \\ y = b - x. \end{cases}$$

Задача 5. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \cos x - \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} \quad (8)$$

относительно x и y .

Решение. Используя формулу преобразования разности косинусов в произведение, систему (8) приводим к равносильной системе

$$\begin{cases} -2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \sin \frac{x-y}{2} = a, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} \sin \frac{b}{2} \cdot \sin \frac{y-x}{2} = \frac{a}{2}, \\ x + y = b. \end{cases}$$

В зависимости от параметров a и b рассмотрим логически возможные случаи.

Если

$$\sin \frac{b}{2} = 0 \iff \frac{b}{2} = \pi k \iff b = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы будет следующим:

$$0 \cdot \sin \frac{y-x}{2} = \frac{a}{2}.$$

Если $a \neq 0$, то это уравнение решений не имеет.

При $a = 0$ любые действительные числа x, y будут его решениями.

Поэтому при

$$a \neq 0, b = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (8) решений не имеет, а при

$$a = 0, b = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (8) будет множество упорядоченных пар

$$\{(x, -x + 2\pi k)\},$$

где x — любое действительное число, а k — любое целое число.

Если

$$\sin \frac{b}{2} \neq 0 \iff \frac{b}{2} \neq \pi k \iff b \neq 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы является простейшим тригонометрическим уравнением

$$\sin \frac{y-x}{2} = \frac{a}{2 \sin \frac{b}{2}}. \quad (9)$$

Если $\left| \frac{a}{2 \sin \frac{b}{2}} \right| \leq 1$, т.е. если

$$|a| \leq 2 \left| \sin \frac{b}{2} \right|,$$

то из уравнения (9) получаем равенство

$$y - x = (-1)^m \cdot 2A + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}, \quad (10)$$

где $A = \arcsin \frac{a}{2 \sin \frac{b}{2}}.$

Если $\left| \frac{a}{2 \sin \frac{b}{2}} \right| > 1$, т.е. если

$$|a| > 2 \left| \sin \frac{b}{2} \right|,$$

то уравнение (9) решений не имеет.

Итак, при

$$|a| > 2 \left| \sin \frac{b}{2} \right|, \quad b \neq 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (8) решений не имеет, а при

$$|a| \leq 2 \left| \sin \frac{b}{2} \right|, \quad b \neq 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (8) равносильна совокупности двух систем (в зависимости от четности или нечетности чисел m в равенстве (10)):

$$\begin{cases} y - x = -2A + 2\pi(2n + 1), \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} + A - \pi(2n + 1), \\ y = \frac{b}{2} - A + \pi(2n + 1), \forall n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y - x = 2A + 4\pi n, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} - A - 2\pi n, \\ y = \frac{b}{2} + A + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\{(x, -x + 2\pi k)\}, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$, при $a = 0, b = 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$;

$$\left\{ \left(\frac{b}{2} + A - \pi(2n + 1), \frac{b}{2} - A + \pi(2n + 1) \right), \left(\frac{b}{2} - A - 2\pi n, \frac{b}{2} + A + 2\pi n \right) \right\},$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при } |a| \leq 2 \left| \sin \frac{b}{2} \right|, \quad b \neq 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \text{ где } A = \arcsin \frac{a}{2 \sin \frac{b}{2}};$$

$\emptyset$ при $a \neq 0, b = 2\pi k$, при $|a| > 2 \left| \sin \frac{b}{2} \right|, b \neq 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Замечание 4. Систему (8) можно решить методом исключения переменной. Например, сначала из второго уравнения выразим переменную y через переменную x :

$$y = b - x.$$

Затем $y = b - x$ подставим в первое уравнение:

$$-\sin b \sin x + (1 - \cos b) \cos x = a.$$

При таком методе решения систему (8) приводим к равносильной тригонометрической системе

$$\begin{cases} -\sin b \sin x + (1 - \cos b) \cos x = a, \\ y = b - x. \end{cases}$$

Задача 6. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} \quad (11)$$

относительно x и y .

Решение. Используя формулу приведения и формулу преобразования суммы косинусов в произведение, получаем

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin x + \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} &\iff \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} 2 \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x-y}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x+y}{2}\right) = a, \\ x + y = b \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x-y}{2}\right) = \frac{a}{2}, \\ x + y = b. \end{cases} \end{aligned}$$

В зависимости от параметров a и b рассмотрим логически возможные случаи.

Если

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) = 0 \iff \frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} = \frac{\pi}{2} - \pi k \iff b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы будет следующим:

$$0 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x-y}{2}\right) = \frac{a}{2}.$$

Это уравнение при $a \neq 0$ решений не имеет.

Если же $a = 0$, то любые действительные числа x и y будут его решениями.

Поэтому при

$$a \neq 0, b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (11) решений не имеет, а при

$$a = 0, b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (11) будет множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(x, -x - \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right\},$$

где x — любое действительное число, а k — любое целое число.

Если

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \neq 0 \iff \frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \neq \frac{\pi}{2} - \pi k \iff b \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы является простейшим тригонометрическим уравнением

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x-y}{2}\right) = \frac{a}{2 \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)}. \quad (12)$$

Если $\left| \frac{a}{2 \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)} \right| \leq 1$, т.е. если

$$|a| \leq 2 \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \right|,$$

то из уравнения (12) получаем равенство

$$\frac{\pi}{4} - \frac{x-y}{2} = \pm A - 2\pi n \iff x-y = \frac{\pi}{2} \mp 2A + 4\pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

где $A = \arccos \frac{a}{2 \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)}$.

Если $\left| \frac{a}{2 \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)} \right| > 1$, т.е. если

$$|a| > 2 \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \right|,$$

то уравнение (12) решений не имеет.

Итак, при

$$|a| > 2 \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \right|, b \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (11) решений не имеет, а при

$$|a| \leq 2 \left| \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \right|, b \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (11) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x-y = \frac{\pi}{2} + 2A + 4\pi n, \\ x+y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} + A + 2\pi n, \\ y = \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - A - 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x-y = \frac{\pi}{2} - 2A + 4\pi n, \\ x+y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} - A + 2\pi n, \\ y = \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} + A - 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ:

$$\left\{ \left(x, -x - \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right\}, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ при } a = 0, b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z};$$

$$\left\{ \left(\frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} + A + 2\pi n, \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - A - 2\pi n \right), \left(\frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} - A + 2\pi n, \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} + A - 2\pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при } |a| \leq 2 \left| \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \right) \right|, b \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

$$A = \arccos \frac{a}{2 \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \right)}; \text{ } \emptyset \text{ при } |a| > 2 \left| \cos \left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \right) \right|, b \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k,$$

$$\text{и при } a \neq 0, b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

Замечание 5. Систему (11) можно решить методом исключения переменной. Например, сначала из второго уравнения выразим переменную y через переменную x :

$$y = x - b.$$

Затем $y = x - b$ подставим в первое уравнение:

$$(1 + \sin b) \sin x + \cos b \cos x = a.$$

При таком методе решения систему (11) приводим к равносильной тригонометрической системе

$$\begin{cases} (1 + \sin b) \sin x + \cos b \cos x = a, \\ y = x - b. \end{cases}$$

Задача 7. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x - \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} \quad (13)$$

относительно x и y .

Решение. Используя формулу приведения и формулу преобразования разности косинусов в произведение, получаем

$$\begin{cases} \sin x - \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) - \cos y = a, \\ x + y = b \end{cases} \iff$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x-y}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x+y}{2}\right) = a, \\ x+y = b \end{cases} & \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{a}{2}, \\ x+y = b. \end{cases} \end{aligned}$$

В зависимости от параметров a и b рассмотрим логически возможные случаи.

Если

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} = -\pi k \Leftrightarrow b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы будет следующим:

$$0 \cdot \sin\left(\frac{x-y}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{a}{2}.$$

Это уравнение при $a \neq 0$ решений не имеет.

Если же $a = 0$, то любые действительные числа x и y будут его решениями.

Поэтому при

$$a \neq 0, b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (13) решений не имеет, а при

$$a = 0, b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (13) будет множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(x, \frac{\pi}{2} - x + 2\pi k \right) \right\},$$

где x — любое действительное число, а k — любое целое число.

Если

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right) \neq 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \neq -\pi k \Leftrightarrow b \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение приведенной системы является простейшим триго-

нометрическим уравнением

$$\sin\left(\frac{x-y}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{a}{2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)}. \quad (14)$$

Если $\left| \frac{a}{2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)} \right| \leq 1$, т.е. если

$$|a| \leq 2\left|\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)\right|,$$

то из уравнения (14) получаем равенство

$$\begin{aligned} \frac{x-y}{2} - \frac{\pi}{4} &= (-1)^m A + \pi m \iff \\ \iff x-y &= \frac{\pi}{2} + (-1)^m \cdot 2A + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}, \end{aligned} \quad (15)$$

где $A = \arcsin \frac{a}{2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)}$.

Если $\left| \frac{a}{2\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)} \right| > 1$, т.е. если

$$|a| > 2\left|\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)\right|,$$

то уравнение (14) решений не имеет.

Итак, при

$$|a| > 2\left|\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)\right|, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (13) решений не имеет, а при

$$|a| \leq 2\left|\sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2}\right)\right|, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (13) равносильна совокупности двух систем (в зависимости от четности или нечетности чисел m в равенстве (15)):

$$\begin{cases} x - y = \frac{5\pi}{2} - 2A + 4\pi n, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} + \frac{5\pi}{4} - A + 2\pi n, \\ y = \frac{b}{2} - \frac{5\pi}{4} + A - 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = \frac{\pi}{2} + 2A + 4\pi n, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} + A + 2\pi n, \\ y = \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - A - 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ:

$$\left\{ \left(x, -x + \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right\}, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ при } a = 0, b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z};$$

$$\left\{ \left(\frac{b}{2} + \frac{5\pi}{4} - A + 2\pi n, \frac{b}{2} - \frac{5\pi}{4} + A - 2\pi n \right), \left(\frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} + A + 2\pi n, \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - A - 2\pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при } |a| \leq 2 \left| \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \right) \right|, b \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

$$A = \arcsin \frac{a}{2 \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \right)}; \text{ } \emptyset \text{ при } |a| > 2 \left| \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{b}{2} \right) \right|, b \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k,$$

$$\text{и при } a \neq 0, b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Замечание 6. Систему (13) можно решить методом исключения переменной. Например, сначала из второго уравнения выразим переменную y через переменную x :

$$y = b - x.$$

Затем $y = b - x$ подставим в первое уравнение:

$$(1 - \sin b) \sin x - \cos b \cos x = a.$$

При таком методе решения систему (13) приводим к равносильной тригонометрической системе

$$\begin{cases} (1 - \sin b) \sin x - \cos b \cos x = a, \\ y = b - x. \end{cases}$$

Задача 8. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y = \delta, \\ x + y = \gamma \end{cases} \quad (16)$$

относительно x и y .

Решение. Из второго уравнения системы (16) выразим неизвестную x через неизвестную y и подставим $x = \gamma - y$ в первое уравнение:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(\gamma - y) - \operatorname{tg} y = \delta &\iff \frac{\operatorname{tg} \gamma - \operatorname{tg} y}{1 + \operatorname{tg} \gamma \operatorname{tg} y} - \operatorname{tg} y - \delta = 0 \iff \\ &\iff \frac{\operatorname{tg} \gamma \operatorname{tg}^2 y + (2 + \delta \operatorname{tg} \gamma) \operatorname{tg} y + \delta - \operatorname{tg} \gamma}{1 + \operatorname{tg} \gamma \operatorname{tg} y} = 0. \end{aligned} \quad (17)$$

Уравнение (17) с неизвестной y зависит от параметра γ и имеет смысл при $\gamma \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$.

Введем обозначения

$$\operatorname{tg} \gamma = a, \quad \operatorname{tg} y = u$$

и рассмотрим рациональное уравнение

$$\frac{au^2 + (2 + \delta a)u + \delta - a}{1 + au} = 0. \quad (18)$$

Если $a = 0$, то уравнение (18) будет иметь вид:

$$2u + \delta = 0,$$

из которого находим, что $u = -\frac{\delta}{2}$.

Если $a \neq 0$, то квадратное уравнение

$$au^2 + (2 + \delta a)u + \delta - a = 0$$

имеет дискриминант $D = 4 + \delta^2 a^2 + 4a^2 > 0$, и его корнями будут

$$u_1 = -\frac{2 + \delta a + \sqrt{D}}{2a} \quad \text{и} \quad u_2 = -\frac{2 + \delta a - \sqrt{D}}{2a}.$$

Знаменатель дроби в левой части равенства (18) обращается в нуль

при $u = -\frac{1}{a}$, а квадратный трехчлен $au^2 + (2 + \delta a)u + \delta - a$ при $u = -\frac{1}{a}$ равен числу $-\frac{1+a^2}{a}$, которое отлично от нуля.

Поэтому u_1 и u_2 являются корнями уравнения (18).

Учитывая обозначения, приходим к следующим выводам.

При $\operatorname{tg} \gamma = 0$, т.е. когда

$$\gamma = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

уравнение (17) равносильно уравнению

$$\operatorname{tg} y = -\frac{\delta}{2} \iff y = -\operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

При $\operatorname{tg} \gamma \neq 0$, т.е. когда

$$\gamma \neq \frac{\pi}{2} k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

уравнение (17) равносильно совокупности уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{tg} y = -A, \\ \operatorname{tg} y = -B \end{cases} \iff \begin{cases} y = -\operatorname{arctg} A + \pi n, \\ y = -\operatorname{arctg} B + \pi n, \end{cases} \forall n \in \mathbb{Z},$$

где приняты обозначения

$$A = \frac{2 + \delta \operatorname{tg} \gamma + \sqrt{D}}{2 \operatorname{tg} \gamma}, \quad B = \frac{2 + \delta \operatorname{tg} \gamma - \sqrt{D}}{2 \operatorname{tg} \gamma}$$

при $D = 4 + \delta^2 \operatorname{tg}^2 \gamma + 4 \operatorname{tg}^2 \gamma$.

Итак, если

$$\gamma = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то система (16) равносильна системе

$$\begin{cases} y = -\operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \pi n, \\ x = \gamma - y \end{cases} \iff \begin{cases} x = \operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \pi(k - n), \forall k \in \mathbb{Z}, \\ y = -\operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Если

$$\gamma \neq \frac{\pi}{2} k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то система (16) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} y = -\operatorname{arctg} A + \pi n, \\ x = \gamma - y \end{cases} \iff \begin{cases} x = \gamma + \operatorname{arctg} A - \pi n, \\ y = -\operatorname{arctg} A + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -\operatorname{arctg} B + \pi n, \\ x = \gamma - y \end{cases} \iff \begin{cases} x = \gamma + \operatorname{arctg} B - \pi n, \\ y = -\operatorname{arctg} B + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

В случае, когда

$$\gamma = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

также из второго уравнения системы (16) выразим неизвестную x через неизвестную y и подставим

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k - y, \forall k \in \mathbb{Z}$$

в первое уравнение:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \pi k - y\right) - \operatorname{tg} y = \delta \iff \operatorname{ctg} y - \operatorname{tg} y = \delta \iff$$

$$\iff \frac{\cos^2 y - \sin^2 y}{\sin y \cos y} = \delta \iff \frac{2 \cos 2y}{\sin 2y} = \delta \iff$$

$$\iff \operatorname{ctg} 2y = \frac{\delta}{2} \iff 2y = \operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \pi n \iff$$

$$\iff y = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \frac{\pi}{2} n, \forall n \in \mathbb{Z} \text{ при любом } \delta \in \mathbb{R}.$$

Значит, при любом действительном δ и

$$\gamma = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (16) будет

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \frac{\pi}{2} (2k - n), \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \frac{\pi}{2} n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(\operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \pi(k-n), -\operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z},$ при любом $\delta \in \mathbb{R}, \gamma = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}; \left\{ \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \frac{\pi}{2} (2k-n), \right. \right.$
 $\left. \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\delta}{2} + \frac{\pi}{2} n \right\}, \forall n \in \mathbb{Z},$ при любом $\delta \in \mathbb{R}, \gamma = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z};$
 $\{(\gamma + \operatorname{arctg} A - \pi n, -\operatorname{arctg} A + \pi n), (\gamma + \operatorname{arctg} B - \pi n, -\operatorname{arctg} B + \pi n)\},$
 $\forall n \in \mathbb{Z},$ при $\forall \delta \in \mathbb{R}, \gamma \neq \frac{\pi}{2} k, \forall k \in \mathbb{Z}, A = \frac{2 + \delta \operatorname{tg} \gamma + \sqrt{D}}{2 \operatorname{tg} \gamma},$
 $B = \frac{2 + \delta \operatorname{tg} \gamma - \sqrt{D}}{2 \operatorname{tg} \gamma}, D = 4 + \delta^2 \operatorname{tg}^2 \gamma + 4 \operatorname{tg}^2 \gamma.$

Задача 9. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y = a, \\ x - y = b \end{cases} \quad (19)$$

относительно x и y .

Решение. Из второго уравнения системы (19) выразим неизвестную x через неизвестную y и подставим

$$x = b + y$$

в первое уравнение:

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg}(b+y) + \operatorname{ctg} y = a &\iff \frac{\operatorname{ctg} b \operatorname{ctg} y - 1}{\operatorname{ctg} b + \operatorname{ctg} y} + \operatorname{ctg} y - a = 0 \iff \\ &\iff \frac{\operatorname{ctg}^2 y + (2 \operatorname{ctg} b - a) \operatorname{ctg} y - 1 - a \operatorname{ctg} b}{\operatorname{ctg} b + \operatorname{ctg} y} = 0. \end{aligned} \quad (20)$$

Уравнение (20) с неизвестной y зависит от параметра b и имеет смысл при $b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$

Введем обозначения

$$\operatorname{ctg} b = \gamma, \operatorname{ctg} y = u$$

и рассмотрим рациональное уравнение

$$\frac{u^2 + (2\gamma - a)u - 1 - a\gamma}{\gamma + u} = 0. \quad (21)$$

У квадратного уравнения

$$u^2 + (2\gamma - a)u - 1 - a\gamma = 0 \quad (22)$$

дискриминант $D = 4\gamma^2 + a^2 + 4$ положителен при любых $a, \gamma \in \mathbb{R}$.

Корнями уравнения (22) будут

$$u_1 = \frac{a}{2} - \gamma + \sqrt{4\gamma^2 + a^2 + 4}$$

и

$$u_2 = \frac{a}{2} - \gamma - \sqrt{4\gamma^2 + a^2 + 4}.$$

Знаменатель дроби в левой части равенства (21) обращается в нуль при $u = -\gamma$.

Уравнение

$$\frac{a}{2} - \gamma + \sqrt{4\gamma^2 + a^2 + 4} = -\gamma \iff \sqrt{4\gamma^2 + a^2 + 4} = -\frac{a}{2} \iff$$

$$\iff \begin{cases} -a \geq 0, \\ 4\gamma^2 + a^2 + 4 = \frac{a^2}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} a \leq 0, \\ 4\gamma^2 = -4 - \frac{3a^2}{4} \end{cases}$$

и уравнение

$$\frac{a}{2} - \gamma - \sqrt{4\gamma^2 + a^2 + 4} = -\gamma \iff \sqrt{4\gamma^2 + a^2 + 4} = \frac{a}{2} \iff$$

$$\iff \begin{cases} a \geq 0, \\ 4\gamma^2 + a^2 + 4 = \frac{a^2}{4} \end{cases} \iff \begin{cases} a \geq 0, \\ 4\gamma^2 = -4 - \frac{3a^2}{4} \end{cases}$$

не имеют решений, так как выражение

$$4\gamma^2 \geq 0, \forall \gamma \in \mathbb{R}, \quad a - 4 - \frac{3a^2}{4} < 0, \forall a \in \mathbb{R}.$$

Значит, при любых действительных a и γ решениями рационального уравнения (21) являются u_1 и u_2 .

Учитывая обозначения, приходим к следующим выводам.

При любом $a \in \mathbb{R}$ и

$$b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

уравнение (20) равносильно совокупности уравнений

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} y = A, \\ \operatorname{ctg} y = B \end{cases} \iff \begin{cases} y = \operatorname{arccotg} A + \pi n, \\ y = \operatorname{arccotg} B + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

где приняты обозначения

$$A = \frac{a}{2} - \operatorname{ctg} b + \sqrt{4 \operatorname{ctg}^2 b + a^2 + 4},$$

$$B = \frac{a}{2} - \operatorname{ctg} b - \sqrt{4 \operatorname{ctg}^2 b + a^2 + 4}.$$

Итак, при любом $a \in \mathbb{R}$ и

$$b \neq \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (19) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} y = \operatorname{arccotg} A + \pi n, \\ x = b + y \end{cases} \iff \begin{cases} x = b + \operatorname{arccotg} A + \pi n, \\ y = \operatorname{arccotg} A + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = \operatorname{arccotg} B + \pi n, \\ x = b + y \end{cases} \iff \begin{cases} x = b + \operatorname{arccotg} B + \pi n, \\ y = \operatorname{arccotg} B + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

В случае, когда

$$b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

система (19) примет вид:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y = a, \\ x - y = \pi k \end{cases} &\iff \begin{cases} x = y + \pi k, \\ \operatorname{ctg}(y + \pi k) + \operatorname{ctg} y = a \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} x = y + \pi k, \\ 2 \operatorname{ctg} y = a \end{cases} &\iff \begin{cases} y = \operatorname{arccctg} \frac{a}{2} + \pi n, \\ x = \operatorname{arccctg} \frac{a}{2} + \pi(n + k), \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Значит, при любом $a \in \mathbb{R}$ и

$$b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (19) будет

$$\left\{ \left(\operatorname{arccctg} \frac{a}{2} + \pi(n + k), \operatorname{arccctg} \frac{a}{2} + \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:

$$\left\{ \left(\operatorname{arccctg} \frac{a}{2} + \pi(n + k), \operatorname{arccctg} \frac{a}{2} + \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при } \forall a \in \mathbb{R}, b = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z};$$

$$\{(b + \operatorname{arccctg} A + \pi n, \operatorname{arccctg} A + \pi n), (b + \operatorname{arccctg} B + \pi n, \operatorname{arccctg} B + \pi n)\},$$

$\forall n \in \mathbb{Z}$, при любом $a \in \mathbb{R}$, $b \neq \pi k$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, где

$$A = \frac{a}{2} - \operatorname{ctg} b + \sqrt{4 \operatorname{ctg}^2 b + a^2 + 4}, \quad B = \frac{a}{2} - \operatorname{ctg} b - \sqrt{4 \operatorname{ctg}^2 b + a^2 + 4}.$$

Задача 10. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} y = d, \\ |x - y| = \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (23)$$

относительно x и y .

Решение. Первое уравнение системы (23) равносильно уравнению

$$\frac{\sin x \sin y + \cos x \cos y}{\cos x \sin y} = d \iff \frac{\cos(x - y)}{\cos x \sin y} = d.$$

Учитывая четность функции косинус, получаем тождество

$$\cos(x - y) = \cos |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R},$$

на основании которого при $|x - y| = \frac{\pi}{3}$ первое уравнение системы (23) приводим к уравнению

$$\frac{\cos \frac{\pi}{3}}{\cos x \sin y} = d \iff \frac{1}{2 \cos x \sin y} = d. \quad (24)$$

Если $d = 0$, то уравнение (24) решений не имеет.

Если $d \neq 0$, то уравнение (24) равносильно уравнению

$$2 \cos x \sin y = \frac{1}{d} \iff \sin(y - x) + \sin(y + x) = \frac{1}{d}.$$

Таким образом, при $d = 0$ система (23) решений не имеет, а при $d \neq 0$ равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \sin(y - x) + \sin(x + y) = \frac{1}{d}, \\ y - x = \frac{\pi}{3}, \end{cases} \iff \begin{cases} \sin(x + y) = \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d}, \\ y - x = \frac{\pi}{3}, \end{cases} \quad (25)$$

$$\begin{cases} \sin(y - x) + \sin(x + y) = \frac{1}{d}, \\ y - x = -\frac{\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin(x + y) = \frac{2 + d\sqrt{3}}{2d}, \\ y - x = -\frac{\pi}{3}. \end{cases} \quad (26)$$

Решим систему (25).

Двойное неравенство

$$-1 \leq \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d} \leq 1 \iff \begin{cases} \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d} \geq -1, \\ \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d} \leq 1 \end{cases} \iff$$


$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{2 + (2 - \sqrt{3})d}{2d} \geq 0, \\ \frac{2 - (2 + \sqrt{3})d}{2d} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d \leq -2(2 + \sqrt{3}), \\ d \geq 2(2 - \sqrt{3}). \end{cases}$$

При этом было учтено, что

$$2 + (2 - \sqrt{3})d = 0 \Leftrightarrow d = -\frac{2}{2 - \sqrt{3}} \Leftrightarrow d = -2(2 + \sqrt{3}),$$

$$2 - (2 + \sqrt{3})d = 0 \Leftrightarrow d = \frac{2}{2 + \sqrt{3}} \Leftrightarrow d = 2(2 - \sqrt{3}),$$

и использован метод числовых промежутков, где $d_1 = -2(2 + \sqrt{3})$, $d_2 = 2(2 - \sqrt{3})$:



Тогда совокупность неравенств

$$\begin{cases} \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d} < -1, \\ \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d} > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2(2 + \sqrt{3}) < d < 0, \\ 0 < d < 2(2 - \sqrt{3}). \end{cases}$$

Поэтому система (25) при

$$d \in (-2(2 + \sqrt{3}); 0) \cup (0; 2(2 - \sqrt{3}))$$

не имеет решений, а при

$$d \in (-\infty; -2(2 + \sqrt{3})] \cup [2(2 - \sqrt{3}); +\infty)$$

равносильна системе

$$\begin{cases} x + y = (-1)^n A + \pi n, \\ y - x = \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} A + \frac{1}{2} \pi n, \\ y = \frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} A + \frac{1}{2} \pi n, \end{cases}$$

где n — любое целое число, $A = \arcsin \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d}$.

Рассмотрим систему (26).

Двойное неравенство


$$\begin{aligned}
 -1 \leq \frac{2+d\sqrt{3}}{2d} \leq 1 &\iff \begin{cases} \frac{2+d\sqrt{3}}{2d} \geq -1, \\ \frac{2+d\sqrt{3}}{2d} \leq 1 \end{cases} \iff \\
 &\iff \begin{cases} \frac{2+(2+\sqrt{3})d}{2d} \geq 0, \\ \frac{2-(2-\sqrt{3})d}{2d} \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} d \leq -2(2-\sqrt{3}), \\ d \geq 2(2+\sqrt{3}). \end{cases}
 \end{aligned}$$

При этом было учтено, что

$$2 + (2 + \sqrt{3})d = 0 \iff d = -\frac{2}{2 + \sqrt{3}} \iff d = -2(2 - \sqrt{3}),$$

$$2 - (2 - \sqrt{3})d = 0 \iff d = \frac{2}{2 - \sqrt{3}} \iff d = 2(2 + \sqrt{3}),$$

и использован метод числовых промежутков, где $d_1 = -2(2 - \sqrt{3})$, $d_2 = 2(2 + \sqrt{3})$:



Тогда совокупность неравенств

$$\begin{cases} \frac{2+d\sqrt{3}}{2d} < -1, \\ \frac{2+d\sqrt{3}}{2d} > 1 \end{cases} \iff \begin{cases} -2(2-\sqrt{3}) < d < 0, \\ 0 < d < 2(2+\sqrt{3}). \end{cases}$$

Поэтому система (26) при

$$d \in (-2(2 - \sqrt{3}); 0) \cup (0; 2(2 + \sqrt{3}))$$

не имеет решений, а при

$$d \in (-\infty; -2(2 - \sqrt{3})] \cup [2(2 + \sqrt{3}); +\infty)$$

равносильна системе

$$\begin{cases} x + y = (-1)^n B + \pi n, \\ x - y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} B + \frac{1}{2} \pi n, \\ y = -\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} B + \frac{1}{2} \pi n, \end{cases}$$

где n — любое целое число, $B = \arcsin \frac{2 + d\sqrt{3}}{2d}$.

$$\text{Ответ: } \left\{ \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} A + \frac{\pi n}{2}, \frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} A + \frac{\pi n}{2} \right), \right.$$

$$\left. \left(\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} B + \frac{\pi n}{2}, -\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} B + \frac{\pi n}{2} \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при}$$

любом $d \in (-\infty; -2(2 + \sqrt{3})] \cup [2(2 + \sqrt{3}); +\infty)$;

$$\left\{ \left(\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} B + \frac{\pi n}{2}, -\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} B + \frac{\pi n}{2} \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при}$$

любом $d \in (-2(2 + \sqrt{3}); -2(2 - \sqrt{3})]$;

$$\left\{ \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} A + \frac{\pi n}{2}, \frac{\pi}{6} + \frac{(-1)^n}{2} A + \frac{\pi n}{2} \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \text{ при}$$

любом $d \in [2(2 - \sqrt{3}); 2(2 + \sqrt{3}))$, где числа $A = \arcsin \frac{2 - d\sqrt{3}}{2d}$,

$B = \arcsin \frac{2 + d\sqrt{3}}{2d}$; $\emptyset$ при любом $d \in (-2(2 - \sqrt{3}); 2(2 - \sqrt{3}))$.

Задача 11. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin^2 x + \sin^2 y = a, \\ x + y = b \end{cases} \quad (27)$$

относительно x и y .

Решение. Первое уравнение системы (27) равносильно уравнению

$$\frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1 - \cos 2y}{2} = a \iff \cos 2x + \cos 2y = 2(1 - a) \iff$$

$$\iff \cos(x + y) \cos(x - y) = 1 - a.$$

Тогда система (27) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos(x + y) \cos(x - y) = 1 - a \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} \cos b \cdot \cos(x - y) = 1 - a, \\ x + y = b. \end{cases} \quad (28)$$

В зависимости от параметров a и b рассмотрим логически возможные случаи.

Если

$$\cos b = 0 \iff b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение системы (28) примет вид:

$$0 \cdot \cos(x - y) = 1 - a.$$

Это уравнение при $a \neq 1$ решений не имеет.

Если же $a = 1$, то любые действительные числа x и y являются его решениями.

Следовательно, при

$$a \neq 1, b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (27) решений не имеет, а при

$$a = 1, b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (27) будет множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(x, \frac{\pi}{2} - x + \pi k \right) \right\},$$

где x — любое действительное число, а k — любое целое число.

Если

$$\cos b \neq 0 \iff b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение системы (28) является простейшим тригонометрическим уравнением

$$\cos(x - y) = \frac{1 - a}{\cos b}. \quad (29)$$

Если $\left| \frac{1 - a}{\cos b} \right| \leq 1$, т.е. если

$$|1 - a| \leq |\cos b|,$$

то из уравнения (29) получаем равенство

$$x - y = \pm A + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

где число $A = \arccos \frac{1-a}{\cos b}$.

Если $\left| \frac{1-a}{\cos b} \right| > 1$, т.е.

$$|1-a| > |\cos b|,$$

то уравнение (29) решений не имеет.

Следовательно, если

$$|1-a| > |\cos b|, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

то система (27) решений не имеет, если

$$|1-a| \leq |\cos b|, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

то система (27) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x - y = -A + 2\pi n, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b-A}{2} + \pi n, \\ y = \frac{b+A}{2} - \pi n, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{Z},$$

и

$$\begin{cases} x - y = A + 2\pi n, \\ x + y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b+A}{2} + \pi n, \\ y = \frac{b-A}{2} - \pi n, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(x, \frac{\pi}{2} - x + \pi k \right) \right\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{при } a = 1, \quad b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z};$

$\left\{ \left(\frac{b-A}{2} + \pi n, \frac{b+A}{2} - \pi n \right), \left(\frac{b+A}{2} + \pi n, \frac{b-A}{2} - \pi n \right) \right\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \quad \text{при}$

$|1-a| \leq |\cos b|, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$ где число $A = \arccos \frac{1-a}{\cos b}$;

$\emptyset$ при $a \neq 1, \quad b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \text{при } |1-a| > |\cos b|, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$

Задача 12. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sin x \sin y = a, \\ x - y = b \end{cases} \quad (30)$$

относительно x и y .

Решение. Система (30) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos(x - y) - \cos(x + y) = 2a, \\ x - y = b \end{cases} \iff \begin{cases} \cos(x + y) = \cos b - 2a, \\ x - y = b. \end{cases} \quad (31)$$

Если

$$|\cos b - 2a| > 1,$$

то система (30) не имеет решений, так как первое уравнение системы (31) имеет решения лишь при

$$|\cos b - 2a| \leq 1.$$

Если $|\cos b - 2a| \leq 1$, то система (30) равносильна совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x + y = -\arccos(\cos b - 2a) + 2\pi n, \\ x - y = b \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} - \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n, \\ y = -\frac{b}{2} - \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Вторая система

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x + y = \arccos(\cos b - 2a) + 2\pi n, \\ x - y = b \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x = \frac{b}{2} + \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n, \\ y = -\frac{b}{2} + \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: $\emptyset$ при $|2a - \cos b| > 1$; $\left\{ \left(\frac{b}{2} - \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n, -\frac{b}{2} - \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n \right), \left(\frac{b}{2} + \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n, -\frac{b}{2} + \frac{1}{2} \arccos(\cos b - 2a) + \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}$, при $|2a - \cos b| \leq 1$.

Задача 13. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} y = a, \\ x - y = b \end{cases} \quad (32)$$

относительно x и y .

Решение. Первое уравнение системы (32) равносильно уравнению

$$\frac{\cos x \cos y}{\sin x \sin y} = a \iff \frac{\cos(x - y) + \cos(x + y)}{\cos(x - y) - \cos(x + y)} = a.$$

При $x - y = b$ первое уравнение системы (32) приводим к виду

$$\frac{\cos b + \cos(x + y)}{\cos b - \cos(x + y)} = a \iff \frac{(a + 1) \cos(x + y) - (a - 1) \cos b}{\cos(x + y) - \cos b} = 0. \quad (33)$$

Уравнение

$$(a + 1) \cos(x + y) - (a - 1) \cos b = 0 \quad (34)$$

при

$$\begin{cases} a + 1 = 0, \\ \cos b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1, \\ b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

своими корнями имеет любые действительные числа x и y .

Если

$$\begin{cases} a + 1 = 0, \\ \cos b \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1, \\ b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \forall k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

то уравнение (34) решений не имеет.

Если $a \neq -1$, то уравнение (34) равносильно уравнению

$$\cos(x + y) = \frac{a - 1}{a + 1} \cos b. \quad (35)$$

Если

$$|(a - 1) \cos b| > |a + 1|,$$

то уравнение (35) решений не имеет, а если

$$|(a - 1) \cos b| \leq |a + 1|,$$

то

$$x + y = \pm A + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}, \quad (36)$$

где $A = \arccos \frac{(a - 1) \cos b}{a + 1}$.

Следовательно, когда

$$a = -1, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

а также когда

$$a \neq -1, \quad |(a - 1) \cos b| > |a + 1|,$$

уравнение (33) решений не имеет.

При этих условиях у системы (32) решений нет.

Уравнение

$$\cos(x + y) = \cos b \iff x + y = \pm b + 2\pi m, \quad \forall m \in \mathbb{Z}. \quad (37)$$

Поэтому уравнение (33) при

$$a = -1, \quad b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

своими решениями имеет любые действительные числа x и y , отличные от тех, у которых сумма

$$x + y = \frac{\pi}{2} + \pi(2m + k), \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$

или

$$x + y = -\frac{\pi}{2} + \pi(2m - k), \quad \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Значит, при

$$a = -1, \quad b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (32) является множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(y + \frac{\pi}{2} + \pi k, y \right) \right\}, \quad \forall y \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi m, \frac{\pi}{2} + \pi m \right), \quad \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Пусть

$$a \neq -1, \quad |(a-1) \cos b| \leq |a+1|.$$

Ввиду того что уравнения (35) и (37) не имеют общих решений, у уравнения (33) решения связаны соотношением (36). Поэтому система (32) равносильна совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{cases} x + y = -A + 2\pi n, \\ x - y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b-A}{2} + \pi n, \\ y = -\frac{b+A}{2} + \pi n, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Вторая система

$$\begin{cases} x + y = A + 2\pi n, \\ x - y = b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{b+A}{2} + \pi n, \\ y = \frac{A-b}{2} + \pi n, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{b-A}{2} + \pi n, -\frac{b+A}{2} + \pi n \right), \left(\frac{b+A}{2} + \pi n, \frac{A-b}{2} + \pi n \right) \right\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z},$

при $a \neq -1, \quad |(a-1) \cos b| \leq |a+1|$, где число $A = \arccos \frac{(a-1) \cos b}{a+1}$;

$$\left\{ \left(y + \frac{\pi}{2} + \pi k, y \right) \right\}, \quad \forall y \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi m, \frac{\pi}{2} + \pi m \right), \quad \forall m \in \mathbb{Z}, \quad \text{при } a = -1,$$

$$b = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}; \quad \emptyset \quad \text{при } a = -1, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad \text{и при}$$

$$a \neq -1, \quad |(a-1) \cos b| > |a+1|.$$

Задача 14. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\sin x}{\cos y} = a, \\ x + y = b \end{cases} \quad (38)$$

относительно x и y .

Решение. Используем производную пропорции

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} = \frac{\gamma + \delta}{\gamma - \delta}$$

для преобразования первого уравнения системы (38):

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{\cos y} = a &\iff \frac{\sin x + \cos y}{\sin x - \cos y} = \frac{a + 1}{a - 1} \iff \\ &\iff \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right)} = \frac{1+a}{1-a} \iff \\ &\iff \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x+y}{2}\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right) = \frac{1+a}{1-a} \quad \text{при } a \neq 1. \end{aligned}$$

Тогда система (38) при $a \neq 1$ равносильна системе

$$\begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2}\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right) = \frac{1+a}{1-a}, \\ x + y = b. \end{cases} \quad (39)$$

Выражение $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2}\right)$ не определено, когда

$$\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi k \iff b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, при

$$a \neq 1, \quad b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

система (38) решений не имеет.

Уравнение

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2}\right) = 0 \iff \frac{\pi}{4} + \frac{b}{2} = \pi m \iff b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Поэтому если

$$a = -1, \quad b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad \forall m \in \mathbb{Z}, \quad (40)$$

то система (39) равносильна системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 0 \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right) = 0, \\ x + y = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2} \neq \frac{\pi}{2} + \pi l, \\ x + y = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x + y = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, \\ x - y \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi l \end{cases} \iff \begin{cases} y = -x - \frac{\pi}{2} + 2\pi m, \\ 2x + \frac{\pi}{2} - 2\pi m \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi l \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} y = -x - \frac{\pi}{2} + 2\pi m, \\ x \neq \pi(m + l) \end{cases} \iff \begin{cases} y = -x - \frac{\pi}{2} + 2\pi m, \\ x \neq \pi p, \forall p, l, m \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Следовательно, при выполнении условий (40) множеством решений системы (38) будет множество упорядоченных пар

$$\left\{ \left(x, -x - \frac{\pi}{2} + 2\pi m \right) \right\}, \quad \forall m \in \mathbb{Z}, \quad \forall x \in (\pi p; \pi(p + 1)), \quad \forall p \in \mathbb{Z}.$$

Если

$$a \neq \pm 1, \quad b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, \quad \forall m \in \mathbb{Z},$$

то первое уравнение системы (39) решений не имеет, значит, нет решений и у системы (38).

Пусть

$$a \neq 1, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi r, \quad \forall r \in \mathbb{Z}.$$

Тогда система (39) равносильна системе

$$\begin{cases} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right) = \frac{1+a}{1-a} \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2}\right), \\ x+y=b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2} = A + \pi n, \\ x+y=b \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y = -\frac{\pi}{2} + 2A + 2\pi n, \\ x+y=b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} + A + \pi n, \\ y = \frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} - A - \pi n, \forall n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

где $A = \operatorname{arctg}\left(\frac{1+a}{1-a} \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2}\right)\right)$.

При $a = 1$ система (38) равносильна системе

$$\begin{cases} \frac{\sin x}{\cos y} = 1, \\ x+y=b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\sin x - \cos y}{\cos y} = 0, \\ x+y=b \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right)}{\cos y} = 0, \\ x+y=b \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right)}{\cos y} = 0, \\ x+y=b. \end{cases} \quad (41)$$

Уравнения

$$\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z},$$

$$\cos y = 0 \Leftrightarrow y = \frac{\pi}{2} + \pi l, \forall l \in \mathbb{Z}.$$

Если $b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$, то система (41) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos y \neq 0, \\ x + y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \end{cases} \iff \begin{cases} y \neq \frac{\pi}{2} + \pi l, \forall l \in \mathbb{Z}, \\ x = -y + \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Следовательно, при

$$a = 1, \quad b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (38) является множество

$$\left\{ \left(-y + \frac{\pi}{2} + 2\pi k, y \right) \right\}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi l; \frac{\pi}{2} + \pi l \right), \quad \forall l \in \mathbb{Z}.$$

Если $b \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}$, то система (41) равносильна системе

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x-y}{2}\right) = 0, \\ x + y = b, \\ \cos y \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x - y = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ x + y = b, \\ \cos y \neq 0, \end{cases}$$

и ее решениями будут

$$x = \frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad y = \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - \pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z},$$

при $y \neq \frac{\pi}{2} + \pi l, \forall l \in \mathbb{Z}$.

Уравнение

$$\begin{aligned} \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - \pi n = \frac{\pi}{2} + \pi l &\iff b = \frac{3\pi}{2} + 2\pi(l + n) \iff \\ &\iff b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi q, \quad \forall l, n, q \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Следовательно, если

$$b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi q, \quad \forall q \in \mathbb{Z},$$

то система (41) решений не имеет, а если

$$b \neq \frac{\pi}{2} + \pi s, \forall s \in \mathbb{Z},$$

то множество

$$\left\{ \left(\frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} + \pi n, \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z} \quad (42)$$

является множеством решений системы (41).

Таким образом, при

$$a = 1, \quad b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

у системы (38) нет решений, а при

$$a = 1, \quad b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

множеством решений системы (38) является множество (42).

Ответ: $\left\{ \left(x, -x - \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right) \right\}, \forall x \in (\pi m; \pi(m+1)), \forall m \in \mathbb{Z},$
 при $a = -1, b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}; \left\{ \left(-y + \frac{\pi}{2} + 2\pi k, y \right) \right\}, \forall y \in$
 $\in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi m; \frac{\pi}{2} + \pi m \right), \forall m \in \mathbb{Z},$ при $a = 1, b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z};$
 $\left\{ \left(\frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} + \pi n, \frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} - \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z},$ при $a = 1, b \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z};$
 $\left\{ \left(\frac{b}{2} - \frac{\pi}{4} + A + \pi n, \frac{b}{2} + \frac{\pi}{4} - A - \pi n \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z},$ при $a \neq 1, b \neq \frac{\pi}{2} + \pi k,$
 $\forall k \in \mathbb{Z}, A = \operatorname{arctg} \left(\frac{1+a}{1-a} \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{b}{2} \right) \right); \emptyset$ при $a = 1, b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k,$
 при $a \neq 1, b = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ и при $a \neq \pm 1, b = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \forall k \in \mathbb{Z}.$

Задача 15. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x \cos y = a, \\ \cos x \sin y = b \end{cases} \quad (43)$$

относительно x и y .

Решение. Почленно складывая и вычитая уравнения системы (43), приводим ее к равносильной системе

$$\begin{cases} \sin x \cos y + \sin y \cos x = a + b, \\ \sin x \cos y - \sin y \cos x = a - b \end{cases} \iff \begin{cases} \sin(x + y) = a + b, \\ \sin(x - y) = a - b. \end{cases}$$

Поскольку $|\sin \alpha| \leq 1, \forall \alpha \in \mathbb{R}$, то

$$\text{при } |a + b| > 1 \text{ и при } |a - b| > 1$$

система (43) решений не имеет.

Если

$$|a + b| \leq 1 \text{ и } |a - b| \leq 1,$$

то система (43) равносильна системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x + y = (-1)^k A + \pi k, \\ x - y = (-1)^m B + \pi m \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} x = \frac{1}{2} ((-1)^k \cdot A + (-1)^m \cdot B + \pi(k + m)), \\ y = \frac{1}{2} ((-1)^k \cdot A + (-1)^{m+1} \cdot B + \pi(k - m)), \end{cases} \forall k, m \in \mathbb{Z}, \end{aligned}$$

где $A = \arcsin(a + b)$, $B = \arcsin(a - b)$.

Ответ: $\emptyset$ при $|a + b| > 1$ и при $|a - b| > 1$;

$$\left\{ \left(\frac{(-1)^k A + (-1)^m B + \pi(k + m)}{2}, \frac{(-1)^k A + (-1)^{m+1} B + \pi(k - m)}{2} \right) \right\},$$

$\forall k, m \in \mathbb{Z}$, $A = \arcsin(a + b)$, $B = \arcsin(a - b)$.

Задача 16. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = c, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = e \end{cases} \quad (44)$$

относительно x и y .

Решение. Тригонометрическую систему (44) подстановкой

$$\sin x = u, \quad \sin y = v$$

приводим к алгебраической системе

$$\begin{aligned} \begin{cases} u + v = c, \\ u^2 + v^2 = e \end{cases} &\iff \begin{cases} u + v = c, \\ u^2 + 2uv + v^2 = e + 2uv \end{cases} \iff \\ \iff \begin{cases} u + v = c, \\ (u + v)^2 = e + 2uv \end{cases} &\iff \begin{cases} u + v = c, \\ uv = \frac{c^2 - e}{2}. \end{cases} \end{aligned} \quad (45)$$

По обратной теореме Виета u и v являются корнями приведенного квадратного уравнения

$$z^2 - cz + \frac{c^2 - e}{2} = 0,$$

равными

$$z_1 = \frac{c - \sqrt{2e - c^2}}{2} \quad \text{и} \quad z_2 = \frac{c + \sqrt{2e - c^2}}{2}.$$

Поэтому решениями алгебраической системы (45) будут

$$u = z_1, \quad v = z_2 \quad \text{и} \quad u = z_2, \quad v = z_1$$

при $2e - c^2 \geq 0$.

Если же $2e - c^2 < 0$, то у системы (45) решений нет.

Итак, при $2e - c^2 < 0$ система (44) решений не имеет.

Если $2e - c^2 \geq 0$, то алгебраическая система (45) имеет указанные решения.

Учитывая выполненную подстановку, устанавливаем, что

$$\text{при } |c - \sqrt{2e - c^2}| > 2 \quad \text{и} \quad \text{при } |c + \sqrt{2e - c^2}| > 2$$

система (44) решений не имеет, поскольку нарушаются условия

$$|\sin x| \leq 1 \quad \text{или} \quad |\sin y| \leq 1.$$

Если же

$$|c - \sqrt{2e - c^2}| \leq 2 \quad \text{и} \quad |c + \sqrt{2e - c^2}| \leq 2,$$

то система (44) равносильна совокупности систем

$$\left[\begin{cases} \sin x = z_1, \\ \sin y = z_2, \end{cases} \right] \iff \left[\begin{cases} x = (-1)^n \cdot \arcsin z_1 + \pi n, \\ y = (-1)^m \cdot \arcsin z_2 + \pi m, \end{cases} \right] \iff \left[\begin{cases} \sin x = z_2, \\ \sin y = z_1 \end{cases} \right] \iff \left[\begin{cases} x = (-1)^n \cdot \arcsin z_2 + \pi n, \\ y = (-1)^m \cdot \arcsin z_1 + \pi m, \forall n, m \in \mathbb{Z}. \end{cases} \right]$$

Ответ:

$\{((-1)^n \cdot \arcsin z_1 + \pi n, (-1)^m \cdot \arcsin z_2 + \pi m), ((-1)^n \cdot \arcsin z_2 + \pi n, (-1)^m \cdot \arcsin z_1 + \pi m)\}, \forall n, m \in \mathbb{Z}$, при $2e - c^2 \geq 0, |c - \sqrt{2e - c^2}| \leq 2, |c + \sqrt{2e - c^2}| \leq 2$, где $z_1 = \frac{1}{2}(c - \sqrt{2e - c^2}), z_2 = \frac{1}{2}(c + \sqrt{2e - c^2})$; $\emptyset$ при $2e - c^2 < 0$, при $2e - c^2 \geq 0, |c - \sqrt{2e - c^2}| > 2$ и при $2e - c^2 \geq 0, |c + \sqrt{2e - c^2}| > 2$.

Задача 17. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = w, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = z \end{cases} \quad (46)$$

относительно x и y .

Решение. Система

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin x + \cos y = w, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = z \end{cases} &\iff \begin{cases} \sin x + \cos y = w, \\ \sin^2 x - \cos^2 y = z - 1 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} \sin x + \cos y = w, \\ w(\sin x - \cos y) = z - 1. \end{cases} \end{aligned} \quad (47)$$

Если $w = 0, z \neq 1$, то второе уравнение системы (47) не имеет смысла, а значит, при

$$w = 0, z \neq 1$$

у системы (46) нет решений.

Если $w = 0, z = 1$, то систему (47) приводим к уравнению

$$\sin x + \cos y = 0 \iff \sin x = -\cos y \iff x = -\frac{\pi}{2} \pm y + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Поэтому при

$$w = 0, z = 1$$

множеством решений системы (46) будет

$$\left\{ \left(-\frac{\pi}{2} \pm y + 2\pi n, y \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{R}.$$

Если $w \neq 0$, то система (47) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = w, \\ \sin x - \cos y = \frac{z-1}{w} \end{cases} \iff \begin{cases} \sin x = \frac{w^2 + z - 1}{2w}, \\ \cos y = \frac{w^2 - z + 1}{2w}. \end{cases}$$

Отсюда следует, что система (46) не имеет решений при

$$w \neq 0, |w^2 + z - 1| > 2|w|$$

и при

$$w \neq 0, |w^2 - z + 1| > 2|w|,$$

а при

$$w \neq 0, |w^2 + z - 1| \leq 2|w|, |w^2 - z + 1| \leq 2|w|$$

множеством решений системы (46) будет множество упорядоченных пар:

$$\left\{ \left((-1)^n \arcsin \frac{w^2 + z - 1}{2w} + \pi n, \pm \arccos \frac{w^2 - z + 1}{2w} + 2\pi k \right) \right\}, \forall n, k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\left\{ \left(-\frac{\pi}{2} \pm y + 2\pi n, y \right) \right\}, \forall n \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{R},$ при $w = 0, z = 1;$

$$\left\{ \left((-1)^n \arcsin \frac{w^2 + z - 1}{2w} + \pi n, \pm \arccos \frac{w^2 - z + 1}{2w} + 2\pi k \right) \right\}, \forall n, k \in \mathbb{Z},$$

при $w \neq 0, |w^2 + z - 1| \leq 2|w|, |w^2 - z + 1| \leq 2|w|;$

$\emptyset$ при $w = 0, z \neq 1,$ при $w \neq 0, |w^2 + z - 1| > 2|w|$ и при $w \neq 0, |w^2 - z + 1| > 2|w|.$

Задача 18. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = r, \\ \cos x \cos y = s \end{cases} \quad (48)$$

относительно x и y .

Решение. Поскольку

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2},$$

а

$$\begin{aligned} \cos x \cos y &= \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y)) = \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x+y}{2} + 2 \cos^2 \frac{x-y}{2} - 1 \right) = \cos^2 \frac{x-y}{2} - \sin^2 \frac{x+y}{2}, \end{aligned}$$

то система (48) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{r}{2}, \\ \cos^2 \frac{x-y}{2} - \sin^2 \frac{x+y}{2} = s. \end{cases}$$

Эта система подстановкой

$$\sin \frac{x+y}{2} = u, \quad \cos \frac{x-y}{2} = v \quad (49)$$

приводится к алгебраической системе

$$\begin{cases} uv = \frac{r}{2}, \\ v^2 - u^2 = s. \end{cases} \quad (50)$$

Далее будем рассматривать логические возможности в зависимости от параметров r и s .

Если $r = 0$, то система (50) будет иметь вид:

$$\begin{cases} uv = 0, \\ v^2 - u^2 = s \end{cases}$$

и будет равносильна совокупности

$$\left\{ \begin{array}{l} u = 0, \\ v^2 = s, \\ v = 0, \\ u^2 = -s \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} u = 0, \\ v = \pm \sqrt{s}, \\ v = 0, \\ u = \pm \sqrt{-s}. \end{array} \right.$$

Отсюда с учетом подстановки (49) получаем, что при $r = 0$, $s \geq 0$ система (48) равносильна системе

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \frac{x+y}{2} = 0, \\ \cos \frac{x-y}{2} = \pm \sqrt{s}. \end{array} \right. \quad (51)$$

Поскольку

$$|\pm \sqrt{s}| > 1 \Longleftrightarrow s > 1,$$

то при $s > 1$ система (51) решений не имеет.

Поэтому при $r = 0$, $s > 1$ у системы (48) нет решений.

Если $r = 0$, $0 \leq s \leq 1$, то система (48) равносильна совокупности четырех систем:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \arccos \sqrt{s} + 2\pi k \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k), \\ y = -\arccos \sqrt{s} + \pi(n - 2k); \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = -\arccos \sqrt{s} + 2\pi k \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = -\arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k), \\ y = \arccos \sqrt{s} + \pi(n - 2k); \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \pi - \arccos \sqrt{s} + 2\pi k \end{array} \right. \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = -\arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k + 1), \\ y = \arccos \sqrt{s} + \pi(n - 2k - 1); \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = -\pi + \arccos \sqrt{s} + 2\pi k \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = \arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k - 1), \\ y = -\arccos \sqrt{s} + \pi(n - 2k + 1), \end{cases}$$

где k и n — любые целые числа.

Если $r = 0$, $s < 0$, то система (48) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin \frac{x+y}{2} = \pm \sqrt{-s}, \\ \cos \frac{x-y}{2} = 0. \end{cases} \quad (52)$$

Поскольку

$$|\pm \sqrt{-s}| > 1 \iff -s > 1 \iff s < -1,$$

то при $s < -1$ система (52) решений не имеет.

Следовательно, при $r = 0$, $s < -1$ у системы (48) решений нет.

При $r = 0$, $-1 \leq s < 0$ на основании системы (52) тригонометрическую систему (48) приводим к совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = (-1)^n \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi m, \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} x = (-1)^n \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \frac{\pi}{2} (2n + 2m + 1), \\ y = (-1)^n \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \frac{\pi}{2} (2n - 2m - 1), \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi m \end{cases} \iff$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \frac{\pi}{2} (2n + 2m + 1), \\ y = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \frac{\pi}{2} (2n - 2m - 1), \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Пусть $r \neq 0$. Тогда, выражая из первого уравнения системы (50) переменную v через u и подставляя

$$v = \frac{r}{2u}$$

во второе уравнение системы (50), получаем:

$$\begin{aligned} \frac{r^2}{4u^2} - u^2 = s &\Leftrightarrow 4u^4 + 4su^2 - r^2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2u^2 + s)^2 - (r^2 + s^2) = 0 \Leftrightarrow u^2 = \frac{-s \pm \sqrt{r^2 + s^2}}{2}, \end{aligned}$$

считая $r \neq 0$.

Поскольку

$$-s - \sqrt{r^2 + s^2} \geq 0 \Leftrightarrow -s \geq \sqrt{r^2 + s^2} \Leftrightarrow \begin{cases} s \leq 0, \\ s^2 \geq r^2 + s^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s \leq 0, \\ r = 0, \end{cases}$$

$$-s + \sqrt{r^2 + s^2} \leq 0 \Leftrightarrow s \geq \sqrt{r^2 + s^2} \Leftrightarrow \begin{cases} s \geq 0, \\ s^2 \geq r^2 + s^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s \geq 0, \\ r = 0, \end{cases}$$

то корнями будут

$$u = u_1 \quad \text{и} \quad u = -u_1, \quad \text{где} \quad u_1 = \sqrt{\frac{-s + \sqrt{r^2 + s^2}}{2}},$$

причем $u_1 \neq 0$.

Поэтому при $r \neq 0$ решениями системы (50) будут

$$u = u_1, v = v_1 \quad \text{и} \quad u = -u_1, v = -v_1, \quad \text{где} \quad v_1 = \frac{r}{2u_1}.$$

Учитывая вид подстановки (49), при которой $|u| \leq 1$ и $|v| \leq 1$, приходим к следующему заключению относительно данной системы.

Если

$$u_1 > 1 \quad \text{или} \quad 2u_1 < |r|,$$

то при $r \neq 0$ система (48) решений не имеет.

Если

$$r \neq 0, \quad \frac{|r|}{2} \leq u_1 \leq 1,$$

то система (48) равносильна совокупности

$$\begin{aligned} & \left[\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = (-1)^n \cdot \arcsin u_1 + \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \arccos v_1 + 2\pi k, \end{cases} \\ & \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = (-1)^n \cdot \arcsin u_1 + \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = -\arccos v_1 + 2\pi k, \end{cases} \\ & \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 + \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \pi - \arccos v_1 + 2\pi k, \end{cases} \\ & \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 + \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = -\pi + \arccos v_1 + 2\pi k \end{cases} \end{aligned} \right] \iff \\ & \iff \left[\begin{aligned} & \begin{cases} x = (-1)^n \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n + 2k), \\ y = (-1)^n \cdot \arcsin u_1 - \arccos v_1 + \pi(n - 2k), \end{cases} \\ & \begin{cases} x = (-1)^n \cdot \arcsin u_1 - \arccos v_1 + \pi(n + 2k), \\ y = (-1)^n \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n - 2k), \end{cases} \\ & \begin{cases} x = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 - \arccos v_1 + \pi(n + 2k + 1), \\ y = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n - 2k - 1), \end{cases} \\ & \begin{cases} x = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n + 2k - 1), \\ y = (-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n - 2k + 1), \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned} \right] \end{aligned}$$

Ответ: $\{(\arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k), -\arccos \sqrt{s} + \pi(n - 2k)),$
 $(-\arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k), \arccos \sqrt{s} + \pi(n - 2k)), (-\arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k + 1),$
 $\arccos \sqrt{s} + \pi(n - 2k - 1)), (\arccos \sqrt{s} + \pi(n + 2k - 1), -\arccos \sqrt{s} + \pi(n -$
 $- 2k + 1))\}$ при $r = 0, 0 \leq s \leq 1$; $\left\{\left(\frac{\pi}{2} + (-1)^n \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \pi(n + m),\right.\right.$
 $\left.-\frac{\pi}{2} + (-1)^n \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \pi(n - m)\right), \left(\frac{\pi}{2} + (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \sqrt{-s} +\right.$
 $\left.+\pi(n + m), -\frac{\pi}{2} + (-1)^{n+1} \cdot \arcsin \sqrt{-s} + \pi(n - m)\right)\}$ при $r = 0,$
 $-1 \leq s \leq 0$; $\{((-1)^n \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n + 2k), (-1)^n \cdot \arcsin u_1 -$
 $-\arccos v_1 + \pi(n - 2k)), ((-1)^n \cdot \arcsin u_1 - \arccos v_1 + \pi(n + 2k),$
 $(-1)^n \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n - 2k)), ((-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 - \arccos v_1 +$
 $+\pi(n + 2k + 1)), ((-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n - 2k - 1)),$
 $((-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 + \arccos v_1 + \pi(n + 2k - 1), (-1)^{n+1} \cdot \arcsin u_1 +$
 $+\arccos v_1 + \pi(n - 2k + 1))\}$ при $r \neq 0, \frac{|r|}{2} \leq u_1 \leq 1$, где $n, m, k \in \mathbb{Z},$
 $\sqrt{2}u_1 = \sqrt{-s + \sqrt{r^2 + s^2}}, v_1 = \frac{r}{2u_1}; \emptyset$ при $r = 0, |s| > 1$, при
 $r \neq 0, u_1 > 1$ и при $r \neq 0, 2u_1 < |r|$.

Задача 19. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \cos x + \cos y = b \end{cases} \quad (53)$$

относительно x и y .

Решение. Система (53) равносильна системе

$$\begin{cases} \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2}, \\ \cos \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{b}{2}. \end{cases} \quad (54)$$

Если $a = b = 0$, то система (54) будет иметь вид:

$$\begin{cases} \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = 0, \\ \cos \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = 0 \end{cases} \iff \cos \frac{x-y}{2} = 0 \iff$$

$$\iff x - y = \pi + 2\pi n \iff y = x - \pi + 2\pi m, m = -n, \forall n \in \mathbb{Z},$$

так как не существует такого действительного α , что $\sin \alpha = \cos \alpha = 0$.

Если

$$a \neq 0, b = 0,$$

то система (54) будет иметь вид:

$$\begin{cases} \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2}, \\ \cos \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos \frac{x+y}{2} = 0, \\ \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2} \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} \frac{x+y}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x+y = \pi + 2\pi n, \\ \cos \frac{x-y}{2} = (-1)^n \cdot \frac{a}{2} \end{cases}$$

при любом $n \in \mathbb{Z}$.

Если $|a| > 2$, то полученная система решений не имеет.

Поэтому при $|a| > 2, b = 0$ у системы (53) решений нет.

Если

$$|a| \leq 2, a \neq 0, b = 0,$$

то система (53) будет иметь вид:

$$\begin{cases} x+y = \pi + 2\pi n, \\ x-y = \pm 2 \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + 4\pi k \end{cases}$$

и будет равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \pi(n+2k), \\ y = \frac{\pi}{2} - \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \pi(n-2k); \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} - \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \pi(n + 2k), \\ y = \frac{\pi}{2} + \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \pi(n - 2k), \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Если $b \neq 0$, то возможно почленное деление первого уравнения системы (54) на второе, в результате получим равносильную систему

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \sin \frac{x+y}{2} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = \frac{a}{2}, \\ \operatorname{tg} \frac{x+y}{2} = \frac{a}{b} \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \frac{x+y}{2} = \operatorname{arctg} \frac{a}{b} + \pi n, \\ \sin \operatorname{arctg} \frac{a}{b} \cdot \cos \frac{x-y}{2} = (-1)^n \cdot \frac{a}{2}, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned} \quad (55)$$

Если $a = 0$, то второе уравнение системы (55) совместно при любых действительных x и y , а сама система (55) равносильна ее первому уравнению.

Поэтому при

$$a = 0, \quad b \neq 0$$

у системы (53) множеством решений будет

$$\{(-y + 2\pi n, y)\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Если $a \neq 0$, то систему (55) приводим к виду

$$\begin{cases} \frac{x+y}{2} = \operatorname{arctg} \frac{a}{b} + \pi n, \\ \cos \frac{x-y}{2} = (-1)^n \cdot \frac{a}{2} \sin^{-1} \operatorname{arctg} \frac{a}{b}, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Отсюда, если

$$|a| > 2 \left| \sin \operatorname{arctg} \frac{a}{b} \right|, \quad b \neq 0,$$

то система (53) решений не имеет.

Если

$$ab \neq 0, \quad |a| \leq 2 \left| \sin \operatorname{arctg} \frac{a}{b} \right|,$$

то система (53) равносильна системе

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = \operatorname{arctg} \frac{a}{b} + \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{2} = \pm A + 2\pi k \end{cases} \iff \\ & \iff \begin{cases} \begin{cases} x = \operatorname{arctg} \frac{a}{b} + A + \pi(n + 2k), \\ y = \operatorname{arctg} \frac{a}{b} - A + \pi(n - 2k), \end{cases} \\ \begin{cases} x = \operatorname{arctg} \frac{a}{b} - A + \pi(n + 2k), \\ y = \operatorname{arctg} \frac{a}{b} + A + \pi(n - 2k), \end{cases} \end{cases} \forall k, n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

где $A = \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2} \sin^{-1} \operatorname{arctg} \frac{a}{b}\right)$.

Ответ: $\emptyset$ при $b = 0$, $|a| > 2$ и при $|a| > 2 \left| \sin \operatorname{arctg} \frac{a}{b} \right|$, $b \neq 0$;
 $\{(x, x - \pi + 2\pi n)\}$, $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, при $a = b = 0$; $\{(-y + 2\pi n, y)\}$,
 $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\forall y \in \mathbb{R}$, при $a = 0$, $b \neq 0$;

$\left\{ \left(\frac{\pi}{2} + \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \pi(n + 2k), \frac{\pi}{2} - \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \right.\right.$
 $\left. + \pi(n - 2k) \right\}$, $\left(\frac{\pi}{2} - \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \pi(n + 2k), \frac{\pi}{2} + \right.$
 $\left. + \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2}\right) + \pi(n - 2k) \right\}$, $\forall k, n \in \mathbb{Z}$, при $a \neq 0$, $|a| \leq 2$, $b = 0$;

$\left\{ \left(\operatorname{arctg} \frac{a}{b} + A + \pi(n + 2k), \operatorname{arctg} \frac{a}{b} - A + \pi(n - 2k) \right), \left(\operatorname{arctg} \frac{a}{b} - A + \right.\right.$
 $\left. + \pi(n + 2k), \operatorname{arctg} \frac{a}{b} + A + \pi(n - 2k) \right\}$, $\forall k, n \in \mathbb{Z}$, при

$|a| \leq 2 \left| \sin \operatorname{arctg} \frac{a}{b} \right|$, $b \neq 0$, где $A = \arccos\left((-1)^n \cdot \frac{a}{2} \sin^{-1} \operatorname{arctg} \frac{a}{b}\right)$.

Задача 20. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = \sqrt{2} \sin a, \\ \cos x + \cos y = \sqrt{2} \cos a \end{cases} \quad (56)$$

относительно x и y .

Решение. Преобразованиями получаем:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \sin x + \sin y = \sqrt{2} \sin a, \\ \cos x + \cos y = \sqrt{2} \cos a \end{cases} &\implies \begin{cases} (\sin x + \sin y)^2 = 2 \sin^2 a, \\ (\cos x + \cos y)^2 = 2 \cos^2 a \end{cases} \implies \\ \implies (\sin x + \sin y)^2 + (\cos x + \cos y)^2 &= 2 \sin^2 a + 2 \cos^2 a \iff \\ \iff \sin x \sin y + \cos x \cos y = 0 &\iff \cos(x - y) = 0. \end{aligned}$$

Поскольку равенство

$$\cos(x - y) = 0$$

следует из системы (56), то она равносильна системе

$$\begin{aligned} &\begin{cases} \cos(x - y) = 0, \\ \sin x + \sin y = \sqrt{2} \sin a, \\ \cos x + \cos y = \sqrt{2} \cos a \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + \pi s, \\ \sin\left(y + \frac{\pi}{2} + \pi s\right) + \sin y = \sqrt{2} \sin a, \\ \cos\left(y + \frac{\pi}{2} + \pi s\right) + \cos y = \sqrt{2} \cos a \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + \pi s, \\ (-1)^s \cdot \cos y + \sin y = \sqrt{2} \sin a, \\ (-1)^{s+1} \cdot \sin y + \cos y = \sqrt{2} \cos a, \quad \forall s \in \mathbb{Z}. \end{cases} \end{aligned}$$

Эта система равносильна совокупности двух систем.

Первая система

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ \cos y + \sin y = \sqrt{2} \sin a, \\ \cos y - \sin y = \sqrt{2} \cos a \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ 2 \cos y = \sqrt{2} \sin a + \sqrt{2} \cos a, \\ 2 \sin y = \sqrt{2} \sin a - \sqrt{2} \cos a \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ \cos y = \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right), \\ \sin y = -\cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ \left[\begin{array}{l} y = a + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ y = -a - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \end{array} \right. \\ \left[\begin{array}{l} y = a + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \\ y = -a - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + 2\pi k \end{array} \right. \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = y + \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ y = a - \frac{\pi}{4} + 2\pi n \end{cases} \iff \begin{cases} x = a + \frac{\pi}{4} + 2\pi(l + n), \\ y = a - \frac{\pi}{4} + 2\pi n \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = a + \frac{\pi}{4} + 2\pi p, \\ y = a - \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \forall k, l, n, p \in \mathbb{Z}. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Вторая система

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ \sin y - \cos y = \sqrt{2} \sin a, \\ \sin y + \cos y = \sqrt{2} \cos a \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ 2 \sin y = \sqrt{2} \sin a + \sqrt{2} \cos a, \\ 2 \cos y = \sqrt{2} \cos a - \sqrt{2} \sin a \end{cases} \iff \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ \sin y = \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right), \\ \cos y = \cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ \left[\begin{aligned} y &= a + \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \\ y &= -a - \frac{\pi}{4} + \pi + 2\pi n, \end{aligned} \right. \\ \left[\begin{aligned} y &= a + \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \\ y &= -a - \frac{\pi}{4} + 2\pi k \end{aligned} \right. \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = y - \frac{\pi}{2} + 2\pi l, \\ y = a + \frac{\pi}{4} + 2\pi n \end{cases} \iff \begin{cases} x = a - \frac{\pi}{4} + 2\pi(l + n), \\ y = a + \frac{\pi}{4} + 2\pi n \end{cases} \iff \\
 & \iff \begin{cases} x = a - \frac{\pi}{4} + 2\pi p, \\ y = a + \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \forall k, l, n, p \in \mathbb{Z}. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ответ:

$$\left\{ \left(a + \frac{\pi}{4} + 2\pi n, a - \frac{\pi}{4} + 2\pi m \right), \left(a - \frac{\pi}{4} + 2\pi n, a + \frac{\pi}{4} + 2\pi m \right) \right\}, \forall n, m \in \mathbb{Z}.$$

Задача 21. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} (\delta^2 - \delta) \sin \frac{x}{2} + 2 \cos y = \delta + 5, \\ 3 \sin \frac{x}{2} + \cos y = 4 \end{cases} \quad (57)$$

относительно x и y .

Решение. Уравнение

$$3 \sin \frac{x}{2} + \cos y = 4 \iff \begin{cases} \sin \frac{x}{2} = 1, \\ \cos y = 1, \end{cases}$$

так как

$$\sin \frac{x}{2} \leq 1, \quad \cos y \leq 1.$$

Поэтому система (57) равносильна системе

$$\begin{cases} \delta^2 - 2\delta - 3 = 0, \\ \sin \frac{x}{2} = 1, \\ \cos y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} (\delta + 1)(\delta - 3) = 0, \\ x = \pi + 4\pi n, \\ y = 2\pi k, \forall k, n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

и имеет решение при $\delta = -1$ и при $\delta = 3$ в виде множества

$$\{(\pi + 4\pi n, 2\pi k)\}, \quad \forall k, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\{(\pi + 4\pi n, 2\pi k)\}, \forall k, n \in \mathbb{Z}$, при $\delta = -1$ или $\delta = 3$;

$\emptyset$ при $\delta \in (-\infty; -1) \cup (-1; 3) \cup (3; +\infty)$.

Задача 22. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(y - \frac{\pi}{4}\right) = r, \\ x + y = 2 \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) \end{cases} \quad (58)$$

относительно x и y .

Решение. Задание системы (58) накладывает ограничения на параметр r , связанные с тем, что

$$|\sin \alpha| \leq 1, \quad |\cos \beta| \leq 1,$$

а $\arcsin \gamma$ существует лишь при $|\gamma| \leq 1$.

Поэтому система (58) может иметь решения только при

$$\begin{aligned} \begin{cases} |r| \leq 1, \\ \left| r + \frac{1}{2} \right| \leq 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} -1 \leq r \leq 1, \\ -1 \leq r + \frac{1}{2} \leq 1 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} -1 \leq r \leq 1, \\ -\frac{3}{2} \leq r \leq \frac{1}{2} \end{cases} \iff -1 \leq r \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Если $r \in (-\infty; -1) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$, то система (58) решений не имеет.

Пусть $r \in \left[-1; \frac{1}{2}\right]$. Тогда первое уравнение системы (58)

$$\begin{aligned} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(y - \frac{\pi}{4}\right) &= r \iff \\ \iff \sin(x - y) + \sin\left(x + y - \frac{\pi}{2}\right) &= 2r \iff \\ \iff \sin(x - y) - \cos(x + y) &= 2r, \end{aligned}$$

а из второго уравнения системы (58) находим, что

$$\begin{aligned} \cos(x + y) &= \cos\left(2 \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right)\right) = \\ &= 1 - 2 \sin^2 \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) = 1 - 2\left(r + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} - 2r - 2r^2. \end{aligned}$$

Тогда первое уравнение системы (58) можно записать в виде

$$\sin(x - y) = 2r + \left(\frac{1}{2} - 2r - 2r^2\right) \iff \sin(x - y) = \frac{1 - 4r^2}{2}.$$

Следовательно, параметр r должен удовлетворять условиям

$$\begin{aligned}
& \left\{ \begin{array}{l} -1 \leq r \leq \frac{1}{2}, \\ |1 - 4r^2| \leq 2 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} -1 \leq r \leq \frac{1}{2}, \\ -2 \leq 1 - 4r^2 \leq 2 \end{array} \right. \iff \\
& \iff \left\{ \begin{array}{l} -1 \leq r \leq \frac{1}{2}, \\ -3 \leq -4r^2 \leq 1 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} -1 \leq r \leq \frac{1}{2}, \\ -\frac{1}{4} \leq r^2 \leq \frac{3}{4} \end{array} \right. \iff \\
& \iff \left\{ \begin{array}{l} -1 \leq r \leq \frac{1}{2}, \\ r^2 \leq \frac{3}{4} \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} -1 \leq r \leq \frac{1}{2}, \\ |r| \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right. \iff \\
& \iff \left\{ \begin{array}{l} -1 \leq r \leq \frac{1}{2}, \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \leq r \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right. \iff -\frac{\sqrt{3}}{2} \leq r \leq \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Итак, система (58) при $r \in \left(-\infty; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ решений не имеет, а при $r \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right]$ равносильна системе

$$\begin{aligned}
& \left\{ \begin{array}{l} \sin(x - y) = \frac{1 - 4r^2}{2}, \\ x + y = 2 \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) \end{array} \right. \iff \\
& \iff \left\{ \begin{array}{l} x - y = (-1)^n \cdot \arcsin \frac{1 - 4r^2}{2} + \pi n, \\ x + y = 2 \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) \end{array} \right. \iff
\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{(-1)^n}{2} \arcsin \frac{1-4r^2}{2} + \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) + \frac{\pi}{2} n, \\ y = \frac{(-1)^{n+1}}{2} \arcsin \frac{1-4r^2}{2} + \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{2} n, \forall n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\left\{ \left(\frac{(-1)^n}{2} \arcsin \frac{1-4r^2}{2} + \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) + \frac{\pi}{2} n, \right. \right.$
 $\left. \frac{(-1)^{n+1}}{2} \arcsin \frac{1-4r^2}{2} + \arcsin\left(r + \frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{2} n \right\}, \forall n \in \mathbb{Z},$ при
 $r \in \left[\frac{-\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2} \right]; \quad \emptyset \text{ при } r \in \left(-\infty; -\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cup \left(\frac{1}{2}; +\infty \right).$

Задача 23. При каких значениях параметра d система уравнений

$$\begin{cases} y = \sin(d + \pi x) + \sin(d - \pi x), \\ 3 \sin d = \frac{1}{1 + y^2} \left(\frac{3}{2} + x + \frac{1}{2x^2} \right) \end{cases} \quad (59)$$

имеет единственное решение, и оно удовлетворяет условиям

$$1 \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad y \leq 0 ?$$

Решение. Система (59) равносильна системе

$$\begin{cases} y = 2 \sin d \cos \pi x, \\ (4 \sin^2 d \cos^2 \pi x + 1) \sin d = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2} + x + \frac{1}{2x^2} \right), \end{cases} \quad (60)$$

так как

$$\sin(d + \pi x) + \sin(d - \pi x) = 2 \sin d \cos \pi x,$$

а значит,

$$1 + y^2 = 1 + 4 \sin^2 d \cos^2 \pi x.$$

Поскольку $\cos \pi x \leq 0$ при $x \in \left[1; \frac{3}{2} \right]$, то система (60) при

$x \in \left[1; \frac{3}{2}\right]$, $y \in (-\infty; 0]$ имеет единственное решение тогда и только тогда, когда $\sin d > 0$ и второе уравнение этой системы имеет единственное решение на отрезке $\left[1; \frac{3}{2}\right]$.

Функция




Рис. 1.

$$f(x) = (4 \sin^2 d \cos^2 \pi x + 1) \sin d$$

при возрастании x от 1 до $\frac{3}{2}$ убывает от $\sin d + 4 \sin^3 d$ до $\sin d$, так как функция $\cos^2 \pi x$ убывает на отрезке $\left[1; \frac{3}{2}\right]$ от $\cos^2 \pi = 1$ до $\cos^2 \frac{3\pi}{2} = 0$, а значение $\sin d > 0$.

Функция

$$g(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2} + x + \frac{1}{2x^2} \right), \quad \forall (-\infty; 0) \cup (0; +\infty),$$

на отрезке $\left[1; \frac{3}{2}\right]$ возрастает от $g(1) = 1$ до $g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{29}{27}$, так как

$$g'(x) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{x^3} \right) = \frac{x^3 - 1}{3x^3} \geq 0 \quad \text{при } x \geq 1.$$

Поэтому второе уравнение системы (60) имеет на отрезке $\left[1; \frac{3}{2}\right]$ единственное решение тогда и только тогда, когда

$$\begin{aligned} 4 \sin^3 d + \sin d &\geq 1 \iff \\ \iff (4 \sin^3 d - 2 \sin^2 d) + (2 \sin^2 d - \sin d) + 2 \sin d - 1 &\geq 0 \iff \\ \iff (2 \sin d - 1)(2 \sin^2 d + \sin d + 1) &\geq 0 \iff \sin d \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Здесь учтено, что квадратный трехчлен $2 \sin^2 d + \sin d + 1$ отрицательно $\sin d$ принимает только положительные значения, ибо у него отрицательный дискриминант $D = 1 - 8 = -7$ и положительный первый коэффициент.

На рис. 1 смодулирована описанная ситуация.

Итак, система (59) имеет единственное решение, удовлетворяющее данным условиям, если $\sin d > 0$, $\sin d \geq \frac{1}{2}$, т.е.

$$\sin d \geq \frac{1}{2} \iff \frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq d \leq \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq d \leq \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \forall n \in \mathbb{Z}.$

Задача 24. При каких значениях a и b система уравнений

$$\begin{cases} x^{1998} - 2a \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) + b^2 = 0, \\ y^{1998} - 2b \cos\left(\frac{\pi}{2} \sin x\right) + a^2 = 0 \end{cases} \quad (61)$$

имеет единственное решение?

Решение. При замене в системе (61) x на $-x$, а также при замене y на $-y$ всякий раз получаем эту же систему.

Поэтому если упорядоченная пара (x, y) — решение системы (61), то решениями будут $(-x, y)$, $(x, -y)$ и $(-x, -y)$.

Значит, если система (61) имеет единственное решение, то таким решением будет $x = 0, y = 0$.

При $x = 0, y = 0$ система (61) будет иметь вид:

$$\begin{aligned} \begin{cases} -2a + b^2 = 0, \\ -2b + a^2 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2(b - a) + (b^2 - a^2) = 0, \\ a^2 - 2b = 0 \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} (b - a)(2 + b + a) = 0, \\ a^2 - 2b = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Если $b - a = 0$, то $a^2 - 2a = 0$, т.е. $a = 0$ или $a = 2$.

Значит, возможны случаи, когда $a = b = 0$ и когда $a = b = 2$.

Если $2 + a + b = 0$, т.е.

$$b = -(a + 2), \text{ то } a^2 + 2a + 4 = 0,$$

что не возможно, поскольку у квадратного трехчлена $a^2 + 2a + 4$ дискриминант $D = 4 - 16 = -12 < 0$.

Пусть $a = 0, b = 0$. Тогда система (61) будет иметь вид:

$$\begin{cases} x^{1998} = 0, \\ y^{1998} = 0, \end{cases}$$

а ее единственным решением будет $(0, 0)$.

Если $a = 2$, $b = 2$, то система (61) будет иметь вид

$$\begin{cases} x^{1998} - 4 \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) + 4 = 0, \\ y^{1998} - 4 \cos\left(\frac{\pi}{2} \sin x\right) + 4 = 0. \end{cases}$$

Преобразуем первое уравнение системы:

$$\begin{aligned} x^{1998} - 4 \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) + 4 = 0 &\iff \\ \iff x^{1998} + \left(\sin^2\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) - 4 \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) + 4\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) = 0 &\iff \\ \iff x^{1998} + \left[\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) - 2\right)^2 - \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right)\right] = 0. \end{aligned}$$

Откуда следует, что $x = 0$, так как выражение в квадратных скобках неотрицательное.

В самом деле, при любом действительном y из двойного неравенства $-1 \leq \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) \leq 1$ следует, что $0 \leq \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) \leq 1$ и

$$-3 \leq \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) - 2 \leq -1 \implies 1 \leq \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) - 2\right)^2 \leq 9.$$

Поэтому

$$\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) - 2\right)^2 - \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \cos y\right) \geq 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

При $x = 0$ второе уравнение системы будет иметь вид:

$$y^{1998} - 4 + 4 = 0 \iff y = 0.$$

Следовательно, и при $a = b = 2$ система (61) имеет единственное решение $(0, 0)$.

Ответ: при $a = b = 0$ и при $a = b = 2$.

Задача 25. При каких значениях параметра α система

$$\begin{cases} \cos^2 \pi xy + 3 \sin^2 \pi x + 6 \sin^2 \pi y - \operatorname{tg} 2\pi\alpha = 0, \\ \cos \pi xy - \sin^2 \pi x - 2 \sin^2 \pi y + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{tg} 2\pi\alpha = 0, \\ \log_3 \left(1 + 4 \cos^2 \left(\frac{\pi\alpha}{2} - \frac{\pi}{16} \right) - x^2 - y^2 \right) \leq \frac{1}{3} \end{cases} \quad (62)$$

имеет ровно четыре решения ?

Решение. Умножив второе уравнение системы (62) на 2 и сложив с первым, получим

$$\begin{aligned} \cos^2 \pi xy + 2 \cos \pi xy + 1 + \sin^2 \pi x + 2 \sin^2 \pi y &= 0 \iff \\ \iff (\cos \pi xy + 1)^2 + \sin^2 \pi x + 2 \sin^2 \pi y &= 0 \iff \\ \iff \begin{cases} \cos \pi xy + 1 = 0, \\ \sin \pi x = 0, \\ \sin \pi y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \pi xy = \pi + 2\pi k, \\ \pi x = \pi l, \\ \pi y = \pi m \end{cases} \iff \begin{cases} xy = 1 + 2k, \\ x = l, \\ y = m, \end{cases} \end{aligned}$$

где k, l, m — целые числа.

При

$$\cos \pi xy = -1, \quad \sin \pi x = 0, \quad \sin \pi y = 0$$

первое уравнение системы (62) будет иметь вид:

$$\operatorname{tg} 2\pi\alpha = 1 \iff 2\pi\alpha = \frac{\pi}{4} + \pi n \iff \alpha = \frac{1}{8} + \frac{n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

По свойству монотонности логарифмической функции неравенство системы (62) равносильно двойному неравенству

$$\begin{aligned} 0 < 1 + 4 \cos^2 \left(\frac{\pi\alpha}{2} - \frac{\pi}{16} \right) - x^2 - y^2 &\leq \sqrt[3]{3} \iff \\ \iff 0 < 1 + 2 \left(1 + \cos \left(\pi\alpha - \frac{\pi}{8} \right) \right) - x^2 - y^2 &\leq \sqrt[3]{3} \iff \\ \iff -3 - 2 \cos \left(\pi\alpha - \frac{\pi}{8} \right) < -(x^2 + y^2) &\leq -3 - 2 \cos \left(\pi\alpha - \frac{\pi}{8} \right) + \sqrt[3]{3} \iff \\ \iff 3 + 2 \cos \left(\pi\alpha - \frac{\pi}{8} \right) - \sqrt[3]{3} &\leq x^2 + y^2 < 3 + 2 \cos \left(\pi\alpha - \frac{\pi}{8} \right). \end{aligned}$$

Если $\alpha = \frac{1}{8} + \frac{n}{2}$, то $\cos\left(\pi\alpha - \frac{\pi}{8}\right) = \cos \frac{\pi n}{2}$, $\forall n \in \mathbb{Z}$, и

$$3 + 2 \cos \frac{\pi n}{2} - \sqrt[3]{3} \leq x^2 + y^2 < 3 + 2 \cos \frac{\pi n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом, система (62) равносильна системе

$$\begin{cases} x = l, \\ y = m, \\ xy = 1 + 2k, \\ \alpha = \frac{1}{8} + \frac{n}{2}, \\ 3 + 2 \cos \frac{\pi n}{2} - \sqrt[3]{3} \leq x^2 + y^2 < 3 + 2 \cos \frac{\pi n}{2}, \end{cases} \quad (63)$$

где k, l, m, n — целые числа.

Так как $n \in \mathbb{Z}$, то $\cos \frac{\pi n}{2}$ может быть равен лишь $-1, 0, 1$.

Пусть $\cos \frac{\pi n}{2} = -1$. Тогда неравенство системы (63) примет вид:

$$1 - \sqrt[3]{3} \leq x^2 + y^2 < 1.$$

Поскольку $1 - \sqrt[3]{3} < 0$, а x и y — целые числа, то $x^2 + y^2 = 0$, что возможно лишь при $x = y = 0$.

Но если $x = y = 0$, то равенство $xy = 1 + 2k$ не выполняется ни при каком целом k .

Итак, если $\cos \frac{\pi n}{2} = -1$, то у системы (63) нет решений.

Пусть $\cos \frac{\pi n}{2} = 0$. Тогда неравенство системы (63) будет иметь вид

$$3 - \sqrt[3]{3} \leq x^2 + y^2 < 3,$$

причем

$$1 < \sqrt[3]{3} < 2 \iff -2 < -\sqrt[3]{3} < -1 \iff 1 < 3 - \sqrt[3]{3} < 2.$$

Поскольку x и y — целые числа, то $x^2 + y^2 = 2$, что возможно тогда и только тогда, когда $|l| = 1$ и $|m| = 1$.

Итак, если

$$\cos \frac{\pi n}{2} = 0 \iff \frac{\pi n}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi p \iff n = 1 + 2p, \forall p \in \mathbb{Z},$$

то система (63) будет иметь вид:

$$\begin{cases} |x| = 1, \\ |y| = 1, \\ xy = 1 + 2k, \\ \alpha = \frac{5}{8} + p, \end{cases}$$

где k и p — целые числа.

Если $xy = -1$, то из равенства $xy = 1 + 2k$ следует, что $k = -1$, если же $xy = 1$, то $k = 0$.

Следовательно, система (62) имеет ровно четыре решения:

$$(-1, -1), (-1, 1), (1, -1), (1, 1),$$

если $\alpha = \frac{5}{8} + p, \forall p \in \mathbb{Z}$.

Пусть $\cos \frac{\pi n}{2} = 1$. Тогда неравенство системы (63) примет вид:

$$5 - \sqrt[3]{3} \leq x^2 + y^2 < 5,$$

причем $3 < 5 - \sqrt[3]{3} < 4$.

Поскольку x и y — целые числа, то сумма $x^2 + y^2 = 4$, что возможно, если и только если $l = 0$, $|m| = 2$ или $|l| = 2$, $m = 0$.

Если $x = 0$, $|y| = 2$ или $|x| = 2$, $y = 0$, то равенство $xy = 1 + 2k$ всякий раз будет иметь вид $1 + 2k = 0$ и не выполняется ни при каком целом k .

Итак, если $\cos \frac{\pi n}{2} = 1$, то у системы (63) нет решений.

Ответ: $\alpha = \frac{5}{8} + p, \forall p \in \mathbb{Z}$.

Литература

1. *Бескин Н.М.* Задачник-практикум по тригонометрии. М.: ГУПИ, 1962.
2. *Бородуля И.Т.* Тригонометрические уравнения и неравенства. М.: Просвящение, 1989.
3. *Василевский А.Б.* Обучение решению задач по математике. Мн.: Вышэйшая школа, 1988.
4. *Ваховский Е.Б., Рывкин А.А.* Задачи по элементарной математике. М.: Наука, 1971.
5. *Горбузов В.Н.* Тригонометрические системы. Ч. 1, 2. Гродно: ГрГУ, 1990.
6. *Горбузов В.Н.* Тригонометрический справочник. Гродно: ГрГУ, 1990.
7. Задачи вступительных экзаменов по математике/ Ю.В. Нестеренко и др. М.: Наука, 1986.
8. Задачи по математике, предлагавшиеся в вузах на вступительных экзаменах (с решениями)/ И.М. Ангилейко и др. Мн.: Вышэйшая школа, 1976.
9. Квант. М.: Наука, 1984. № 2; 1987. № 11; 1988. №№ 1, 6; 1989. №№ 2, 5.
10. *Крамор В.С., Михайлов П.А.* Тригонометрические функции. М.: Просвещение, 1983.
11. *Кушнир И.А.* Неравенства. Задачи и решения. Киев: Астарта, 1996.
12. Лекции и задачи по элементарной математике/ В.Г. Болтянский и др. М.: Наука, 1974.
13. *Мазур К.И.* Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави. Вып. 3. Тригонометрические уравнения. Неравенства. Киев: Украинская энциклопедия, 1994.
14. Методы решения задач по алгебре: от простых до самых сложных/ Кравцев С.В. и др. М.: Экзамен, 2001.
15. Методы решения уравнений и неравенств с параметрами/ В.Н. Горбузов и др. Гродно: ГрГУ, 1998.

16. *Моденов П.С.* Экзаменационные задачи по математике с анализом их решения. М.: Просвещение, 1969.
17. *Назаретов А.П., Пигарев Б.П.* Математика. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999.
18. *Панчишкин А.А., Шавгулидзе Е.Т.* Тригонометрические функции в задачах. М.: Наука, 1986.
19. Повторим математику/ Э.З. Шувалова и др. М.: Высшая школа, 1974.
20. Пособие по математике для поступающих в вузы/ Б.И. Александров и др. М.: МГУ, 1972.
21. Пособие по математике для поступающих в вузы. Избранные вопросы элементарной математики/ Г.В. Дорофеев и др. М.: Наука, 1972.
22. Пособие по математике для поступающих в вузы/ Под ред. Г.Н. Яковлева. М.: Наука, 1988.
23. Сборник задач по математике для поступающих во втузы/ Под ред. М.И. Сканави. М.: Высшая школа, 1988.
24. Сборник конкурсных задач по математике с методическими указаниями и решениями/ Под ред. А.И. Прилепко. М.: Наука, 1986.
25. Сборник экзаменационных материалов по математике за курс средней школы. Мн.: Жасскон, 1999, 2001.
26. *Сивашинский И.Х.* Неравенства в задачах. М.: Наука, 1967.
27. Тригонометрия: Задачник по школьному курсу/ А.Г. Мерзляк и др. М.: АСТ-ПРЕСС: Магистр-S, 1998.
28. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа/ М.Л. Галицкий и др. М.: Просвещение, 1986.
29. *Цыпкин А.Г., Пинский А.И.* Справочное пособие по методам решения задач по математике для средней школы/ Под ред. В.И. Благодатских. М.: Наука, 1983.
30. Элементарная математика. Повторительный курс/ В.В. Зайцев и др. М.: Наука, 1974.

С о д е р ж а н и е

Введение	3
§ 1. Метод исключения переменной	8
§ 2. Метод подстановки (замены переменных)	35
§ 3. Тригонометрические системы специальных видов	57
1. Системы, в которых одно уравнение алгебраическое, а другое содержит тригонометрические функции	57
2. Системы, в которых оба уравнения содержат тригонометрические функции	80
§ 4. Решения тригонометрических систем, удовлетворяющие заданным условиям	106
§ 5. Нестандартные решения систем, содержащих тригонометрические функции	126
§ 6. Тригонометрические системы с параметрами	153
Литература	219

Гнездовский Юрий Юрьевич,
Горбузов Виктор Николаевич

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

