

Неравенства на олимпиаде «Туймаада»

Международная олимпиада «Туймаада» проводится в Республике Саха (Якутия) ежегодно с 1994 года. Начиная с 1997 года авторами задач «Туймаады» являются в основном члены жюри Всероссийской и Санкт-Петербургской олимпиад школьников по математике, что позволяет расценивать материалы «Туймаады» как важный ресурс для подготовки к олимпиадам высокого уровня.

С 2000 года олимпиада проводится в двух лигах: старшей (S) и младшей (J). В старшей лиге могут состязаться все школьники, в младшей — окончившие не более 9 классов.

Олимпиада проводится в два дня. И в первый, и во второй день школьники решают по четыре задачи в течение пяти часов. Задачи первого дня имеют номера с 1 по 4, задачи второго дня — с 5 по 8. Сложность задачи в варианте каждого дня, как правило, возрастает с увеличением её номера.

Вот что говорят члены жюри по поводу сложности предлагаемых задач: «В олимпиаде принимают участие школьники с весьма различным уровнем подготовки и олимпиадного опыта, поэтому и разброс сложности задач весьма велик. Как правило, первая задача варианта может быть предложена на районной олимпиаде в Петербурге; с другой стороны, на последней позиции в старшем классе не раз оказывались задачи, забракованные жюри Международной олимпиады как чрезмерно сложные. Впрочем, раз в несколько лет какому-нибудь участнику удаётся решить восьмую задачу...» [2].

Данный листок содержит задачи на доказательство неравенств, предлагавшиеся на олимпиаде «Туймаада» в 1997—2014 годах.

1. [Tuу — 1997.5] Докажите неравенство

$$\left(1 + \frac{1}{q}\right) \left(1 + \frac{1}{q^2}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{q^n}\right) < \frac{q-1}{q-2},$$

где $n \in \mathbb{N}$, $q > 2$.

(Е. Софронов)

2. [Tuу — 1999.4] Докажите неравенство

$$\frac{x}{y^2 - z} + \frac{y}{z^2 - x} + \frac{z}{x^2 - y} > 1,$$

где $2 < x, y, z < 4$.

(А. Голованов)

3. [Туу — 2000.S.4] Для вещественных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ докажите неравенство

$$\left(\frac{n}{x_1 + \dots + x_n} - 1 \right)^n \leq \left(\frac{1}{x_1} - 1 \right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{1}{x_n} - 1 \right),$$

где $0 < x_k \leq \frac{1}{2}$, $k = 1, \dots, n$.

(А. Храбров)

4. [Туу — 2000.J.4] Докажите, что если произведение положительных чисел a, b и c равно единице, то

$$\frac{1}{a(a+1)} + \frac{1}{b(b+1)} + \frac{1}{c(c+1)} \geq \frac{3}{2}.$$

(Фольклор)

5. [Туу — 2002.S.2] Произведение положительных чисел a, b, c и d равно 1. Докажите, что

$$\frac{1+ab}{1+a} + \frac{1+bc}{1+b} + \frac{1+cd}{1+c} + \frac{1+da}{1+d} \geq 4.$$

(А. Храбров)

6. [Туу — 2002.J.5] Докажите, что при всех $x, y \in [0; 1]$ выполняется неравенство

$$5(x^2 + y^2)^2 \leq 4 + (x + y)^4.$$

(Из материалов олимпиад)

7. [Туу — 2003.S.5] Докажите, что для любых $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, принадлежащих интервалу $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, выполняется неравенство

$$\left(\frac{1}{\sin \alpha_1} + \frac{1}{\sin \alpha_2} + \dots + \frac{1}{\sin \alpha_n} \right) \left(\frac{1}{\cos \alpha_1} + \frac{1}{\cos \alpha_2} + \dots + \frac{1}{\cos \alpha_n} \right) \leq 2 \left(\frac{1}{\sin 2\alpha_1} + \frac{1}{\sin 2\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\sin 2\alpha_n} \right)^2.$$

(А. Храбров)

8. [Туу — 2003.J.5] Докажите, что для любых вещественных x и y выполняется неравенство

$$x^2 \sqrt{1 + 2y^2} + y^2 \sqrt{1 + 2x^2} \geq xy(x + y + \sqrt{2}).$$

(А. Храбров)

9. [Туу — 2005.S.8] Для любых положительных чисел a , b и c , удовлетворяющих условию $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, докажите неравенство

$$\frac{a}{a^3 + bc} + \frac{b}{b^3 + ca} + \frac{c}{c^3 + ab} > 3.$$

(А. Храбров)

10. [Туу — 2006.J.4] Сумма неотрицательных чисел x , y и z равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{x^2 + y + z} + \frac{1}{x + y^2 + z} + \frac{1}{x + y + z^2} \leq 1.$$

(V. Cirtoaje)

11. [Туу — 2012.S.7] Положительные числа a , b , c таковы, что $abc = 1$. Докажите, что

$$\frac{1}{2a^2 + b^2 + 3} + \frac{1}{2b^2 + c^2 + 3} + \frac{1}{2c^2 + a^2 + 3} \leq \frac{1}{2}.$$

(В. Аксёнов)

12. [Туу — 2013.J.3] Для любых положительных чисел a и b докажите неравенство

$$\sqrt{ab} \leq \frac{1}{3} \cdot \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}.$$

(А. Храбров)

13. [Туу — 2013.S.4] Докажите, что для любых положительных x , y , z , для которых $xyz = 1$, выполнено неравенство

$$\frac{x^3}{x^2 + y} + \frac{y^3}{y^2 + z} + \frac{z^3}{z^2 + x} \geq \frac{3}{2}.$$

(А. Голованов)

14. [Туу — 2014.J.4;S.3] Положительные числа a , b и c удовлетворяют условию $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 3$. Докажите неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{a^3 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{b^3 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{c^3 + 1}} \leq \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

(Н. Александров)

Список литературы

- [1] С. В. Попов, А. С. Голованов и др. Задачи по математике. Международная олимпиада «Туймаада». 1994—2012. М.: МЦНМО, 2013.
- [2] А. Голованов, М. Иванов, К. Кохась. Международная олимпиада «Туймаада–2013». В кн.: «Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2014 года». М.: МЦНМО, 2015.
- [3] А. Голованов, М. Иванов, К. Кохась. Международная олимпиада «Туймаада–2014». В кн.: «Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2015 года». М.: МЦНМО, 2016.