Теорема Ферма-Эйлера

Теорема. Натуральное число n представимо в виде суммы двух квадратов тогда и только тогда, когда все его простые делители вида $4k+3$ входят в разложение в четных степенях.

Лемма 1. Пусть $p > 2$ простое число. Сравнение $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ разрешимо тогда и только тогда, когда $p = 4k+1$.

(Задачи, следующие после очередной леммы, сформулированы в обозначениях этой леммы.)

1. Пусть x — ненулевой остаток по модулю p. Назовем *четверкой* набор чисел $x, -x, x^{-1}, -x^{-1}$. Докажите, что различные четверки не пересекаются. Таким образом, четверки образуют разбиение множества ненулевых остатков на классы эквивалентности.

2. Бывает ли так, что внутри четверки некоторые числа совпадают? В каких случаях это может произойти? Рассмотрите все варианты.

3. Посчитайте все четверки чисел по модулю p для случаев $p = 4k+1$ и $p = 4k+3$. Докажите Лемму 1.

Лемма 2. Пусть $p = 4k+1$. Тогда при некоторых a и b выполняется $p = a^2 + b^2$.

Пусть $s^2 \equiv -1 \pmod{p}$, $M = \{0, 1, 2, \ldots, [\sqrt{p}]\}$, $x, y \in M$.

4. Докажите, что количество различных пар чисел (x, y) больше p.

5. Докажите, что найдутся такие пары $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$, для которых выполнено $x_1 + sy_1 \equiv x_2 + sy_2$.

6. Пусть $a = x_1 - x_2$, $b = y_1 - y_2$. Докажите, что $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{p}$.

7. Докажите, что $a^2 + b^2 = p$.

Лемма 3. Пусть некоторые m, n представимы в виде суммы двух квадратов. Тогда их произведение $m \cdot n$ тоже представимо.

8. Рассмотрим два комплексных числа $z_1 = a_1 + \mathrm{i}b_1$ и $z_2 = a_2 + \mathrm{i}b_2$. Вычислите $|z_1 z_2|^2$ двумя способами и докажите Лемму 3.

Лемма 4. Пусть $n = a^2 + b^2$, $p = 4k+3$, $n \vdots p$. Тогда $a \vdots p$ и $b \vdots p$.

9. Воспользуйтесь Леммой 1 и докажите Лемму 4.

10. Следствие. Пусть $n = a^2 + b^2$, $p = 4k+3$, $n \vdots p$. Тогда $n \vdots p^2$.

11. При помощи Лемм 2–4 докажите Теорему.

Дубов.рф