

1. Из натурального числа вычли сумму его цифр и получили 2007. Каким могло быть исходное число?

2. Числа a , b и c отличны от нуля и выполняются равенства:
 $a + \frac{b}{c} = b + \frac{c}{a} = c + \frac{a}{b} = 1$. Докажите, что $ab + bc + ca = 0$.

3. Середину более длинной боковой стороны прямоугольной трапеции соединили с вершинами трапеции. При этом трапеция разделилась на три равнобедренных треугольника. Найдите величину острого угла трапеции.

4. Мальчик стоит на автобусной остановке и мёрзнет, а автобуса нет. Ему хочется пройти до следующей остановки. Мальчик бежит вчетверо медленнее автобуса и может увидеть автобус на расстоянии 2 км. До следующей остановки ровно километр. Имеет ли смысл идти, или есть риск упустить автобус?

5. На стороне AC треугольника ABC взята точка D так, что $AD : DC = 1 : 2$. Докажите, что у треугольников ADB и CDB есть по равной медиане.

6. На некоторых клетках шахматной доски лежит по конфете. Известно, что в каждой строке, в каждом столбце и в каждой диагонали (любой длины, даже состоящей из одной клетки) лежит чётное количество конфет (возможно, ни одной). Какое максимальное количество конфет может лежать на доске?

1. Из натурального числа вычли сумму его цифр и получили 2007. Каким могло быть исходное число?

2. Числа a , b и c отличны от нуля и выполняются равенства:
 $a + \frac{b}{c} = b + \frac{c}{a} = c + \frac{a}{b} = 1$. Докажите, что $ab + bc + ca = 0$.

3. Середину более длинной боковой стороны прямоугольной трапеции соединили с вершинами трапеции. При этом трапеция разделилась на три равнобедренных треугольника. Найдите величину острого угла трапеции.


4. Мальчик стоит на автобусной остановке и мёрзнет, а автобуса нет. Ему хочется пройти до следующей остановки. Мальчик бежит вчетверо медленнее автобуса и может увидеть автобус на расстоянии 2 км. До следующей остановки ровно километр. Имеет ли смысл идти, или есть риск упустить автобус?

5. На стороне AC треугольника ABC взята точка D так, что $AD : DC = 1 : 2$. Докажите, что у треугольников ADB и CDB есть по равной медиане.

6. На некоторых клетках шахматной доски лежит по конфете. Известно, что в каждой строке, в каждом столбце и в каждой диагонали (любой длины, даже состоящей из одной клетки) лежит чётное количество конфет (возможно, ни одной). Какое максимальное количество конфет может лежать на доске?

1. Существует ли натуральное число, кратное **2007**, сумма цифр которого равна **2007**?


2. На рисунке изображены графики трех квадратных трехчленов. Можно ли подобрать такие числа a , b и c , чтобы это были графики трехчленов $y = ax^2 + bx + c$, $y = bx^2 + cx + a$ и $y = cx^2 + ax + b$?



3. Несколько школьников ходили за грибами. Школьник, набравший наибольшее количество грибов, собрал $\frac{1}{5}$ общего количества грибов, а школьник, набравший наименьшее количество грибов, собрал $\frac{1}{7}$ часть от общего количества. Сколько было школьников?

4. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ выполняются равенства: $\angle CBD = \angle CAB$ и $\angle ACD = \angle ADB$. Докажите, что из отрезков BC , AD и AC можно сложить прямоугольный треугольник.


5. Дан набор одинаковых правильных пятиугольников, при вершинах каждого из которых записаны натуральные числа от **1** до **5**, как показано на рисунке. Пятиугольники можно поворачивать и переворачивать. Их сложили в стопку (вершина к вершине), и оказалось, что при каждой из пяти вершин суммы чисел одинаковы. Сколько пятиугольников могло быть в этой стопке?



6. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ $\angle A = \angle B = \angle D = 90^\circ$. Найдите угол ADB , если известно, что в данный пятиугольник можно вписать окружность.

1. Существует ли натуральное число, кратное **2007**, сумма цифр которого равна **2007**?


2. На рисунке изображены графики трех квадратных трехчленов. Можно ли подобрать такие числа a , b и c , чтобы это были графики трехчленов $y = ax^2 + bx + c$, $y = bx^2 + cx + a$ и $y = cx^2 + ax + b$?



3. Несколько школьников ходили за грибами. Школьник, набравший наибольшее количество грибов, собрал $\frac{1}{5}$ общего количества грибов, а школьник, набравший наименьшее количество грибов, собрал $\frac{1}{7}$ часть от общего количества. Сколько было школьников?

4. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ выполняются равенства: $\angle CBD = \angle CAB$ и $\angle ACD = \angle ADB$. Докажите, что из отрезков BC , AD и AC можно сложить прямоугольный треугольник.

5. Дан набор одинаковых правильных пятиугольников, при вершинах каждого из которых записаны натуральные числа от **1** до **5**, как показано на рисунке. Пятиугольники можно поворачивать и переворачивать. Их сложили в стопку (вершина к вершине), и оказалось, что при каждой из пяти вершин суммы чисел одинаковы. Сколько пятиугольников могло быть в этой стопке?



6. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ $\angle A = \angle B = \angle D = 90^\circ$. Найдите угол ADB , если известно, что в данный пятиугольник можно вписать окружность.

1. Может ли вершина параболы $y = 4x^2 - 4(a+1)x + a$ лежать во второй координатной четверти при каком-нибудь значении a ?

2. Сторону AB треугольника ABC продолжили за вершину B и выбрали на луче AB точку A_1 так, что точка B — середина отрезка AA_1 . Сторону BC продолжили за вершину C и отметили на продолжении точку B_1 так, что C — середина BB_1 . Аналогично, продолжили сторону CA за вершину A и отметили на продолжении точку C_1 так, что A — середина CC_1 . Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 1.

3. Определите, на какую наибольшую натуральную степень числа 2007 делится 2007!

(Напомним, что $2007! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2005 \cdot 2006 \cdot 2007$).

4. Пусть α и β — острые углы такие, что $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < 1$. Докажите, что $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2(\alpha + \beta)$.

5. В выпуклом пятиугольнике проведены все диагонали. Каждая вершина и каждая точка пересечения диагоналей окрашены в синий цвет. Вася хочет перекрасить эти синие точки в красный цвет. За одну операцию ему разрешается поменять цвет всех окрашенных точек, принадлежащих либо одной из сторон либо одной из диагоналей на противоположный (синие точки становятся красными, а красные — синими). Сможет ли он добиться желаемого, выполнив какое-то количество описанных операций?

6. Петя может располагать три отрезка в пространстве произвольным образом. После того как Петя расположит эти отрезки, Андрей пытается найти плоскость и спроектировать на нее отрезки так, чтобы проекции всех трех были равны. Всегда ли ему удастся это сделать, если:

а) три отрезка имеют равные длины?

б) длины двух отрезков равны между собой и не равны длине третьего?

1. Может ли вершина параболы $y = 4x^2 - 4(a+1)x + a$ лежать во второй координатной четверти при каком-нибудь значении a ?

2. Сторону AB треугольника ABC продолжили за вершину B и выбрали на луче AB точку A_1 так, что точка B — середина отрезка AA_1 . Сторону BC продолжили за вершину C и отметили на продолжении точку B_1 так, что C — середина BB_1 . Аналогично, продолжили сторону CA за вершину A и отметили на продолжении точку C_1 так, что A — середина CC_1 . Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 1.

3. Определите, на какую наибольшую натуральную степень числа 2007 делится 2007!

(Напомним, что $2007! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2005 \cdot 2006 \cdot 2007$).

4. Пусть α и β — острые углы такие, что $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < 1$. Докажите, что $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta < \sin^2(\alpha + \beta)$.

5. В выпуклом пятиугольнике проведены все диагонали. Каждая вершина и каждая точка пересечения диагоналей окрашены в синий цвет. Вася хочет перекрасить эти синие точки в красный цвет. За одну операцию ему разрешается поменять цвет всех окрашенных точек, принадлежащих либо одной из сторон либо одной из диагоналей на противоположный (синие точки становятся красными, а красные — синими). Сможет ли он добиться желаемого, выполнив какое-то количество описанных операций?

6. Петя может располагать три отрезка в пространстве произвольным образом. После того как Петя расположит эти отрезки, Андрей пытается найти плоскость и спроектировать на нее отрезки так, чтобы проекции всех трех были равны. Всегда ли ему удастся это сделать, если:

а) три отрезка имеют равные длины?

б) длины двух отрезков равны между собой и не равны длине третьего?