Первый (отборочный) этап академического соревнования

Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по образовательному предмету
«Математика», осень 2013 г.

Вариант № 1

1. Двое рабочих одновременно приступили к изготовлению одинаковых партий деталей. Когда первый рабочий сделал половину деталей, второму оставалось изготовить 24 детали, а когда второй выполнил половину работы, первому оставалось сделать 15 деталей. Сколько деталей осталось изготовить второму рабочему, когда первый выполнил свою работу? (8 баллов)

2. Решите уравнение $2^x - 6 \cdot 2^{1-x} = 1$. (8 баллов)

3. Какое наибольшее значение может принять сумма первых n членов арифметической прогрессии (a_n) , если $a_{17} = 52$, $a_{30} = 13$? (8 баллов)

4. Найдите все целочисленные решения системы

$$\begin{cases} \sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} = \sqrt{1 + 2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} - \cos \frac{\pi x}{4}}, \\ |x| + |y - 4| \leq 4, \quad y < x + 2. \end{cases} \quad (8 \text{ баллов})$$

5. Решите неравенство $\frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{4 - 2x}}{2x + 5 - 2\sqrt{x^2 + 5x + 6}} \leq 0$. (10 баллов)

6. Найдите множество значений функции $f(x) = g(g^2(x))$, где $g(x) = 3/(x^2 - 4x + 5)$. (10 баллов)

7. В прямоугольную трапецию $ABCD$ с углом A , равным $2 \arccos(15/17)$, вписана окружность. Вторая окружность с радиусом 10,8 касается сторон AB и AD трапеции и вписанной в нее окружности. Найдите площадь трапеции $ABCD$. (12 баллов)

8. Составьте уравнение общей касательной к графикам функций

$$y = 1 + x - x^2 \text{ и } y = 0,5(x^2 + 3). \quad (12 \text{ баллов})$$

9. Определите все значения a , при которых уравнение $(x - a)^2 - 1 = 2(x + |x|)$ имеет ровно два различных корня. Укажите эти корни при каждом из найденных значений a . (12 баллов)

10. Через диагональ прямоугольного параллелепипеда и точку, лежащую на боковом ребре, не пересекающем эту диагональ, проведена плоскость так, чтобы площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью была наименьшей. Найдите объем параллелепипеда, если известно, что диагонали сечения равны 3 и $\sqrt{3}$, а угол между ними 30° . (12 баллов)

Решение варианта №1

1. Двое рабочих одновременно приступили к изготовлению одинаковых партий деталей. Когда первый рабочий сделал половину деталей, второму оставалось изготовить 24 детали, а когда второй выполнил половину работы, первому оставалось сделать 15 деталей. Сколько деталей осталось изготовить второму рабочему, когда первый выполнил свою работу?

Решение: Если n – количество деталей в партии, p_1 и p_2 – производительности рабочих, то

$\frac{n}{2p_1} = \frac{n-24}{p_2}$; $\frac{n}{2p_2} = \frac{n-15}{p_1}$; $\frac{n}{p_1} = \frac{n-x}{p_2}$. Из первых двух уравнений получаем:

$$n^2/4 = n^2 - 39n + 360, \text{ или } n^2 - 52n + 480 = 0; n = 26 \pm 14, n_1 = 12 - \text{пост. корень}, n_2 = 40.$$

Подставляя $n = 40$ в первое и третье уравнения, получаем $\frac{20}{p_1} = \frac{16}{p_2}$ и $\frac{40}{p_1} = \frac{40-x}{p_2}$, откуда

$$40 - x = 32, x = 8. \text{ Ответ: } 8 \text{ деталей.}$$

2. Решите уравнение $2^x - 6 \cdot 2^{1-x} = 1$.

Решение: $2^x - 6 \cdot 2^{1-x} = 1, (2^x)^2 - 2^x - 12 = 0; 2^x = (1 \pm 7)/2, 2^x = 4, x = 2. \text{ Ответ: } x = 2.$

3. Какое наибольшее значение может принять сумма первых n членов арифметической прогрессии (a_n) , если $a_{17} = 52, a_{30} = 13$?

Решение: Если a – первый член и d – разность арифметической прогрессии,

$$\begin{cases} a + 16d = 52, \\ a + 29d = 13 \end{cases} \Leftrightarrow d = -3, a = 100.$$

Сумма первых n членов арифметической прогрессии S_n принимает наибольшее значение, если $a_n > 0$, а $a_{n+1} \leq 0$. Так как $a_n = a + d(n-1)$, то из неравенства $100 - 3(n-1) > 0$ найдем $n = [103/3] = 34$. Тогда $\max S_n = S_{34} = 0,5 \cdot (100 + 100 - 3 \cdot 33) \cdot 34 = 1717$.

Ответ: 1717.

4. Найдите все целочисленные решения системы

$$\begin{cases} \sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} = \sqrt{1 + 2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} - \cos \frac{\pi x}{4}}, \\ |x| + |y - 4| \leq 4, \quad y < x + 2. \end{cases}$$

Решение:

Рассмотрим уравнение системы $\sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} = \sqrt{1 + 2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} - \cos \frac{\pi x}{4}}$. При условии

$$\sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} \geq 0, \text{ т.е. при } -4 + 16k \leq y \leq 4 + 16k, k \in Z, \text{ имеем}$$

$$2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} - 1 - 2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} + \cos \frac{\pi x}{4} = 0 \Leftrightarrow (2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} - 1)(1 - \cos \frac{\pi x}{4}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} = 1 \text{ или } \cos \frac{\pi x}{4} = 1 \Leftrightarrow y = 2 + 16k, y = -2 + 16k, k \in Z, \text{ или } x = 8n, n \in Z.$$

Целочисленными решениями системы будут точки

$(l; 2 + 16k), (l; -2 + 16k), (8n; m), l, k, n, m \in Z, -4 + 16s \leq m \leq 4 + 16s, s \in Z$, лежащие в

квадрате с центром в точке $(0; 4)$, стороной $4\sqrt{2}$, диагоналями параллельными осям координат и в полуплоскости $y < x + 2$. Такими точками будут $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; 2)$.

Ответ: $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; 2)$.

5. Решите неравенство
$$\frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{4 - 2x}}{2x + 5 - 2\sqrt{x^2 + 5x + 6}} \leq 0.$$

Решение:

ОДЗ числителя и знаменателя: $x(x+1) \geq 0$, $4 - 2x \geq 0$, $x^2 + 5x + 6 \geq 0$, $\Rightarrow x \in (-\infty; -3] \cup [-2; -1] \cup [0; 2]$.

На ОДЗ исходное неравенство эквивалентно следующему
$$\frac{x^2 + x - (4 - 2x)}{(x+3) - 2\sqrt{(x+3)(x+2)} + x + 2} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x+4)(x-1)}{(x+3) - 2\sqrt{(x+3)(x+2)} + x + 2} \leq 0.$$

Если $x \geq -2$, то приходим к неравенству $\frac{(x+4)(x-1)}{(\sqrt{x+3} - \sqrt{x+2})^2} \leq 0$, и $x \in [-2; 1]$.

С учетом ОДЗ $x \in [-2; -1] \cup [0; 1]$.

Если $x \leq -3$, то приходим к неравенству $\frac{(x+4)(x-1)}{-(\sqrt{-x-3} + \sqrt{-x-2})^2} \leq 0$, и

$x \in (-\infty; -4]$, что входит в ОДЗ.

Окончательно имеем $x \in (-\infty; -4] \cup [-2; -1] \cup [0; 1]$.

Ответ: $x \in (-\infty; -4] \cup [-2; -1] \cup [0; 1]$.

6. Найдите множество значений функции $f(x) = g(g^2(x))$, где $g(x) = \frac{3}{x^2 - 4x + 5}$.

Решение: Функция $g(x) = \frac{3}{x^2 - 4x + 5} = \frac{3}{(x-2)^2 + 1}$ определена на всей числовой оси и

принимает все значения из промежутка $(0; 3]$. Функция $g(x)$ достигает максимального значения в точке $x = 2$, $g_{\max} = g(2) = 3$, на промежутке $(-\infty; 2)$ функция $g(x)$ возрастает, на промежутке $(2; +\infty)$ — убывает. Функция $g^2(x)$ принимает все значения из промежутка $(0; 9]$, поскольку $t = g(x) \in (0; 3]$, а функция t^2 возрастает в этом промежутке. Для нахождения множества значений функции $f(x) = g(g^2(x))$ достаточно найти множество значений функции $g(x)$ на промежутке $(0; 9]$. На указанном промежутке $g(x)$ принимает

все значения из множества $[g(9); g(2)] = [3/50; 3]$. Ответ: $E_f = \left[\frac{3}{50}; 3 \right]$.

7. В прямоугольную трапецию $ABCD$ с углом A , равным $2\arccos\frac{15}{17}$ вписана окружность. Вторая окружность с радиусом $10,8$ касается сторон AB и AD трапеции и вписанной в нее окружности. Найдите площадь трапеции $ABCD$.

Решение: Пусть O - центр вписанной в трапецию окружности, O_1 - центр окружности, касающейся сторон AB и AD трапеции и вписанной в нее окружности. Пусть для определенности угол D прямой (случай с прямым углом B рассматривается аналогично). Точки K и N - точки касаний стороны AB окружностей с центрами в точках O и O_1 соответственно. Треугольник OAB прямоугольный, угол AOB равен 90° (AO и BO - биссектрисы углов A и B , сумма этих углов равна 180°). Пусть $x = OB$, $\alpha = \angle OAB = \frac{\angle BAD}{2} = \arccos\frac{15}{17}$. Так как $OK \perp AB$, $\angle BOK = \alpha = \arccos\frac{15}{17}$, то $R = OK = x \cos \alpha = \frac{15}{17}x$ (R - радиус вписанной в трапецию окружности). В прямоугольном

треугольнике OAB имеем: $AB = \frac{x}{\sin \alpha} = \frac{17}{8}x$, $OA = \frac{x}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{15}{8}x$. В прямоугольном

треугольнике NAO_1 имеем: $AO_1 = \frac{r}{\sin \alpha} = \frac{459}{20} = 22,95$, r - радиус второй окружности из условия задачи, $r = 10,8$. Для отрезка OA получаем соотношение

$$OA = R + r + AO_1 = \frac{15}{17}x + 10,8 + 22,95, \text{ следовательно, } \frac{15}{8}x = \frac{15}{17}x + 10,8 + 22,95, x = 34.$$

Найдем площадь трапеции $ABCD$:

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} 2R = R(AB + 2R) = 30\left(\frac{17 \cdot 34}{8} + 60\right) = 3967,5. \quad \text{Ответ: } 3967,5.$$

8. Составьте уравнение общей касательной к графикам функций

$$y = 1 + x - x^2 \text{ и } y = 0,5(x^2 + 3).$$

Решение: $y = 1 + x - x^2$, $y = 0,5(x^2 + 3)$, $y = ax + b$.

$$1 + x - x^2 = ax + b, x^2 + (a-1)x + b - 1 = 0.$$

$$D = (a-1)^2 - 4b + 4 = 0, a^2 - 2a - 4b + 5 = 0. \quad (*)$$

$$0,5(x^2 + 3) = ax + b, x^2 - 2ax - 2b + 3 = 0.$$

$$D/4 = a^2 - (-2b + 3) = 0, \quad a^2 + 2b - 3 = 0. \quad (**)$$

Из (*) и (**) получаем $3a^2 - 2a - 1 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = -1/3$.

$$b = \frac{3 - a^2}{2}, \quad b_1 = 1, \quad b_2 = \frac{13}{9}.$$

$$\text{Ответ: } y = x + 1, \quad y = -\frac{1}{3}x + \frac{13}{9}.$$

9. Определите все значения a , при которых уравнение $(x - a)^2 - 1 = 2(x + |x|)$ имеет ровно два различных корня. Укажите эти корни при каждом из найденных значений a .

Решение:

I. $x \geq 0$, $(x - a)^2 - 1 = 4x$, $x^2 - 2(a + 2)x + a^2 - 1 = 0$; $D/4 = a^2 + 4a + 4 - a^2 + 1 = 4a + 5$.

Уравнение имеет два различных неотрицательных корня $x_{1,2} = a + 2 \pm \sqrt{4a + 5}$, если

$$\begin{cases} 4a + 5 > 0, \\ a + 2 > 0, \\ a^2 - 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > -5/4, \\ a \leq -1, \\ a \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5/4 < a \leq -1, \\ a \geq 1. \end{cases}$$

Уравнение имеет ровно один неотрицательный корень $x_{1,2} = a + 2 + \sqrt{4a + 5}$, если

$$\begin{cases} D = 4a + 5 = 0, \\ a + 2 \geq 0, \\ a^2 - 1 < 0, \\ a^2 - 1 = 0, \\ a + 2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5/4, \\ a > -2, \\ -1 < a < 1, \\ a^2 - 1 = 0, \\ a + 2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5/4, \\ -1 < a < 1. \end{cases}$$

II. $x < 0$, $(x - a)^2 - 1 = 0$.

Корень $x_1 = a + 1 < 0$, если $a < -1$, и корень $x_2 = a - 1 < 0$, если $a < 1$, то есть, уравнение имеет два различных отрицательных корня $x_{1,2} = a \pm 1$, если $-\infty < a < -1$, и уравнение имеет ровно один отрицательный корень $x = a - 1$, если $-1 \leq a < 1$.

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } & a \in (-\infty; -5/4), \quad x_{1,2} = a \pm 1; \\ & a \in (-1; 1), \quad x_1 = a - 1, \quad x_2 = a + 2 + \sqrt{4a + 5}; \\ & a \in [1; +\infty), \quad x_{1,2} = a + 2 \pm \sqrt{4a + 5}. \end{aligned}$$

10. Через диагональ прямоугольного параллелепипеда и точку, лежащую на боковом ребре, не пересекающей эту диагональ, проведена плоскость так, чтобы площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью была наименьшей. Найдите объем параллелепипеда, если известно, что диагонали сечения равны 3 и $\sqrt{3}$, а угол между ними 30° .

Решение:

Проведем $DL \perp AC$, $LK \parallel CC_1$ ($K \in AC_1$), $PK \parallel DL$. Откладывая на боковом ребре BB_1 отрезок $BQ = PD_1$, получаем параллелограмм $PAQC_1$, который будет сечением наименьшей площади; при этом AC_1 — его большая, а PQ — меньшая диагонали, заданные в условии.

$$AC_1 = 3, PQ = \sqrt{3}, \varphi = 30^\circ, \sin \varphi = 1/2, \cos \varphi = \sqrt{3}/2.$$

$$DL = PK = \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot \sin \varphi = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad OK = \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot \cos \varphi = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}.$$

$$\frac{CL}{AL} = \frac{C_1K}{AK} = \frac{C_1O - OK}{C_1O + OK} = \frac{3/2 - 3/4}{3/2 + 3/4} = \frac{1}{3}. \text{ Пусть } CL = x, \text{ тогда } AL = 3x, AC = 4x.$$

$$DL^2 = CL \cdot AL, \text{ т.е. } \frac{3}{16} = 3x^2, x = \frac{1}{4}, AC = 1. CC_1 = \sqrt{AC_1^2 - AC^2} = \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Объем } V = AC \cdot DL \cdot CC_1 = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}. \quad \text{Ответ: } V = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Первый (отборочный) этап академического соревнования

Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по образовательному предмету
«Математика», осень 2013 г.

Вариант № 7

1. Из пунктов A и B одновременно выехали навстречу друг другу два велосипедиста. Когда первый проехал половину пути, второму осталось проехать до пункта A 72 км, а когда второй проехал половину пути, первому осталось проехать до пункта B 45 км. На каком расстоянии от пункта A велосипедисты встретились? (8 баллов)

2. Решите уравнение $3^{1+\sqrt{x}} + 3^{2-\sqrt{x}} = 28$. (8 баллов)

3. Какое наименьшее значение может принять сумма первых n членов арифметической прогрессии (a_n) , если $a_{35} = 2$, $a_{40} = 17$? (8 баллов)

4. Найдите все целочисленные решения системы

$$\begin{cases} \sqrt{2} \sin \frac{\pi(y+4)}{8} = \sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi x}{8} - 2 \sin^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} + 2 \cos \frac{\pi x}{4}}, \\ |x| + |y-4| \leq 4, \quad y < x+2. \end{cases} \quad (8 \text{ баллов})$$

5. Решите неравенство $\frac{|x+1| - \sqrt{3x+7}}{\sqrt{4-2x} - \sqrt{x^2+x}} \geq 0$. (10 баллов)

6. Найдите множество значений функции $f(x) = g(g^2(x))$, где $g(x) = 3/(|x-2|+1)$. (10 баллов)

7. В прямоугольную трапецию $ABCD$ с углом A , равным $2 \arccos(15/17)$, вписана окружность. Вторая окружность с радиусом $18/25$ касается сторон AB и AD трапеции и вписанной в нее окружности. Найдите площадь треугольника ABD . (12 баллов)

8. Составьте уравнение общей касательной к графикам функций

$$y = 1 + x + x^2 \text{ и } y = 0,5(x^2 + 3). \quad (12 \text{ баллов})$$

9. Определите все значения a , при которых уравнение $(x+1)^2 = a(2|x|-1)$ имеет ровно два различных корня. Укажите эти корни при каждом из найденных значений a . (12 баллов)

10. Через диагональ прямоугольного параллелепипеда и точку, лежащую на боковом ребре, не пересекающем эту диагональ, проведена плоскость так, чтобы площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью была наименьшей. Найдите длины сторон основания параллелепипеда, если известно, что диагонали сечения равны 6 и $2\sqrt{3}$, а угол между ними 30° . (12 баллов)

Решение варианта №7

1. Из пунктов A и B одновременно выехали навстречу друг другу два велосипедиста. Когда первый проехал половину пути, второму осталось проехать до пункта A 72 км, а когда второй проехал половину пути, первому осталось проехать до пункта B 45 км. На каком расстоянии от пункта A велосипедисты встретились?

Решение: Если l – расстояние между A и B , v_1, v_2 – скорости велосипедистов, то

$$\frac{l}{2v_1} = \frac{l-72}{v_2}; \quad \frac{l}{2v_2} = \frac{l-45}{v_1}; \quad \frac{x}{v_1} = \frac{l-x}{v_2}.$$

Из первых двух уравнений получаем:

$$l^2/4 = l^2 - 117l + 72 \cdot 45, \text{ или } l^2 - 156l + 4320 = 0; \quad l = 78 \pm 42, \quad l_1 = 120, \quad l_2 = 36 - \text{пост. корень.}$$

Подставляя $l = 120$ в первое и третье уравнения, получаем $\frac{60}{v_1} = \frac{48}{v_2}$ и $\frac{x}{v_1} = \frac{120-x}{v_2}$, откуда

$$4x = 600 - 5x, \quad x = 66\frac{2}{3}. \quad \text{Ответ: } 66\frac{2}{3} \text{ км.}$$

2. Решите уравнение $3^{1+\sqrt{x}} + 3^{2-\sqrt{x}} = 28$.

Решение: $3^{1+\sqrt{x}} + 3^{2-\sqrt{x}} = 28. \quad 3 \cdot (3^{\sqrt{x}})^2 - 28 \cdot 3^{\sqrt{x}} + 9 = 0;$

$$3^{\sqrt{x}} = \frac{14 \pm \sqrt{196 - 27}}{3} = \frac{14 \pm 13}{3}.$$

1) $3^{\sqrt{x}} = 1/3$, нет решений; 2) $3^{\sqrt{x}} = 9$, $\sqrt{x} = 2$, $x = 4$. **Ответ:** $x = 4$.

3. Какое наименьшее значение может принять сумма первых n членов арифметической прогрессии (a_n) , если $a_{35} = 2$, $a_{40} = 17$?

Решение: Если a – первый член и d – разность арифметической прогрессии,

$$\begin{cases} a + 34d = 2, \\ a + 39d = 17 \end{cases} \Leftrightarrow d = 3, \quad a = -100.$$

Сумма первых n членов арифметической прогрессии S_n принимает наименьшее значение, если $a_n < 0$, а $a_{n+1} \geq 0$. Так как $a_n = a + d(n-1)$, то из неравенства $-100 + 3(n-1) < 0$ найдем $n = [103/3] = 34$.

Тогда $\min S_n = S_{34} = 0,5 \cdot (-100 - 100 + 3 \cdot 33) \cdot 34 = -1717$. **Ответ:** -1717 .

4. Найдите все целочисленные решения системы

$$\begin{cases} \sqrt{2} \sin \frac{\pi(y+4)}{8} = \sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi x}{8} - 2 \sin^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} + 2 \cos \frac{\pi x}{4}}, \\ |x| + |y-4| \leq 4, \quad y < x+2. \end{cases}$$

Решение:

Рассмотрим уравнение системы $\sqrt{2} \sin \frac{\pi(y+4)}{8} = \sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi x}{8} - 2 \sin^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} + 2 \cos \frac{\pi x}{4}}$. Оно

равносильно уравнению $\sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} = \sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi x}{8} + 2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4}}$ или

$$\sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} = \sqrt{1 + 2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} - \cos \frac{\pi x}{4}}. \quad \text{При условии } \sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} \geq 0, \text{ т.е. при}$$

$$-4 + 16k \leq y \leq 4 + 16k, \quad k \in Z, \text{ имеем}$$

$$2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} - 1 - 2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} \cos \frac{\pi x}{4} + \cos \frac{\pi x}{4} = 0 \Leftrightarrow (2 \cos^2 \frac{\pi y}{8} - 1)(1 - \cos \frac{\pi x}{4}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{2} \cos \frac{\pi y}{8} = 1 \text{ или } \cos \frac{\pi x}{4} = 1 \Leftrightarrow y = 2 + 16k, y = -2 + 16k, k \in Z, \text{ или } x = 8n, n \in Z.$$

Целочисленными решениями системы будут точки

$(l; 2 + 16k), (l; -2 + 16k), (8n; m), l, k, n, m \in Z, -4 + 16s \leq m \leq 4 + 16s, s \in Z$, лежащие в

квадрате с центром в точке $(0; 4)$, стороной $4\sqrt{2}$, диагоналями параллельными осям

координат и в полуплоскости $y < x + 2$. Такими точками будут $(0; 0), (0; 1), (1; 2), (2; 2)$.

Ответ: $(0; 0), (0; 1), (1; 2), (2; 2)$.

5. Решите неравенство
$$\frac{|x+1| - \sqrt{3x+7}}{\sqrt{4-2x} - \sqrt{x^2+x}} \geq 0.$$

Решение:

ОДЗ числителя и знаменателя: $3x + 7 \geq 0, x(x+1) \geq 0, 4 - 2x \geq 0, \Rightarrow$

$$x \in [-7/3; -1] \cup [0; 2].$$

На ОДЗ исходное неравенство эквивалентно следующему

$$\frac{(x+1)^2 - 3x - 7}{x^2 + x - (4 - 2x)} \leq 0 \Rightarrow \frac{x^2 - x - 6}{(x+4)(x-1)} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x+2)(x-3)}{(x+4)(x-1)} \leq 0 \Rightarrow x \in (-4; -2] \cup (1; 3].$$

Окончательно имеем $x \in [-7/3; -2] \cup (1; 2]$.

Ответ: $x \in [-7/3; -2] \cup (1; 2]$.

6. Найдите множество значений функции $f(x) = g(g^2(x))$, где $g(x) = \frac{3}{|x-2|+1}$.

Решение: Функция $g(x) = \frac{3}{|x-2|+1}$ определена на всей числовой оси и принимает все

значения из промежутка $(0; 3]$. Функция $g(x)$ достигает максимального значения в точке

$x = 2, g_{\max} = g(2) = 3$, на промежутке $(-\infty; 2)$ функция $g(x)$ возрастает, на промежутке

$(2; +\infty)$ — убывает. Функция $g^2(x)$ принимает все значения из промежутка $(0; 9]$,

поскольку $t = g(x) \in (0; 3]$, а функция t^2 возрастает в этом промежутке. Для нахождения

множества значений функции $f(x) = g(g^2(x))$ достаточно найти множество значений

функции $g(x)$ на промежутке $(0; 9]$. На указанном промежутке $g(x)$ принимает все

значения из множества $[g(9); g(2)] = [3/8; 3]$.

Ответ: $E_f = \left[\frac{3}{8}; 3 \right]$.

7. В прямоугольную трапецию $ABCD$ с углом A , равным $2 \arccos \frac{15}{17}$ вписана окружность. Вторая окружность с радиусом $\frac{18}{25}$ касается сторон AB и AD трапеции и вписанной в нее окружности. Найдите площадь треугольника ABD .

Решение: Пусть O - центр вписанной в трапецию окружности, O_1 - центр окружности, касающейся сторон AB и AD трапеции и вписанной в нее окружности. Пусть для определенности угол D прямой (случай с прямым углом B рассматривается аналогично). Точки K и N - точки касаний стороны AB окружностей с центрами в точках O и O_1 соответственно. Треугольник OAB прямоугольный, угол AOB равен 90° (AO и BO - биссектрисы углов A и B , сумма этих углов равна 180°). Пусть $x = OB$, $\alpha = \angle OAB = \frac{\angle BAD}{2} = \arccos \frac{15}{17}$. Так как $OK \perp AB$, $\angle BOK = \alpha = \arccos \frac{15}{17}$, то $R = OK = x \cos \alpha = \frac{15}{17}x$ (R - радиус вписанной в трапецию окружности). В прямоугольном треугольнике OAB имеем: $AB = \frac{x}{\sin \alpha} = \frac{17}{8}x$, $OA = \frac{x}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{15}{8}x$. В прямоугольном треугольнике NAO_1 имеем: $AO_1 = \frac{r}{\sin \alpha} = \frac{153}{100} = 1,53$, r - радиус второй окружности из условия задачи, $r = \frac{18}{25} = 0,72$. Для отрезка OA получаем соотношение $OA = R + r + AO_1 = \frac{15}{17}x + 0,72 + 1,53$, следовательно, $\frac{15}{8}x = \frac{15}{17}x + 0,72 + 1,53$, $x = \frac{34}{15}$.

Найдем площадь треугольника ABD :

$$S_{ABD} = AD \cdot R = (AO \cos \alpha + R)R = R \left(\frac{15 \cdot 15}{8 \cdot 17} x + R \right) = 2(3,75 + 2) = 11,5.$$

Ответ: 11,5.

8. Составьте уравнение общей касательной к графикам функций $y = 1 + x + x^2$ и $y = 0,5(x^2 + 3)$.

Решение:

$$y = 1 + x + x^2, y = 0,5(x^2 + 3), y = ax + b.$$

$$1+x+x^2 = ax+b, x^2 + (1-a)x + 1-b = 0.$$

$$D = (1-a)^2 - 4(1-b) = 0, a^2 - 2a + 4b - 3 = 0. \quad (*)$$

$$0,5(x^2 + 3) = ax+b, x^2 - 2ax - 2b + 3 = 0.$$

$$D/4 = a^2 - (-2b+3) = 0, a^2 + 2b - 3 = 0. \quad (**)$$

Из (*) и (**) получаем $a^2 + 2a - 3 = 0, a_1 = 1, a_2 = -3$.

$$b = \frac{3-a^2}{2}, b_1 = 1, b_2 = -3.$$

Ответ: $y = x+1, y = -3(x+1)$.

9. Определите все значения a , при которых уравнение $(x+1)^2 = a(2|x|-1)$ имеет ровно два различных корня. Укажите эти корни при каждом из найденных значений a .

Решение:

I. $x \geq 0, x^2 + 2x + 1 = 2ax - a; x^2 - 2(a-1)x + a + 1 = 0;$

$$D/4 = a^2 - 2a + 1 - a - 1 = a^2 - 3a.$$

1) два различных неотрицательных корня $x_{1,2} = a - 1 \pm \sqrt{a^2 - 3a}$, если:

$$\begin{cases} a^2 - 3a > 0, \\ a - 1 > 0, \\ a + 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0, \\ a > 3, \\ a > 1 \end{cases} \Leftrightarrow a > 3.$$

2) один неотрицательный корень $x = a - 1 + \sqrt{a^2 - 3a}$, если:

$$\begin{cases} a^2 - 3a = 0, \\ a - 1 \geq 0, \\ a + 1 < 0, \\ a + 1 = 0, \\ a - 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3, \\ a < -1, \\ a = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3, \\ a \leq -1. \end{cases}$$

II. $x < 0, x^2 + 2x + 1 = -2ax - a; x^2 + 2(a+1)x + a + 1 = 0;$

$$D/4 = a^2 + 2a + 1 - a - 1 = a^2 + a.$$

1) два различных отрицательных корня $x_{1,2} = -a - 1 \pm \sqrt{a^2 + a}$, если:

$$\begin{cases} a^2 + a > 0, \\ a + 1 > 0, \\ a + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0, \\ a > -1 \end{cases} \Leftrightarrow a > 0.$$

2) один отрицательный корень $x = -a - 1 - \sqrt{a^2 + a}$, если:

$$\begin{cases} a^2 + a = 0, \\ a + 1 > 0, \\ a + 1 < 0, \\ a + 1 = 0, \\ a + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0, \\ a < -1. \end{cases}$$

Ответ: $a < -1$, $x_1 = a - 1 + \sqrt{a^2 - 3a}$, $x_2 = -a - 1 - \sqrt{a^2 + a}$;
 $0 < a < 3$, $x_{1,2} = -a - 1 \pm \sqrt{a^2 + a}$.

10. Через диагональ прямоугольного параллелепипеда и точку, лежащую на боковом ребре, не пересекающем эту диагональ, проведена плоскость так, чтобы площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью была наименьшей. Найдите длины сторон основания параллелепипеда, если известно, что диагонали сечения равны 6 и $2\sqrt{3}$, а угол между ними 30° .

Решение:

Проведем $DL \perp AC$, $LK \parallel CC_1$ ($K \in AC_1$), $PK \parallel DL$. Откладывая на боковом ребре BB_1 отрезок $BQ = PD_1$, получаем параллелограмм $PAQC_1$, который будет сечением наименьшей площади; при этом AC_1 — его большая, а PQ — меньшая диагонали, заданные в условии.

$$AC_1 = 6, \quad PQ = 2\sqrt{3}, \quad \varphi = 30^\circ, \quad \sin \varphi = 1/2, \quad \cos \varphi = \sqrt{3}/2.$$

$$DL = PK = \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot \sin \varphi = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad OK = \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot \cos \varphi = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$\frac{CL}{AL} = \frac{C_1K}{AK} = \frac{C_1O - OK}{C_1O + OK} = \frac{3 - 3/2}{3 + 3/2} = \frac{1}{3}. \quad \text{Пусть } CL = x, \text{ тогда } AL = 3x.$$

$$DL^2 = CL \cdot AL, \text{ т.е. } \frac{3}{4} = 3x^2, \quad x = \frac{1}{2}, \quad CL = \frac{1}{2}, \quad AL = \frac{3}{2}. \quad \text{Тогда } CD = \sqrt{DL^2 + CL^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1,$$

$$AD = \sqrt{DL^2 + AL^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{3}.$$

Ответ: $1; \sqrt{3}$.