

Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. 3

В данной статье мы рассматриваем задачи с параметрами, так или иначе сводящиеся к исследованию квадратных уравнений и неравенств. Никакой дополнительной теории уже не будет; используется материал, который вы усвоили в результате работы с предыдущими двумя статьями (и соответствующими задачками):

- [Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. 1](#);
- [Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. 2](#).

Теперь изученные вами методы будут применяться в новых ситуациях.

Задача 1. (МГУ, ВМК, 2003) При всех значениях параметра c решите уравнение

$$4^x + c \cdot 25^x = 3 \cdot 10^x.$$

Решение. Перепишем уравнение в виде:

$$2^{2x} - 3 \cdot 2^x \cdot 5^x + c \cdot 5^{2x} = 0.$$

Величина 5^{2x} не обращается в нуль ни при каком x , поэтому, делим обе части данного уравнения на 5^{2x} , приходим к равносильному уравнению

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{2x} - 3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x + c = 0.$$

Делаем замену $t = \left(\frac{2}{5}\right)^x$:

$$t^2 - 3t + c = 0. \tag{1}$$

Когда исходная переменная x пробегает множество $\mathbb{R}$, новая переменная t пробегает множество $(0; +\infty)$. Поэтому мы должны искать положительные корни уравнения (1).

Дискриминант уравнения (1): $D = 9 - 4c$. Имеем три случая.

1. $D < 0$. Так будет при $c > \frac{9}{4}$, и в этом случае уравнение (1) не имеет корней.
2. $D = 0$. Так будет при $c = \frac{9}{4}$. В этом случае уравнение (1) имеет единственный корень $t = \frac{3}{2}$, которому отвечает значение $x = \log_{\frac{2}{5}} \frac{3}{2}$.
3. $D > 0$. Так будет при $c < \frac{9}{4}$. В этом случае уравнение (1) имеет два различных корня:

$$t_1 = \frac{3 + \sqrt{9 - 4c}}{2}, \quad t_2 = \frac{3 - \sqrt{9 - 4c}}{2}.$$

Корень t_1 положителен при всех рассматриваемых c ; данному корню отвечает значение $x = \log_{\frac{2}{5}} \frac{3 + \sqrt{9 - 4c}}{2}$.

Корень t_2 положителен при $c > 0$, и тогда ему отвечает значение $x = \log_{\frac{2}{5}} \frac{3 - \sqrt{9 - 4c}}{2}$. Если же $c \leq 0$, то $t_2 \leq 0$, и в таком случае корню t_2 не отвечает никакое значение x .

Остаётся собрать все случаи и записать ответ.

Ответ: Если $c \leq 0$, то $x = \log_{\frac{2}{5}} \frac{3 + \sqrt{9 - 4c}}{2}$; если $c \in (0; \frac{9}{4})$, то $x = \log_{\frac{2}{5}} \frac{3 + \sqrt{9 - 4c}}{2}$; если $c = \frac{9}{4}$, то $x = \log_{\frac{2}{5}} \frac{3}{2}$; если $c > \frac{9}{4}$, то решений нет.

Задача 2. (Олимпиада «Покори Воробьёвы горы», 2010) При каких значениях параметра a неравенство

$$3 \cdot 4^x - 6a \cdot 2^x + 3a^2 + 2a - 14 < 0$$

не имеет решений?

Решение. Делая замену $t = 2^x$, получим неравенство

$$3t^2 - 6at + 3a^2 + 2a - 14 < 0. \quad (2)$$

Когда переменная x пробегает множество $\mathbb{R}$, переменная t пробегает множество $(0; +\infty)$. Следовательно, мы можем решать задачу, эквивалентную исходной: найти все значения параметра a , при которых неравенство (2) не имеет *положительных* решений.

Прежде всего найдём дискриминант¹:

$$D = 9a^2 - 3(3a^2 + 2a - 14) = 42 - 6a.$$

Пусть $D \leq 0$, то есть

$$a \geq 7. \quad (3)$$

В этом случае функция $f(t) = 3t^2 - 6at + 3a^2 + 2a - 14$ обращается в нуль не более чем в одной точке и поэтому не принимает отрицательных значений. Следовательно, неравенство (2) не имеет решений, и множество (3) нам подходит.

Пусть теперь $D > 0$, то есть $a < 7$. Тогда наш квадратный трёхчлен $f(t)$ имеет два различных корня:

$$t_1 = \frac{3a - \sqrt{42 - 6a}}{3}, \quad t_2 = \frac{3a + \sqrt{42 - 6a}}{3},$$

и множеством решений неравенства (2) служит интервал $(t_1; t_2)$. Значит, неравенство (2) не будет иметь положительных решений в том и только в том случае, если больший корень неположителен: $t_2 \leq 0$.

Здесь проще действовать «в лоб», используя явное выражение для t_2 . Имеем, таким образом, неравенство:

$$\frac{3a + \sqrt{42 - 6a}}{3} \leq 0,$$

или

$$\sqrt{42 - 6a} \leq -3a.$$

Последнее неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} 42 - 6a \leq 9a^2, \\ a \leq 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a^2 + 2a - 14 \geq 0, \\ a \leq 0. \end{cases}$$

Решение этой системы труда не представляет, и мы получаем:

$$a \leq \frac{-1 - \sqrt{43}}{3}. \quad (4)$$

Все эти значения a находятся внутри множества $a < 7$ (в рамках которого мы сейчас находимся), поэтому для получения ответа остаётся объединить множества (4) и (3).

Ответ: $a \in \left(-\infty; \frac{-1 - \sqrt{43}}{3}\right] \cup [7; +\infty)$.

¹Величину $D/4$ мы для удобства также называем дискриминантом и обозначаем D .

Задача 3. При каких p уравнение $\sin^2 x + p \sin x = p^2 - 1$ имеет решения?

Решение. Замена $t = \sin x$ приводит к квадратному уравнению относительно t :

$$t^2 + pt - p^2 + 1 = 0. \quad (5)$$

Когда переменная x пробегает множество $\mathbb{R}$, переменная t пробегает множество $[-1; 1]$. Поэтому имеем эквивалентную переформулировку исходной задачи: при каких p уравнение (5) имеет корни на отрезке $[-1; 1]$?

Уравнение (5) будет иметь корни при неотрицательном дискриминанте $D = 5p^2 - 4$. Мы отдельно рассмотрим случаи $D = 0$ и $D > 0$.

Пусть сначала $D = 0$, тогда

$$p = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}. \quad (6)$$

В этом случае уравнение (5) имеет единственный корень $t_0 = -\frac{p}{2}$, то есть $t_0 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ при $p = \frac{2}{\sqrt{5}}$ или $t_0 = \frac{1}{\sqrt{5}}$ при $p = -\frac{2}{\sqrt{5}}$. Оба этих значения t_0 принадлежат отрезку $[-1; 1]$, поэтому оба значения (6) нам подходят.

Пусть теперь $D > 0$, тогда

$$p < -\frac{2}{\sqrt{5}}, \quad p > \frac{2}{\sqrt{5}}. \quad (7)$$

При таких значениях p уравнение (5) имеет два различных корня. Требуется, чтобы хотя бы один из них был расположен на отрезке $[-1; 1]$. Эта ситуация исчерпывается следующими тремя вариантами:

- 1) оба корня принадлежат интервалу $(-1; 1)$;
- 2) один корень принадлежит интервалу $(-1; 1)$, а второй корень лежит вне отрезка $[-1; 1]$;
- 3) один из корней равен 1 или -1 .

Первый вариант описывается условиями, которые подробно обсуждались в предыдущей статье «[Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. 2](#)». Именно, оба корня принадлежат интервалу $(-1; 1)$ в том и только в том случае, если значения функции

$$f(t) = t^2 + pt - p^2 + 1$$

на концах данного интервала положительны, а абсцисса вершина параболы $y = f(t)$ лежит внутри интервала:

$$\begin{cases} f(-1) > 0, \\ f(1) > 0, \\ -1 < -\frac{p}{2} < 1, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p^2 + p - 2 < 0, \\ p^2 - p - 2 < 0, \\ -2 < p < 2. \end{cases}$$

Решением полученной системы является множество

$$-1 < p < 1. \quad (8)$$

Второй вариант расположения (когда один корень принадлежит $(-1; 1)$, а второй не принадлежит $[-1; 1]$) реализуется тогда и только тогда, когда функция $f(t)$ принимает на концах отрезка значения разных знаков: $f(-1) \cdot f(1) < 0$.

Третий вариант расположения (когда один из корней равен ± 1) характеризуется равенствами $f(-1) = 0$ или $f(1) = 0$, которые объединяются в одно равенство $f(-1) \cdot f(1) = 0$.

И теперь мы можем объединить второй и третий вариант, описав их оба одним условием:

$$f(-1) \cdot f(1) \leq 0.$$

В результате получаем неравенство:

$$(p^2 + p - 2)(p^2 - p - 2) \leq 0 \Leftrightarrow (p + 2)(p + 1)(p - 1)(p - 2) \leq 0,$$

которое легко решается методом интервалов:

$$-2 \leq p \leq -1, \quad 1 \leq p \leq 2. \quad (9)$$

Напомним, что сейчас мы находимся в рамках случая $D > 0$. Чтобы получить подходящие значения p для этого случая, нужно объединить множества (8) и (9), после чего пересечь это объединение с множеством (7). В результате получим:

$$-2 \leq p < -\frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \frac{2}{\sqrt{5}} < p \leq 2.$$

Теперь для получения окончательного ответа нужно к данному множеству добавить значения (6), возникшие в рамках случая $D = 0$.

Ответ: $p \in \left[-2; -\frac{2}{\sqrt{5}}\right] \cup \left[\frac{2}{\sqrt{5}}; 2\right]$.

Задача 4. При каких a уравнение $4^{\sin x} + a \cdot 2^{\sin x} + a^2 - 1 = 0$ не имеет корней?

Решение. Замена $t = 2^{\sin x}$ приводит к квадратному уравнению относительно t :

$$t^2 + at + a^2 - 1 = 0. \quad (10)$$

Когда переменная x пробегает множество $\mathbb{R}$, величина $\sin x$ пробегает отрезок $[-1; 1]$, а переменная t пробегает соответственно отрезок $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$. Поэтому исходное уравнение не имеет корней тогда и только тогда, когда уравнение (10) не имеет корней на отрезке $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

Прежде всего найдём дискриминант уравнения (10):

$$D = 4 - 3a^2.$$

Нас устраивает, в частности, случай $D < 0$, когда уравнение (10) вообще не имеет корней. В этом случае имеем:

$$a < -\frac{2}{\sqrt{3}}, \quad a > \frac{2}{\sqrt{3}}. \quad (11)$$

Эти значения a нам подходят.

Теперь рассмотрим случай $D = 0$, то есть $a = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$. Тогда уравнение (10) имеет единственный корень $t_0 = -\frac{a}{2}$. Если $a = -\frac{2}{\sqrt{3}}$, то $t_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$, что нас не устраивает; следовательно, $a = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ не годится. Если же $a = \frac{2}{\sqrt{3}}$, то $t_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \notin \left[\frac{1}{2}; 2\right]$, и поэтому значение

$$a = \frac{2}{\sqrt{3}} \quad (12)$$

нам подходит.

Наконец, перейдём к случаю $D > 0$, то есть

$$-\frac{2}{\sqrt{3}} < a < \frac{2}{\sqrt{3}}. \quad (13)$$

Уравнение (10) имеет два различных корня, и оба они должны находиться вне отрезка $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$. Здесь логически возможны три варианта:

- 1) оба корня лежат слева от этого отрезка;
- 2) оба корня лежат справа от этого отрезка;
- 3) оба корня расположены по разные стороны от этого отрезка.

Первый вариант (оба корня меньше $\frac{1}{2}$) реализуется тогда и только тогда когда выполнены следующие условия (снова см. «[Квадратные уравнения и неравенства с параметрами. 2](#)»):

$$\begin{cases} f\left(\frac{1}{2}\right) > 0, \\ t_0 < \frac{1}{2}, \end{cases}$$

где $f(t) = t^2 + at + a^2 - 1$ и t_0 — абсцисса вершины параболы $y = f(t)$. Имеем:

$$\begin{cases} a^2 + \frac{a}{2} - \frac{3}{4} > 0, \\ -\frac{a}{2} < \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a^2 + 2a - 3 > 0, \\ a > -1. \end{cases}$$

Множество решений полученной системы:

$$a > \frac{\sqrt{13} - 1}{4}. \quad (14)$$

Аналогично, второй вариант (оба корня больше 2) характеризуется системой неравенств

$$\begin{cases} f(2) > 0, \\ t_0 > 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + 2a + 3 > 0, \\ a < -4. \end{cases}$$

Первое неравенство системы выполнено при всех a , поэтому имеем здесь

$$a < -4. \quad (15)$$

Наконец, третий вариант (отрезок $[\frac{1}{2}; 2]$ расположен между корнями) характеризуется следующей системой:

$$\begin{cases} f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, \\ f(2) < 0. \end{cases}$$

Второе неравенство этой системы имеет вид $a^2 + 2a + 3 < 0$ и решений не имеет; вместе с ним не имеет решений и вся система. Значит, третий вариант не реализуется.

Теперь, чтобы получить подходящие a в рамках нашего случая $D > 0$, нужно объединить множества (14) и (15), и полученное объединение пересечь с множеством (13). Получим:

$$\frac{\sqrt{13} - 1}{4} < a < \frac{2}{\sqrt{3}}. \quad (16)$$

(Очевидно, $\frac{\sqrt{13}-1}{4} < \frac{2}{\sqrt{3}}$ поскольку $\frac{\sqrt{13}-1}{4} < 1$ и $\frac{2}{\sqrt{3}} > 1$.)

Для получения окончательного ответа объединяем найденные множества значений a в случаях $D < 0$, $D = 0$ и $D > 0$, то есть множества (11), (12) и (16).

Ответ: $a \in \left(-\infty; -\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{13}-1}{4}; +\infty\right)$.

Задача 5. (МГУ, МШЭ, 2007) При каких значениях параметра a уравнение

$$16^x - 3 \cdot 2^{3x+1} + 2 \cdot 4^{x+1} - (4 - 4a) \cdot 2^{x-1} - a^2 + 2a - 1 = 0$$

имеет три различных корня?

Решение. Перепишем уравнение так:

$$2^{4x} - 6 \cdot 2^{3x} + 8 \cdot 2^{2x} + 2(a-1) \cdot 2^x - (a-1)^2 = 0.$$

Делаем замену $t = 2^x$ и, кроме того, вводим новый параметр $b = a - 1$:

$$t^4 - 6t^3 + 8t^2 + 2bt - b^2 = 0.$$

Наш единственный шанс справиться с уравнением четвёртой степени — искать разложение левой части на множители. Преобразуем её следующим образом²:

$$\begin{aligned} t^4 - 6t^3 + 8t^2 + 2bt - b^2 &= t^4 - 6t^3 + 9t^2 - t^2 + 2bt - b^2 = t^2(t^2 - 6t + 9) - (t^2 - 2bt + b^2) = \\ &= t^2(t-3)^2 - (t-b)^2 = (t(t-3) - (t-b))(t(t-3) + (t-b)) = \\ &= (t^2 - 4t + b)(t^2 - 2t - b). \end{aligned}$$

Таким образом, приходим к уравнению:

$$(t^2 - 4t + b)(t^2 - 2t - b) = 0. \quad (17)$$

Когда x пробегает множество $\mathbb{R}$, переменная t пробегает множество $(0; +\infty)$. Поэтому эквивалентная переформулировка исходной задачи такова: при каких b уравнение (17) имеет три различных положительных корня?

Уравнение (17) равносильно совокупности двух квадратных уравнений:

$$t^2 - 4t + b = 0, \quad (18)$$

$$t^2 - 2t - b = 0, \quad (19)$$

и имеет самое большее четыре корня.

Отметим сразу, что уравнение (17) не может иметь четырёх положительных корней (а такой случай логически возможен: ведь в условии исходной задачи не сказано, что корней должно быть *ровно три*). В самом деле, произведение корней уравнения (18) равно b , а произведение корней уравнения (19) равно $-b$; эти два произведения не могут быть одновременно положительными ни при каком b .

Если дискриминант хотя бы одного из уравнений (18), (19) отрицателен, то совокупность этих уравнений имеет самое большее два корня. Следовательно, оба дискриминанта должны быть неотрицательными:

$$\begin{cases} 4 - b \geq 0, \\ 1 + b \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq b \leq 4.$$

Более того, случаи равенства нулю какого-либо дискриминанта исключаются. В самом деле, если $b = -1$, то уравнение (18) принимает вид $t^2 - 4t - 1 = 0$ и имеет ровно один положительный корень (поскольку произведение корней равно -1), а уравнение (19) принимает вид $(t-1)^2 = 0$ и также имеет ровно один положительный корень (равный 1); всего получается два

²На экзамене нижеследующие выкладки можно оставить в черновике, а в чистовике просто написать: «Нетрудно проверить, что $t^4 - 6t^3 + 8t^2 + 2bt - b^2 = (t^2 - 4t + b)(t^2 - 2t - b)$ ». Не смущайтесь, ничего криминального тут нет. Вы не обязаны объяснять, как получено это равенство. Каждый может убедиться в его справедливости непосредственным вычислением — и точка.

положительных корня, так что $b = -1$ не годится. Если же $b = 4$, то уравнение (18) принимает вид $(t - 2)^2 = 0$ и имеет ровно один положительный корень, а уравнение (19) принимает вид $t^2 - 2t - 4 = 0$ и также имеет ровно один положительный корень; снова получаются только два положительных корня, и $b = 4$ также не годится.

Таким образом, мы ограничены множеством

$$-1 < b < 4 \quad (20)$$

возможных значений параметра b . При этих b оба дискриминанта положительны, и каждое уравнение (18), (19) имеет два корня.

Выясним, при каких b уравнения (18) и (19) могут иметь общий корень. Запишем систему этих уравнений:

$$\begin{cases} t^2 - 4t + b = 0, \\ t^2 - 2t - b = 0, \end{cases}$$

и вычтем из первого второе: $-2t + 2b = 0$, то есть $t = b$. Подставляя это в любое из уравнений системы, получим $b^2 - 3b = 0$, откуда $b = 0$ или $b = 3$. Оба этих значения b принадлежат множеству (20) и поэтому будут ниже рассмотрены отдельно.

Итак, последовательно рассматриваем случаи, исчерпывающие всё множество (20) возможных значений b .

- $-1 < b < 0$.

Уравнение (18) имеет ровно один положительный корень (поскольку произведение корней равно $b < 0$).

Уравнение (19) имеет два положительных корня (поскольку сумма корней равна $2 > 0$ и произведение корней равно $-b > 0$).

Всего получается три различных положительных корня (совпадений корней нет, так как в рассматриваемом случае $b \neq 0, 3$). Следовательно, интервал $-1 < b < 0$ нам подходит.

- $b = 0$.

Уравнения (18) и (19) принимают вид $t^2 - 4t = 0$ и $t^2 - 2t = 0$ соответственно. Их совокупность имеет два положительных корня (2 и 4), так что $b = 0$ не годится.

- $0 < b < 3$ и $3 < b < 4$.

Уравнение (18) имеет два положительных корня, уравнение (19) имеет ровно один положительный корень. Всего имеем три положительных корня (совпадений нет), так что интервалы $0 < b < 3$ и $3 < b < 4$ нам подходят.

- $b = 3$.

Уравнение (18) принимает вид $t^2 - 4t + 3 = 0$ и имеет корни 1 и 3. Уравнение (19) принимает вид $t^2 - 2t - 3 = 0$ и имеет корни -1 и 3. Всего получается два положительных корня, так что $b = 3$ не подходит.

Итак, подходящие интервалы значений b : $-1 < b < 0$, $0 < b < 3$, $3 < b < 4$. Вспоминая, что $a = b + 1$, получаем искомое множество значений параметра a : $0 < a < 1$, $1 < a < 4$, $4 < a < 5$.

Ответ: $a \in (0; 1) \cup (1; 4) \cup (4; 5)$.