

Серия 11. Разнобой-4

1. Пусть $x, y, z > 0$. Докажите, что $x^2 + xy^2 + xyz^2 \geq 4xyz - 4$.
2. В треугольнике ABC проведена биссектриса AA_1 . На стороне AB выбрана такая точка K , что $BK = BA_1$. Биссектриса угла C пересекает отрезок KA_1 в точке P . Докажите, что $PA_1 = PA$.
3. Фишка начала обход квадратной доски с некоторой клетки. Каждым ходом она может пойти либо на одну клетку вправо, либо на одну вверх, либо вниз-влево по-диагонали. Может ли она обойти всю доску, побывав на каждой клетке ровно 1 раз и закончить на клетке, соседней справа от исходной?
4. Заданы нечётные числа m, n . Каждая клетка доски m на n покрашена в синий или красный цвет. Пусть R — количество *строк*, в которых красных клеток больше, чем синих, а B — количество *столбцов*, в которых синих клеток больше, чем красных. Какое максимальное значение может принимать сумма $R + B$?
5. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_{2000}$ — целые числа, лежащие на отрезке $[-1000, 1000]$, причём сумма всех этих чисел равна 1. Докажите, что можно выбрать несколько из них так, чтобы их сумма была равна 0.
6. Докажите, что существует такое M , что при всех натуральных $n > M$ наименьший простой делитель числа $(n!)^n + 1$ превосходит $n + 1000$.

Серия 11. Разнобой 4

1. Пусть $x, y, z > 0$. Докажите, что $x^2 + xy^2 + xyz^2 \geq 4xyz - 4$.
2. В треугольнике ABC проведена биссектриса AA_1 . На стороне AB выбрана такая точка K , что $BK = BA_1$. Биссектриса угла C пересекает отрезок KA_1 в точке P . Докажите, что $PA_1 = PA$.
3. Фишка начала обход квадратной доски с некоторой клетки. Каждым ходом она может пойти либо на одну клетку вправо, либо на одну вверх, либо вниз-влево по-диагонали. Может ли она обойти всю доску, побывав на каждой клетке ровно 1 раз и закончить на клетке, соседней справа от исходной?
4. Заданы нечётные числа m, n . Каждая клетка доски m на n покрашена в синий или красный цвет. Пусть R — количество *строк*, в которых красных клеток больше, чем синих, а B — количество *столбцов*, в которых синих клеток больше, чем красных. Какое максимальное значение может принимать сумма $R + B$?
5. Пусть $a_1, a_2, \dots, a_{2000}$ — целые числа, лежащие на отрезке $[-1000, 1000]$, причём сумма всех этих чисел равна 1. Докажите, что можно выбрать несколько из них так, чтобы их сумма была равна 0.
6. Докажите, что существует такое M , что при всех натуральных $n > M$ наименьший простой делитель числа $(n!)^n + 1$ превосходит $n + 1000$.